



ADIUVO®

**BPM**

**Buenas Prácticas  
de Manufactura**



**Adiuvo** está desarrollado para las siguientes clasificaciones terapéuticas:

- . Analgésicos
- . Antiparásitos
- . Antiácidos
- . Antiulceroso
- . Protectores gástricos
- . Antialérgicos
- . Antiprostático
- . Hipoglucemiantes
- . Antimicóticos
- . Anticonvulsivos
- . Vitaminas
- . Antirreumáticos
- . Antidepresivos
- . Antibióticos
- . Disfunción eréctil
- . Antineuríticos
- . Antiasmático
- . Antihipertensivos
- . Antivirales



ADIUVO®



VADEMECUM



### ALENDRONATO 70

Ácido Alendrónico 70 mg

**Indicaciones:** Es un bisfosfato de segunda generación, primer fármaco que no sólo previene la pérdida de hueso, sino que origina su endurecimiento. Se trata de un potente inhibidor de la resorción ósea, pero a diferencia de otros bisfosfonatos de la primera generación, no inhibe la mineralización ósea.  
RA/ Cefalea, flatulencia, trastornos gastroesofágicos y otras.

**Presentación**  
4 Tabletas



### AMLOPIDINA 5

Amlodipina 5 mg

**Indicaciones:** Se utiliza para tratar la tensión arterial alta (hipertensión) o un cierto tipo de dolor en el pecho llamado angina, a la que pertenece un tipo frecuente que es la angina de Prinzmetal o angina variante.  
RA/ La influencia de amlodipina sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas puede ser pequeña o moderada. Si el paciente que recibe amlodipina presenta mareos, dolor de cabeza, fatiga o náuseas, éstos podrían afectar su capacidad de reacción. De recomienda precaución especialmente al inicio de tratamiento.

**Presentación**  
30 Tabletas



### AMITRIPTILINA 25

Amitriptilina Clorhidrato 25 mg

**Indicaciones:** Está indicado para: el tratamiento del trastorno depresivo mayor en adultos, el dolor seepáticos en adultos, Tratamiento protéctico de la cefalea crónica tipo tensional en adultos, tratamiento profiláctico de la migraña en adultos, neuresia nocturna en los niños de edad igual o superior a 6 años cuando se haya descartado patología orgánica, incluido espina bífida y alteraciones relacionadas y no se haya logrado una respuesta con ninguno de los demás tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, incluido antiespasmódicos y productos ralacionados con la vasopresina. RA/ La amitriptilina puede incluir efectos adversos similares a los de otros antidepresivos tricíclicos. Algunos de los efectos adversos mencionados a continuación como p. ej. celafea, temblor, alteraciones de la atención, estreñimiento y disminución de la líbido también pueden ser síntomas de depresión y suelen mitigarse al mejorar es estado depresivo.

**Presentación**  
30 Tabletas Recubiertas



### AMOXICILINA

Amoxicilina 500 mg

**Indicaciones:** Se Administra para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, como neumonía; bronquitis; gonorrea; y las infecciones de los oídos, nariz, garganta, vías urinarias y la piel.  
RA/ Fiebre, trastorno gastrointestinal y otras

**Presentación**  
100 Cápsulas

### AMOXICILINA 875 + ÁCIDO CLAVULÁNICO 125

Amoxicilina Trihidratada 875 mg + Ácido Clavulánico 125 mg



**Indicaciones:** Amoxicilina 875 mg + Ácido Clavulánico 125 mg se usa para tartar ciertas infecciones causadas por bacterias, incluyendo infecciones en los oídos, pulmones, senos, piel y vías urinarias.  
RA/ Fiebre, trastorno gastrointestinal y otras.

**Presentación**  
15 Tabletas Recubiertas

**ATENOLOL 100**

Atenolol 100 mg

**Indicaciones:** Se usa sólo o en combinación con otros medicamentos para tratar la hipertensión. Prevención de angina (dolor en el tórax), Tratamiento de los ataques cardíacos. Actúa relajando los vasos sanguíneos y la disminución de la frecuencia cardíaca para mejorar el flujo sanguíneo y disminuir la presión arterial. RA/ Bradicardia, hipotensión, fenómeno de rainau, fatiga, náuseas, diarrea, impotencia, trombocitopenia, alopecia, broncoespasmo en asmáticos, trastornos visuales, pesadilla, psicosis y otras.

**Presentación**

**100**  
Tabletas  
Recubiertas

**ATORVASTATINA 20**

Atorvastatina 20 mg

**Indicaciones:** Se utiliza junto con una dieta balanceada, pérdida de peso y ejercicio para reducir el riesgo de infarto y apoplejía y para reducir la probabilidad de que se necesite una cirugía de corazón en las personas que tienen una enfermedad del corazón o que estén en riesgo de desarrollar enfermedad del corazón.  
RA/ Cefalea, somnolencia, diarrea, dolor abdominal, mialgias y otras.

**Presentación**

**30**  
Tabletas  
Recubiertas

**ATORVASTATINA 40**

Atorvastatina 40 mg

**Indicaciones:** Se utiliza junto con una dieta balanceada, pérdida de peso y ejercicio para reducir el riesgo de infarto y apoplejía y para reducir la probabilidad de que se necesite una cirugía de corazón en las personas que tienen una enfermedad del corazón o que estén en riesgo de desarrollar enfermedad del corazón.  
RA/ Cefalea, somnolencia, diarrea, dolor abdominal, mialgias y otras.

**Presentación**

**30**  
Tabletas  
Recubiertas

**AZITROMICINA 500**

Azitromicina 500 mg

**Indicaciones:** Administrada para tratar ciertas infecciones bacterianas, como bronquitis; neumonía; enfermedades de transmisión sexual (ITS) e infecciones de los oídos, pulmones, senos nasales, piel, garganta y órganos reproductivos.  
RA/ Diarrea, náuseas, dolor abdominal, vomito, anorexia y otras

**Presentación**

**30**  
Tabletas  
Recubiertas

**BISOPROLOL 5**

Bisoprolol Fumarato 5 mg

**Indicaciones:** Es un antagonista beta adrenérgico activo por vía oral. Actúa específicamente sobre los receptores beta-1, tiene una baja solubilidad en lípidos y se elimina por vía renal y fecal. El Bisoprolol fue inicialmente aprobado para el tratamiento de la hipertensión, pero posteriormente se ha comprobado su eficacia en la cardiopatía isquémica y en la insuficiencia cradiaca. RA/ Fatiga, braquicardia isquemia periférica, tos, rinitis, impotencia, vértico, trastorno gastrointestinal o del sueño, edema, nerviosismo y otros.

**Presentación**

**30**  
Comprimidos  
Recubiertos



## **BISOPROLOL 10**

### Bisoprolol Furamato 10 mg



**Indicaciones:** Es un antagonista beta adrenérgico activo por vía oral. Actúa específicamente sobre los receptores beta-1, tiene una baja solubilidad en lípidos y se elimina por vía renal y fecal. El Bisoprolol fue inicialmente aprobado para el tratamiento de la hipertención, pero posteriormente se ha comprobado su eficacia en la cardiopatía isquémica y en la insuficiencia cardíaca. RA/ Fatiga, braquicardia isquemia periférica, tos, rinitis, impotencia, vértigo, trastorno gastrointestinal o del sueño, edema, nerviosismo y otros.

**Presentación**  
30  
Comprimidos  
Recubiertos

## **BISOPROLOL 5 + HIDROCLOROTIAZIDA 6.25**

### Bisoprolol 5 mg + Hidroclorotiazida 6.25 mg



**Indicaciones:** Este medicamento comprende un bloqueante selectivo de receptores beta (bisoprolol) y un diurético tiazídico (Hidroclorotiazida, medicamento para eliminar agua del cuerpo). Se utiliza para tratar la presión sanguínea elevada (hipertensión primaria) en pacientes adultos cuya presión sanguínea no está suficientemente controlada con bisoprolol o hidroclorotiazida solos. RA/ Fatiga, bradicardia, isquemia periférica, tos, rinitis, impotencia, vértigo, trastorno gastrointestinal o del sueño, edema, nerviosismo y otros.

**Presentación**  
30  
Comprimidos  
Recubiertos

## **BISOPROLOL 10 + HIDROCLOROTIAZIDA 6.25**

### Bisoprolol 10 mg + Hidroclorotiazida 6.25 mg



**Indicaciones:** Este medicamento comprende un bloqueante selectivo de receptores beta (bisoprolol) y un diurético tiazídico (Hidroclorotiazida, medicamento para eliminar agua del cuerpo). Se utiliza para tratar la presión sanguínea elevada (hipertensión primaria) en pacientes adultos cuya presión sanguínea no está suficientemente controlada con bisoprolol o hidroclorotiazida solos. RA/ Fatiga, bradicardia, isquemia periférica, tos, rinitis, impotencia, vértigo, trastorno gastrointestinal o del sueño, edema, nerviosismo y otros.

**Presentación**  
30  
Comprimidos  
Recubiertos

## **CALCIO + D3**

### Citrato de Calcio 1500 mg + Vitamina D3 200 UI



**Indicaciones:** Suplemento de calcio y vitamina D como terapia coadyuvante en el tratamiento específico de la osteoporosis (postmenopáusica, senil, terapia corticosteroidea) en pacientes con riesgo elevado de sufrir deficiencias combinadas de calcio y Vitamina D, o en aquellos en los que esta deficiencia está confirmada. R/A: En caso de administraciones prolongadas (más 16 semanas) altas dosis, puede aparecer. Pérdida de apetito, vómitos, náuseas, dolor de cabeza, debilidad, apatía, somnolencia, sed, deshidratación, aumento de la frecuencia de orinar (que también puede tener lugar por la noche), íleo paralítico, latido de corazón irregular.

**Presentación**  
30  
Tabletas  
Recubiertas

## **CANDESARTÁN 32**

### Candesartán Cilexetilo 32 mg



**Indicaciones:** El Candesartán Cilexetilo actúa bloqueando la hormona angiotensina II, lo cual causa relajación de los vasos sanguíneos y produce la disminución de la presión sanguínea. RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga, ansiedad, rash, diarrea, diaforesis y otras

**Presentación**  
28  
Comprimidos



## CANDESARTÁN 16 + HIDROCLOROTIAZIDA 12.5

Candesartán 16 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg

**Indicaciones:** El Candesartán Cilexetilo actúa bloqueando la hormona angiotensina II, lo cual causa relajación de los vasos sanguíneos y produce la disminución de la presión sanguínea. La Hidroclorotiazida pertenece a la clase de medicamentos llamados diuréticos. Su efecto es promover la excreción urinaria de sodio, cloruro y agua, lo cual da como resultado la disminución de la presión sanguínea. RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga, ansiedad, rash, diarrea, diáforesis y otras

**Presentación**  
28  
Comprimidos



## CARVEDIOL 25

Carvediol 25 mg

**Indicaciones:** Antihipertensivo, antiaginoso, beta bloqueados no selectivo, alfa bloqueador y antioxidante. Está indicado para la hipertensión arterial, angina de pecho, insuficiencia cardíaca congestiva. RA/ Mareos, cefalea, fatiga, bradicardia, hipotensión postural, asma, disnea, náuseas y otras.

**Presentación**  
30  
Comprimidos



## CEFALEXINA 500

Cefalexina anhidra 500 mg

**Indicaciones:** Es un antibiótico oral de la primera generación de cefalosporinas con excelente actividad contra la mayoría de bacterias gram-positivas. Principalmente en el tratamiento de la otitis media y las infecciones de las vías respiratorias (por ejemplo, faringitis, amigdalitis, neumonía lobar) causadas por estafilococos susceptibles, Streptococcus pneumoniae, estreptococos del grupo A y beta-hemolíticos. RA/ Diarrea, trastornos gastrointestinales y otras

**Presentación**  
30  
Cápsulas



## CEFIXINA 400

Cefixina 400 mg

**Indicaciones:** Está indicada como tratamiento de segunda elección en pacientes alérgicos a penicilinas, infecciones causadas por microorganismos sensibles y enfermedades en las que han fallado otros tratamientos como: Fibrosis quística; profilaxis para intervenciones dentales; osteomielitis otitis peritonitis; faringitis estreptocócica; infecciones prostáticas, infecciones respiratorias bajas, infecciones de piel y tejidos blandos; infecciones de vías urinarias. RA/ Cefaleas, mareos, náuseas, diarrea, colitis y otras.

**Presentación**  
5  
Comprimidos  
Recubiertos



## CEFTRIAXONA 1G IM

Ceftriaxona Sódica 1 g polvo para solución inyectable

**Indicaciones:** Se usa para tratar determinadas infecciones ocasionadas por bacterias, como la gonorrea (ITS) la enfermedad inflamatoria pélvica, la meningitis (infección de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal) y las infecciones de los pulmones, los oídos, la piel, las vías urinarias, la sangre, los huesos, las articulaciones y el abdomen. A veces, también se aplica la ceftriaxona inyectable antes de determinados tipos de cirugía para prevenir las infecciones que pueden presentarse después de la operación. RA/ Diarrea, trastornos gastrointestinales, colitis, eosinofilia y otras

**Presentación**  
Polvo para  
solución  
inyectable  
1gr.



## CITICOLINA 500

Citicolina 500 mg

**Indicaciones:** Indicado en el tratamiento de pacientes con lesiones cerebrales graves de naturaleza vascular o traumática. También están indicados para el tratamiento de daños degenerativos y lesiones vasculares cerebrales crónicas en la demencia senil. R/A: La citicolina es un nutraceutico seguro y efectivo. las plantas toxicologicas no han mostrado efectos secundarios graves e incluso después de un tratamiento prolongado.

**Presentación**

**30  
Comprimidos  
Recubiertos**



## CIPROFLOXACINA

Ciprofloxacina 500 mg

**Indicaciones:** la ciprofloxacina es un agente antimicrobrano de la Base de las fluoroquinolonas. Es activo frente a un amplio espectro de gérmenes gram-negativos aerobios, incluyendo patógenos entéricos. Es administrada en tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio inferior (bronquitis, neumonía, absceso pulmonar, infecciones de la piel e infecciones de los huesos y de las articulaciones. RA/ Celalea, fatiga. trastornos gastrointestinales, vértigo, temblor y otras.

**Presentación**

**100  
Comprimidos  
Recubiertos**



## CILOSTAZOL 100

Cilostazol 100 mg

**Indicaciones:** Se usa para reducir los síntomas de la claudicación intermitente (dolor en las piernas que empeora al caminar y mejora al estar en reposo, provocado por el estrechamiento de los vasos sanguíneos que irrigan sangre a las piernas) colaborando así al mejoramiento del flujo de sangre a las piernas. RA/ Equimosis; edema (periférico, facial), anorexia; cefalea, mareo; palpitaciones, taquicardia, angina de pecho, arritmia, extrasístoles ventriculares; rinitis, faringitis; diarrea, heces anómalas, náuseas, vómitos, flatulencia y otras.

**Presentación**

**30  
Comprimidos  
Recubiertos**



## CLINDAMICINA 300

Clindamicina 300 mg

**Indicaciones:** La clindamicina se usa para tratar ciertos tipos de infecciones bacterianas, como infecciones de los pulmones, la piel, la sangre, los órganos reproductores femeninos y los órganos internos. La clindamicina pertenece a una clase de medicamentos llamados antibióticos tipo lincomicina. Actúa al retardar o frenar la multiplicación de las bacterias. RA/ Diarrea, náuseas, trastornos gastrointestinales, mal sabor de boca y otras.

**Presentación**

**20  
Cápsulas**



## DERMAGUARD

Protección solar resistente al agua

**Indicaciones:** Dermaguard con Factor de Protección 50+ (FPS 50+), diseñado especialmente para brindar la protección necesaria en actividades expuestas a la radiación solar. Otorga protección contra rayos ultravioleta del tipo A y B (UVA/ UVB)

**Presentación**

**Loción  
Tópica**



## DEXKETOPTOFENO 25

Dexketoprofeno 25 mg

**Indicaciones:** El Dexketoprofeno es un fármaco perteneciente a la familia de los AINEs (antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica). Está indicado en el tratamiento sintomático del dolor agudo de diversa etiología. RA/ Dolor y ardor estomacal, cefalea, mareos, somnolencia, vértigo, trastornos GI y otras.

**Presentación**

10  
Comprimidos  
Recubiertos



## DEXKETOPTOFENO 25 SOLUCIÓN BEBIBLE

Dexketoprofeno 25 mg

**Indicaciones:** El Dexketoprofeno es un fármaco perteneciente a la familia de los AINEs (antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica). Está indicado en el tratamiento sintomático del dolor agudo de diversa etiología. RA/ Dolor y ardor estomacal, cefalea, mareos, somnolencia, vértigo, trastornos GI y otras.

**Presentación**

10  
Sobres de  
solución oral  
bebible



## DICLOFENACO POTÁSICO 100 SR

Diclofenaco potásico 100 mg

**Indicaciones:** El Diclofenaco Potásico es un medicamento inhibidor relativamente no selectivo de la ciclooxigenasa y miembro de la familia de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Es un miorelajante indicado para reducir inflamaciones y como analgésico, pues reduce dolores causados por heridas menores y dolores tan intensos como los de la artritis. RA/ Trastornos gastrointestinales, cefaleas, mareos, vértigo, exantema y otras.

**Presentación**

30  
Comprimidos  
Recubiertos



## DIFLASH 500

Diosmina 450 mg + Heperidina 50 mg

**Indicaciones:** Alivio a corto plazo del edema y sistemas relacionados con la insuficiencia venosa crónica  
RA/ Trastornos digestivos Y neurovegetativos.

**Presentación**

30  
Comprimidos  
Recubiertos



## DOBESILATO CÁLSICO 500

Dobesilato Cálsico 500 mg

**Indicaciones:** Actúa en las paredes capilares regulando las funciones fisiológicas deterioradas como permeabilidad creciente y resistencia disminuida. Aumenta la flexibilidad del eritrocito, inhibe la hiperagregación de la plaqueta y, en la retinopatía diabética, reduce la hiperviscosidad de la sangre, mejorando así las características reológicas de la sangre y la irrigación del tejido fino. RA/ Trastornos gastrointestinales, erupciones cutáneas y otras.

**Presentación**

100  
Cápsulas



ADIUVO®



VADEMECUM



### DOLO-VITANEURAL N

(Vitamina B1), (Vitamina B6), (Vitamina B12) Diclofenaco Sódico 50 mg

**Indicaciones:** Anti-inflamatorio con acción analgésica y anti-neurótico  
RA/ En grandes dosis produce trastornos de la piel y del tejido sub-cutáneo

**Presentación**  
100  
Tabletas  
Recubiertas



### DOLO-VITANEURAL XR

(Vitamina B1), (Vitamina B6), (Vitamina B12) Diclofenaco Sódico 100 mg

**Indicaciones:** Anti-inflamatorio con acción analgésica y anti-neurótico  
RA/ En grandes dosis produce trastornos de la piel y del tejido sub-cutáneo

**Presentación**  
100  
Tabletas  
Recubiertas



### ENALAPRIL 20

Enalapril 20 mg

**Indicaciones:** El Enalapril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) utilizado en el tratamiento de la hipertensión y algunos tipos de insuficiencia cardíaca crónica.  
RA/ Alergias cutáneas, hipotensión ortostática, cefalea, tos, mareo, fatiga y otras.

**Presentación**  
100  
Tabletas



### ESCITALOPRAM 10

Escitalopram Oxalato

**Indicaciones:** Está indicado para el tratamiento de la depresión (episodios depresivos mayores), trastornos de ansiedad (tales como trastorno de angustia, trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada). RA/ Náuseas, somnolencia, xerostomía, temblor, insomnio, fatiga, diarrea, disminución de la libido y otras.

**Presentación**  
30  
Comprimidos  
Recubiertos



### ESCITALOPRAM 20

Escitalopram Oxalato

**Indicaciones:** Está indicado para el tratamiento de la depresión (episodios depresivos mayores), trastornos de ansiedad (tales como trastorno de angustia, trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada). RA/ Náuseas, somnolencia, xerostomía, temblor, insomnio, fatiga, diarrea, disminución de la libido y otras.

**Presentación**  
30  
Comprimidos  
Recubiertos





## ESOMEPRAZOL 40

Esomeprazol 40 mg



**Indicaciones:** Se usa para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, una afección en la que el reflujo retrógrado del contenido gástrico provoca acidez estomacal y posibles lesiones del esófago, también se usa para disminuir la probabilidad de que las personas que están tomando medicamentos antiinflamatorios no esteroides, desarrollen úlceras.  
RA/ Diarreas, estreñimiento, náuseas, cefalea, fatiga, flatulencia, dolor abdominal y otras.

**Presentación**  
30  
Comprimidos  
Recubiertos

## FLUCONAZOL 150

Fluconazol 150 mg



**Indicaciones:** Se usa para tratar las infecciones por hongos, incluidas las infecciones por levaduras de la vagina, la boca, la garganta, el esófago, el abdomen, los pulmones, la sangre y otros órganos. También se usa para tratar la meningitis provocada por hongos, prevenir las infecciones por levaduras en pacientes tratados con quimioterapia o radioterapia antes de un trasplante de médula ósea. RA/ Cefalea, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, flebitis, vértigo, somnolencia, rubor y otras.

**Presentación**  
1  
Cápsula

## FLUOXETINA 20

Fluoxetina 20 mg



**Indicaciones:** Adultos: Episodio depresivo mayor. Trastorno obsesivo-compulsivo. Bulimia nerviosa: Fluoxetina está indicado como complemento a la psicoterapia para la reducción de los atracones y las purgas. Niños a partir de los 8 años y adolescentes: Para episodios depresivos de moderados a graves, si no hay respuesta a la terapia psicológica después de 4 a 6 sesiones. El tratamiento antidepresivo debe ofrecerse a los niños o jóvenes con depresión de moderada a severa sólo en combinación con la terapia psicológica concurrente.  
RA/ Náuseas, insomnio, fatiga y diarrea.

**Presentación**  
30  
Cápsulas

## GABAPENTINA 300

Gabapentina 300 mg



**Indicaciones:** Se administra comunmente para el tratamiento del dolor neuropático generalmente definido como dolor debido al daño nervioso, (dolor persistente en un sitio afectado anteriormente por herpes zóster) y complicaciones dolorosas de la diabetes, dolor por lesiones nerviosas, dolor de miembro fantasma, fibromialgia y neuralgia del trigémino.  
RA/ Mareos, somnolencia y edema periférico.

**Presentación**  
30  
Cápsulas

## GLIBENCLAMIDA 5

Glibenclamida 5



**Indicaciones:** Diabetes melitus no insulino dependiente (tipo 2) en el adulto cuando las medidas dietéticas, el ejercicio físico y la pérdida de peso no son suficientes por sí solos para lograr un control adecuado de la glucemia. RA/ Ocasionalmente pueden ocurrir síntomas gastrointestinales como náuseas, dolor abdominal y diarrea.

**Presentación**  
30  
Comprimidos  
Recubiertos



ADIUVO®



VADEMECUM



## GLICLAZIDA 60 MR

Gliclazida 60 mg


**Indicaciones:** Diabetes melitus no insulino dependiente (tipo 2) en el adulto cuando las medidas dietéticas, el ejercicio físico y la pérdida de peso no son suficientes por sí solos para controlar la glucemia. RA: La reacción adversa más frecuente con Gliclazida es hipoglucemia. Al igual que otras sulfonilureas, el tratamiento con Gliclazida Adiuvo puede provocar hipoglucemia, si los horarios de las comidas son irregulares y, en particular, si se saltan comidas. Los posibles síntomas de hipoglucemia son: cefalea, hambre intensa, náuseas, vómitos, astenia, alteraciones del sueño, nerviosismo, agresividad, falta de concentración.

**Presentación**

30  
Tabletas

## GLUCOSAMINA SULFATO + CONDROITINA SULFATO SÓDICO

Glucosamina Sulfato 1500 mg + Condroitina Sulfato Sódico 1200 mg



**Indicaciones:** Está indicado en enfermedad osteo-articular degenerativa, osteoartritis primarias y secundarias: Artrosis cervical, coxofemoral, artrosis de la rodilla, lumbar, dorsal y sacral, escapilohumoral, distrofias osteo-articulares. RA/ Trastornos gastrointestinales

**Presentación**

30  
Sobres

## IBUPROFENO 400

Ibuprofeno 400 mg



**Indicaciones:** Es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) el cual es empleado para el tratamiento de artritis reumatoide, espondilitis anquilopoyetica y otros procesos reumáticos agudos y crónicos. Tratamiento de procesos dolorosos de intensidad leve y moderada como el dolor dental y cefaleas. Tratamiento sintomatológico de la fiebre en cuadros febriles de etiología diversa. RA/Anemia, náuseas, dispepsia, xerostomía, dolor epigástrico, diarrea, vértigo, cefalea y otras.

**Presentación**

100  
Comprimidos  
Recubiertos

## IBUPROFENO 600

Ibuprofeno 600 mg



**Indicaciones:** Es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) el cual es empleado para el tratamiento de artritis reumatoide, espondilitis anquilopoyetica y otros procesos reumáticos agudos y crónicos. Tratamiento de procesos dolorosos de intensidad leve y moderada como el dolor dental y cefaleas. Tratamiento sintomatológico de la fiebre en cuadros febriles de etiología diversa. RA/Anemia, náuseas, dispepsia, xerostomía, dolor epigástrico, diarrea, vértigo, cefalea y otras.

**Presentación**

100  
Comprimidos  
Recubiertos

## INDAPAMIDA SR 1.5

Indapamida 1.5 mg



**Indicaciones:** Es un diurético administrado para reducir la inflamación y la retención de líquido provocada por los problemas al corazón. También se usa para tratar la hipertensión. Funciona al hacer que los riñones eliminen el agua y la sal innecesarias a través de la orina. RA/ Hipocalcemia, arritmias, hipotensión, fotosensibilidad, depleción electrolítica y otras.

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertos



## INTIDIVA

Jabón Íntimo

**Indicaciones:** Intidiva es un producto de higiene íntima que ayuda a restaurar los niveles normales de PH y proporciona protección natural contra la sensibilidad, picazón, irritación, flujos y olores no deseados.

**Presentación**

200 ml

## IBESARTAN 300 + AMLODIPINA 5

Ibesartan 300 mg + Amlopídina 5 mg

**Indicaciones:** Acción aditiva del efecto antihipertensivo de ambos fármacos. Tanto los antagonistas del receptor ATI como los bloqueantes de los canales del calcio disminuyen la presión arterial mediante la reducción de la resistencia periférica, pero el bloqueo del ingreso de calcio y la disminución de la vasoconstrucción causada por la angiotensina II son mecanismos complementarios. RA/: Puede causar mareo.

**Presentación**

30  
Comprimidos  
Recubiertos



## IBESARTÁN 150

Ibesartan 150 mg

**Indicaciones:** Pertenece al grupo de medicamentos conocidos como antagonistas de los receptores de la angiotensina-II. Se utiliza para tratar la presión arterial elevada (hipertensión esencial) para proteger el riñón en pacientes con la presión arterial elevada, diabetes tipo 2 y con evidencia clínica de función del riñón alterada. RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga, ansiedad, rash, diarrea, infección urinaria o respiratoria, tos, dispepsia.

**Presentación**

28  
Tabletas  
Recubiertas



## IBESARTÁN 300

Ibesartán 300 mg

**Indicaciones:** Pertenece al grupo de medicamentos conocidos como antagonistas de los receptores de la angiotensina-II. Se utiliza para tratar la presión arterial elevada (hipertensión esencial) para proteger el riñón en pacientes con la presión arterial elevada, diabetes tipo 2 y con evidencia clínica de función del riñón alterada. RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga, ansiedad, rash, diarrea, infección urinaria o respiratoria, tos, dispepsia.

**Presentación**

28  
Tabletas  
Recubiertas



## IRBESARTÁN 150 + HIDROCLOROTIAZIDA 12.5

Irbesartán 150 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg

**Indicaciones:** Sirve para tratar la presión arterial alta. También se usa para tratar enfermedad del riñón provocada por la diabetes en pacientes con diabetes tipo 2 y presión arterial alta. Esta combinación se recomienda cuando hay ciertos pacientes que no responden a una monoterapia de solo Irbesartan, sino que es necesario, una combinación con un diurético, en este caso Hidroclorotiazida, para poder controlar su volumen sanguíneo y bajar su presión arterial. RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga, ansiedad, diarrea y otras

**Presentación**

28  
Tabletas  
Recubiertas





ADIUVO®



VADEMECUM

## IRBESARTÁN 300 + HIDROCLOROTIAZIDA 12.5

Irbesartán 300 mg +Hidroclorotiazida 12.5 mg



**Indicaciones:** Sirve para tratar la presión arterial alta. También se usa para tratar enfermedad del riñón provocada por la diabetes en pacientes con diabetes tipo 2 y presión arterial alta. Esta combinación se recomienda cuando hay ciertos pacientes que no responden a una monoterapia de solo Irbesartan, sino que es necesario, una combinación con un diurético, en este caso Hidroclorotiazida, para poder controlar su volumen sanguíneo y bajar su presión arterial. RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga, ansiedad, diarrea y otras

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas

## IRBESARTÁN 300 + HIDROCLOROTIAZIDA 25

Irbesartán 300 mg +Hidroclorotiazida 25 mg



**Indicaciones:** Sirve para tratar la presión arterial alta. También se usa para tratar enfermedad del riñón provocada por la diabetes en pacientes con diabetes tipo 2 y presión arterial alta. Esta combinación se recomienda cuando hay ciertos pacientes que no responden a una monoterapia de solo Irbesartan, sino que es necesario, una combinación con un diurético, en este caso Hidroclorotiazida, para poder controlar su volumen sanguíneo y bajar su presión arterial. RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga, ansiedad, diarrea y otras

**Presentación**

28  
Tabletas  
Recubiertas

## LANSOPRAZOL 30

Lansoprazol 30 mg



**Indicaciones:** Pertenece a una clase de compuestos antisecretores, ha sido caracterizado como un inhibidor de la bomba de ácido gástrico, ya que bloquea el paso final de la producción de ácido. Es indicado para el tratamiento de úlceras duodenal y gástrica, tratamiento de esofagitis por reflujo y profilaxis de esofagitis por reflujo. RA/ Diarrea, estreñimiento, náuseas, cefaleas, fatiga, aumento de apetito

**Presentación**

100 Cápsulas  
de liberación  
Retardada

## LEFLUNOMIDA 20

Leflunomida 20 mg



**Indicaciones:** La Leflunomida es un medicamento inmunosupresor que se emplea principalmente para el tratamiento de la artritis reumatoide y la artritis psoriásica. Actúa provocando un bloqueo en la síntesis de pirimidina. RA/ Leucopenia; leves reacciones alérgicas; anorexia, pérdida de peso; cefalea, mareo, parestesia, neuropatía periférica.

**Presentación**

30  
Comprimidos  
Recubiertos

## LEVOFLOXACINA 500

Levofloxacin 500 mg



**Indicaciones:** Es un antibiótico del grupo de las quinolonas es efectivo en contra de un buen número de bacterias Gram positivas y Gram negativas, por lo que se considera un antibiótico de amplio espectro. Por esa razón, se acostumbra administrar la Levofloxacin de manera empírica en infecciones como la neumonía bacteriana, adquirida en la comunidad o infecciones urinarias antes de que se conozca el organismo causal específico. RA/ Mareo, cefalea, náuseas, temblor, vaginitis, flatulencia y otras.

**Presentación**

30  
Comprimidos  
Recubiertos



## LEVOFLOXACINA 750

Levofloxacin 750 mg



**Indicaciones:** Es un antibiótico del grupo de las quinolonas es efectivo en contra de un buen número de bacterias Gram positivas y Gram negativas, por lo que se considera un antibiótico de amplio espectro. Por esa razón, se acostumbra administrar la Levofloxacin de manera empírica en infecciones como la neumonía bacteriana, adquirida en la comunidad o infecciones urinarias antes de que se conozca el organismo causal específico. RA/ Mareo, cefalea, náuseas, temblor, vaginitis, flatulencia y otras.

**Presentación**

**10  
Comprimidos  
Recubiertos**

## LOSARTÁN 50

Losartán Potásico 50 mg



**Indicaciones:** Tratamiento de la hipertensión esencial en adultos y niños y adolescentes de 6 a 18 años de edad. Tratamiento de la enfermedad renal en pacientes adultos con hipertensión y diabetes tipo 2 con proteinuria > 0.5 g/día como parte del tratamiento antihipertensivo. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica en pacientes adultos cuando el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) no se considera adecuado debido a incompatibilidad, especialmente tos, o contraindicación.

**Presentación**

**30  
Comprimidos  
Recubiertos**

## LOSARTÁN 100

Losartán Potásico 100 mg



**Indicaciones:** Tratamiento de la hipertensión esencial en adultos y niños y adolescentes de 6 a 18 años de edad. Tratamiento de la enfermedad renal en pacientes adultos con hipertensión y diabetes tipo 2 con proteinuria > 0.5 g/día como parte del tratamiento antihipertensivo. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica en pacientes adultos cuando el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) no se considera adecuado debido a incompatibilidad, especialmente tos, o contraindicación.

**Presentación**

**30  
Comprimidos  
Recubiertos**

## LOSARTÁN 50 + HIDROCLOROTIAZIDA 12.5

Losartán Potásico 50 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg



**Indicaciones:** Tratamiento de la hipertensión esencial en adultos, niños y adolescentes de 6-18 años de edad. Tratamiento de la enfermedad renal en pacientes adultos con hipertensión y diabetes tipo 2 con proteinuria superior 0.5 g/día como parte del tratamiento antihipertensivo. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica en pacientes adultos cuando el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) no se considera adecuado debido a incompatibilidad, especialmente tos, o contraindicación.

**Presentación**

**30  
Tabletas  
Recubiertas**

## LOSARTÁN 100 + HIDROCLOROTIAZIDA 25

Losartán Potásico 100 mg + Hidroclorotiazida 25 mg



**Indicaciones:** Losartán potásico pertenece a un grupo de medicamentos llamados antagonistas de los receptores de la angiotensina II. Se usa para tratar la presión sanguínea elevada. Es una alternativa adecuada para aquellas personas que tendrían que ser tratadas con Losartán Potásico e Hidroclorotiazida administrados en comprimidos por separado. RA/ Cefaleas, mareos, hipercalemia, diarrea y otros

**Presentación**

**30  
Comprimidos  
Recubiertos**



### LORATADINA 10

Loratadina 10 mg



**Indicaciones:** Se indica para aliviar los síntomas de urticaria crónica y otras afecciones alérgicas dermatológicas. También funciona para el tratamiento y control de los síntomas de la rinitis alérgica, como estornudos, rinorrea y prurito. A su vez ayuda al alivio de la conjuntivitis alérgica y sus síntomas tales como lagrimeo y escozor de ojos. RA/ Fatiga, sedación, cefalea, alopecia, nerviosismo, xerostomía y otras

**Presentación**

30  
Tabletas

### LORATADINA JARABE

Loratadina 5 mg / 5 mL



**Indicaciones:** Su presentación está indicada para pacientes pediátricos, geriátricos o pacientes que presentan problemas al deglutir. Se indica para aliviar los síntomas de urticaria crónica y otras afecciones alérgicas dermatológicas. También funciona para el tratamiento y control de los síntomas de la rinitis alérgica, como estornudos, rinorrea y prurito. A su vez ayuda al alivio de la conjuntivitis alérgica y sus síntomas tales como lagrimeo y escozor de ojos. RA/ Fatiga, sedación, cefalea, alopecia, nerviosismo, xerostomía y otras

**Presentación**

60 ml  
Jarabe

### MELOXICAN + GLUCOSAMINA SULFATO

Meloxicam 15 mg + Glucosamina Sulfato 1500 mg



**Indicaciones:** Indicado en el tratamiento de la inflamación y el dolor presentes en la osteoartritis, Presentación periartritis de hombro, cadera y rodilla. alivia el dolor, tanto en reposo como durante el movimiento de forma significativa, mejorando la movilidad a corto y mediano plazo. Ofrece una acción sintomática rápida e inicia en proceso de suspensión de la progresión de la osteoartritis. RA/ Trastornos gastrointestinales

**Presentación**

30  
Sobres

### MELOXICAN 15

Meloxicam 15 mg



**Indicaciones:** El meloxicam es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) de la familia de los oxicam, con propiedades antiinflamatorias, analgésicas, y antipiréticas. RA/ Puede causar mareo.

**Presentación**

30  
Tabletas

### METFORMINA 750 XR

Metformina Clorhidrato 750 mg



**Indicaciones:** Metformina está indicada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para el control de la hiperglicemia que no puede ser controlada mediante dieta, ejercicio o disminución de peso, o cuando la terapia con insulina no es requerida o posible. RA/ Molestias gastrointestinales, anorexia, acidosis láctica, disminución de vitamina B12, anemia aplásica o hemolítica

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertos



## METFORMINA 850

Metformina Clorhidrato 850 mg

**Indicaciones:** Está indicado en conjunto con la dieta y el ejercicio para mejorar el control glicémico en adultos con diabetes tipo II. Puede utilizarse concomitantemente con una sulfonilurea o insulina para mejorar el control glicémico.  
RA/ Molestias GI, anorexia, acidosis láctica, disminución de vitamina B12, anemia aplásica o hemolítica

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas



## METFORMINA 1000 + GLIMEPIRIDA 2

Metformina 1000 mg + Glibenclamida 2 mg

**Indicaciones:** Está indicado en el tratamiento de la diabetes melitus tipo II, cuando la dieta, el ejercicio físico y la reducción de peso por sí solos no son adecuados. RA/: Náuseas, Vómitos, y diarrea, sensación de pesadez de estómago, dolor abdominal. Sobre todo al inicio del tratamiento.

**Presentación**

50  
Tabletas  
Recubiertas



## METFORMINA 1000 + GLIMEPIRIDA 4

Metformina 1000 mg + Glibenclamida 4 mg

**Indicaciones:** Está indicado en el tratamiento de la diabetes melitus tipo II, cuando la dieta, el ejercicio físico y la reducción de peso por sí solos no son adecuados. RA/: Náuseas, Vómitos, y diarrea, sensación de pesadez de estómago, dolor abdominal. Sobre todo al inicio del tratamiento.

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas



## METFORMINA 500 + GLIMEPIRIDA 5

Metformina 500 mg + Glibenclamida 5 mg

**Indicaciones:** Está indicado como tratamiento adjunto a dieta y ejercicio para controlar la hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (no dependiente de la insulina).  
RA/: Es un medicamento bien tolerado, as reacciones secundarias guardan relación directa con la dosis, son transitorios y responden a la reducción de la dosis o a la suspensión del medicamento.

**Presentación**

40  
Comprimidos  
Recubiertos



## METFORMINA 1000 + GLIMEPIRIDA 5

Metformina 1000 mg + Glibenclamida 5 mg

**Indicaciones:** Está indicado como tratamiento adjunto a dieta y ejercicio para controlar la hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (no dependiente de la insulina).  
RA/: Es un medicamento bien tolerado, as reacciones secundarias guardan relación directa con la dosis, son transitorios y responden a la reducción de la dosis o a la suspensión del medicamento.

**Presentación**

40  
Comprimidos  
Recubiertos



ADIUVO®



VADEMECUM



### MONTELUKAST 4

Montelukast Sódico UPS 4 mg

**Indicaciones:** Se usa para prevenir la dificultad para respirar, la opresión en el pecho, la sibilancia y la tos que el asma causa. También se usa para prevenir el broncoespasmo durante el ejercicio. Se emplea, igualmente, para tratar los síntomas de la rinitis alérgica tanto estacional como permanente. Pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor del leucotrieno. RA/ Cefalea y fatiga.

**Presentación**

30  
Tabletas  
Masticables



### MONTELUKAST 5

Montelukast Sódico 5 mg

**Indicaciones:** Se usa para prevenir la dificultad para respirar, la opresión en el pecho, la sibilancia y la tos que el asma causa. También se usa para prevenir el broncoespasmo durante el ejercicio. Se emplea, igualmente, para tratar los síntomas de la rinitis alérgica tanto estacional como permanente. Pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor del leucotrieno. RA/ Cefalea y fatiga.

**Presentación**

30  
Comprimidos  
Masticables



### MONTELUKAST 10

Montelukast Sódico 10 mg

**Indicaciones:** Se usa para prevenir la dificultad para respirar, la opresión en el pecho, la sibilancia y la tos que el asma causa. También se usa para prevenir el broncoespasmo durante el ejercicio. Se emplea, igualmente, para tratar los síntomas de la rinitis alérgica tanto estacional como permanente. Pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor del leucotrieno. RA/ Cefalea y fatiga.

**Presentación**

30  
Comprimidos  
Masticables



### NEUPENTIN

Gabepentina 300 mg + Mononitrato de Tiamina (Vitamina B1) 100 mg + Cianocobalamina (Vitamina B12) 0.20 mg

**Indicaciones:** Pertenece a un grupo de medicamentos que se utilizan para el tratamiento de dolores neuropáticos periféricos, como la neuropatía diabética dolorosa y en la neuralgia post-herpética en adultos. Es también empleado en el síndrome del miembro fantasma, neuropatía en pacientes con cáncer y neuropatía posteriores a un cuadro de herpes zóster. RA/ Mareos, somnolencia y edema periférico

**Presentación**

30  
Tabletas



### NIFEDIPINA SR

Nifedipina 20 mg

**Indicaciones:** Angina de pecho crónica estable (angina de esfuerzo). Tratamiento de la hipertensión arterial. RA/: La nifedipina puede limitar la capacidad de reacción. Debe tenerse precaución al conducir automóviles u otros vehículos y en el manejo de máquinas peligrosas. Especialmente al inicio del tratamiento, cuando se cambie la medicación o en combinación con bebidas alcohólicas.

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas





## NITAZOXANIDA 100/5

Nitazoxanida 100 mg / 5 ml

**Indicaciones:** La nitazoxanida se usa en niños y adultos para tratar la diarrea causada por el protozoo criptosporidio o giardia. Se sospecha que una diarrea es causada por protozoos cuando dura más de 7 días. La nitazoxanida pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes antiprotozoarios. Funciona al detener el crecimiento de protozoos que causan diarrea. RA/ Náuseas, vómito, cefalea, diarrea, dolor abdominal y otras

**Presentación**

**30 ml  
Polvo para  
Suspensión**



## NITAZOXANIDA 500

Nitazoxanida 500 mg

**Indicaciones:** Está indicado para el tratamiento de amebiasis intestinal aguda o disentería amebiana causada por Entamoeba histolytica. Es poco probable que se presente sobredosificación. En caso de sobredosis, vaciar el estómago con lavado gástrico después de la administración. Pacientes en donde la sobredosis es intencional se debe referir al psiquiatra.

**Presentación**

**6  
Tabletas  
Recubiertas**



## OLMESARTÁN 20 / OLMESARTÁN 40

Olmesartán Medoxomil 20/40 mg

**Indicaciones:** Se utiliza en el tratamiento de la presión arterial alta (también conocida como hipertensión) en adultos, en niños y adolescentes de 6 a menos de 18 años de edad. RA/ En casos raros puede causar mareo, inflamación de la cara, boca y/o laringe, junto con picor y erupción cutánea. Si esto le sucede, deje de fumar Olmesartán y consulte inmediatamente a su médico.

**Presentación**

**28/30  
Tabletas  
Recubiertas**



## OMEPRAZOL 20

Omeprazol 20 mg

**Indicaciones:** Tratamiento de la ulcera duodenal y de la ulcera gástrica benigna, incluyendo las que complican los tratamientos con fármacos antiinflamatorios no esteroides (AINEs). Reflujo gastroesofágico RA/ Náuseas, diarrea, cefalea, estreñimiento, flatulencia, a ngina de pecho, constipación, anorexia, decoloración fecal, colon irritable, sequedad de boca y otras. RA/ Náuseas, diarrea, cefalea, estreñimiento, flatulencia, angina de pecho, constipación, anorexia, decoloración fecal, colon irritable, sequedad de boca y otras.

**Presentación**

**100  
Cápsulas  
Gastroresistentes**



## PANTOPRAZOL 40

Pantoprazol 40 mg

**Indicaciones:** Está indicado para adultos y adolescentes a partir de 12 años para: Esofagitis por reflujo. Pantoprazol está indicado para adultos: Erradicación de helicobacter pylori en combinación con terapia antibiótica adecuada en pacientes con asociados a úlceras. Úlceras gástricas Síndrome de Zollinger Ellison y otras enfermedades hipersecretoras patológicas. RA/ Cefalea, diarrea, mareos, prurito y otras.

**Presentación**

**30  
Comprimidos  
Recubiertos  
Enterico**



ADIUVO®



VADEMECUM

## PREGABALINA 150

Pregabalina 150 mg



**Indicaciones:** Tratamiento del dolor neuropático asociado a neuropatía diabética periférica. Tratamiento de la neuralgia post herpética. Terapia adyuvante para pacientes adultos con crisis convulsivas parciales. Tratamiento de la fibromialgia. Tratamiento del dolor neuropático asociado a lesión de la médula espinal. RA/ Somnolencia, fatiga, ataxia, mareos, cefalea, temblor, diplopía, trastornos gastrointestinales, nerviosismo, amnesia, impotencia, xerostomía, aumento de apetito y otras.

**Presentación**

30  
Cápsulas

## PREGABALINA 75

Pregabalina 75 mg



**Indicaciones:** Se usa para prevenir la dificultad para respirar, la opresión en el pecho, la sibilancia y la tos que el asma causa. También se usa para prevenir el broncoespasmo durante el ejercicio. Se emplea, igualmente, para tratar los síntomas de la rinitis alérgica tanto estacional como permanente. Pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor del leucotrieno. RA/ Cefalea y fatiga.

**Presentación**

30  
Cápsulas

## RANITIDINA 150

Ranitidina 150 mg



**Indicaciones:** Ranitidina es un antagonista específico del receptor de histamina H2 de acción rápida. Inhibe la secreción basal y estimulada de ácido gástrico, reduciendo el volumen y el contenido de ácido y pepsina de la secreción. Está indicada para el tratamiento de úlceras gástricas benignas y úlceras duodenales, incluyendo aquellas asociadas con agentes antiinflamatorios no esteroideos. RA/ Trastornos hepáticos; pancreatitis aguda, cefalea, mareos, diarrea, vomito, constipación, anemia, ginecomastia, fiebre y otras.

**Presentación**

100  
Comprimidos  
Recubiertos

## RANITIDINA 300

Ranitidina 300 mg



**Indicaciones:** Ranitidina es un antagonista específico del receptor de histamina H2 de acción rápida. Inhibe la secreción basal y estimulada de ácido gástrico, reduciendo el volumen y el contenido de ácido y pepsina de la secreción. Está indicada para el tratamiento de úlceras gástricas benignas y úlceras duodenales, incluyendo aquellas asociadas con agentes antiinflamatorios no esteroideos. RA/ Trastornos hepáticos; pancreatitis aguda, cefalea, mareos, diarrea, vomito, constipación, anemia, ginecomastia, fiebre y otras.

**Presentación**

100  
Comprimidos  
Recubiertos

## ROSUVASTATINA 10

Rosuvastatina 10 mg



**Indicaciones:** Adultos, adolescentes y niños de edad igual o mayor de 6 años con hipercolesterolemia primaria (tipo 2 a, incluyendo hipercolesterolemia familiar heterocigótica) o dislipemia mixta (tipo 2 b) como media complementaria a la dieta cuando la respuesta obtenida con la dieta y otros tratamientos no farmacológicos (p. ej, ejercicio, pérdida de peso) no ha sido adecuada. Adultos, adolescentes y niños de edad igual o mayor de 6 años con hipercolesterolemia familiar homocigótica en tratamiento combinando con dieta y otros tratamientos hipolipemientes (p. ej, aferesis de las LDL) o dichos tratamientos no son apropiados.

RA/ Tos, disnea, estreñimiento, náuseas, dolor abdominal, diarrea, prurito, exantema, urticaria.

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas



## ROSUVASTATINA 20

Rosuvastatina 20 mg



**Indicaciones:** Se encuentra en una clase de medicamentos llamados inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Retrasar la producción de colesterol en el cuerpo para disminuir la cantidad de colesterol que se puede acumular en las paredes de las arterias y bloquear el flujo sanguíneo al corazón, cerebro y otras partes del cuerpo.  
RA/ Cefalea, mareos, constipación, náuseas, dolor abdominal, mialgias, astenia y otras

**Presentación**

**30  
Comprimidos  
Recubiertos**

## RUPATADINA

Rupatadina 10 mg



**Indicaciones:** Tratamiento sistémico de la rinitis alérgica y la urticaria en adultos y adolescentes (mayores de 12 años)  
RA/: Somnolencia, cefalea, mareo.

**Presentación**

**100  
Comprimidos  
Recubiertos**

## SACCHAROMYCES BOULARDII 200

Saccharomyces Boulardii 200 mg



**Indicaciones:** Tratamiento de la diarrea del viajero, diarrea viral en niños y diarrea asociada con antibióticos. Tratamiento del síndrome del intestino irritable. Tratamiento y prevención de complicaciones digestivas después de la terapia con antibióticos: diarrea, colitis, candidiasis. Prevención de la diarrea durante la alimentación enteral continua en adultos.

**Presentación**

**30  
Sobres**

## SERTRALINA 50

Sertralina 50 mg



**Indicaciones:** Episodios depresivos mayores. Prevención de recurrencia de episodios depresivos mayores.  
Trastorno de angustia, con o sin agorafobia.  
Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) en adultos y pacientes pediátricos de 6-17 años.  
Trastorno de ansiedad social (fobia social)  
Trastorno por estrés post-traumático (TEPT)  
RA/: Las náuseas son la reacción adversa más frecuente.

**Presentación**

**30  
Tabletas  
Recubiertas**

## SILDENAFIL 50

Sildenafil 50 mg



**Indicaciones:** Es un inhibidor potente y selectivo de Guanosin Monofosfatocíclico Fosfodiesterasa (GMPc), responsable de la acción periférica sobre las erecciones, siendo indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil.  
RRA/ Cefalea, rubor, mareos, dispepsia, diarrea, trastornos visuales, congestión nasal y otras.

**Presentación**

**4  
Comprimidos  
Recubiertos**



ADIUVO®



VADEMECUM

## SILDENAFIL 100

Sildenafil 100 mg



**Indicaciones:** Es un inhibidor potente y selectivo de Guanosin Monofosfatocíclico Fosfodiesterasa (GMPc), responsable de la acción periférica sobre las erecciones, siendo indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil.  
RRA/ Cefalea, rubor, mareos, dispepsia, diarrea, trastornos visuales, congestión nasal y otras.

**Presentación**

4  
Comprimidos  
Recubiertos

## TAMSULOSINA 0.4

Tamsulosina Clorhidrato 0.4 mg



**Indicaciones:** Se usa en hombres para tratar los síntomas del agrandamiento de la próstata (hiperplasia prostática benigna) que incluye dificultad para orinar (intermitencia, goteo, debilidad en el flujo de orina y vaciado incompleto de la vejiga), dolor al orinar y necesidad de orinar con más frecuencia y urgencia.  
RA/ Mareos, edema, cefalea, náuseas, diarrea, eyaculación anormal, palpitaciones, somnolencia, debilidad y otras

**Presentación**

30  
Cápsulas

## TELMISARTÁN 80

Telmisartán 80 mg



**Indicaciones:** Telmisartán está indicado para la hipertensión esencialmente en adultos, prevención cardiovascular, enfermedad cardiovascular aterosclerótica o enfermedad arterial periférica. Diabetes melitus tipo 2 con lesión de órgano diana documentada.  
RA/ Diarrea, angioedema, dolor de espalda, infecciones respiratorias y otras.

**Presentación**

30  
Tabletas

## TRAMADOL 50

Tramadol Clorhidrato 50 mg



**Indicaciones:** El Tramadol es un analgésico opiáceo de acción central. Es un antagonista puro no selectivo en los receptores de opiáceos  $\mu$ ,  $\delta$  y  $\kappa$  con una afinidad mayor para el receptor, por lo que es un medicamento utilizado para el tratamiento de dolor de intensidad moderada a severa y tiene un efecto antitusivo.  
RA/ Somnolencia, sudoración, mareos, vómitos, xerostomía, cansancio, alteraciones cardiovasculares, cefaleas y otras.

**Presentación**

100  
Cápsulas

## TRIDIUVO

Clotrimazol 1% + Neomicina 0.5% + Betametasona 0.05%



**Indicaciones:** Antiinflamatorio, antibacteriano, antimicótico tópico.

Afecciones inflamatorias, micóticas y bacterianas de la piel, causadas por gérmenes sensibles al clotrimazol y/o a la neomicina. Dermatitis por contacto, seborreica, eccema.  
RA/ Hipersensibilidad a alguno de los componentes, afecciones tuberculosas o virales de la piel.

**Presentación**

Crema Tópica  
20 gramos



## TRIMETAZIDINA 35 MR

Clorhidrito de Trimetazidina 35 mg

**Indicaciones:** La Trimetazidina está indicada en adultos como terapia adicional para el tratamiento sintomático de pacientes con angina de pecho estable que no están adecuadamente controlados o no toleran terapias anti anginosas de primera línea.  
RA/ Cefalea, rubor facial, taquicardia refleja, hipotensión, bradicardia, desmayo, mareos y otros.

**Presentación**

**30  
Tabletas  
Recubiertas**



## VERAPAMILO 240 SR

Verapamilo Clorhidrato 240 mg

**Indicaciones:** El clorhidrato de verapamilo es un bloqueante de los canales de calcio activo por vía oral se administra para el tratamiento de la angina, la hipertensión y las taquiarritmias supraventriculares.  
RA/ Bradicardia, hipotensión, rash, mareos, fatiga, cefalea y otras.

**Presentación**

**20  
Tabletas**



## VITANEURAL 25,000

Vitamina B1 + B6 + B12

**Indicaciones:** Está indicado, para la salud, un importante beneficio es el incremento de nuestra capacidad de memoria y concentración. Se ha visto que sobre todo en las personas mayores la ingesta de vitaminas del complejo B mejora la memoria y estabiliza el estado de ánimo.  
RA/ Color rosa en la orina, reacciones alérgicas, náuseas, vómito y otras.

**Presentación  
Solución  
Inyectable**



## VITANEURAL 1

Vitamina B1 100 mg + B6 200 mg + B12 200 mg

**Indicaciones:** Tratamiento de deficiencia grave de vitaminas B12 especialmente, y de vitaminas B1 Y B6 que podrían causar complicaciones neurológicas, de origen diverso (ej. deficiencia en la absorción, dieta insuficiente, convalecencias).

**Presentación**

**100  
Tabletas  
Recubiertas**



## VITAMINA E 400

Vitamina E 400 UI

**Indicaciones:** Prevención y tratamiento de deficiencia de vitamina E, en enfermedades con síndrome de mala absorción que cursen con esteatorrea: resecciones gastrointestinales, enfermedad celíaca.  
. Fibrosis quística  
. Enfermedad del tracto hepato-biliar (colestasis crónica, obstrucción biliar, atresia biliar)  
. Abetalipoproteinemia  
RA/: Trastornos gastrointestinales: el uso durante largo tiempo de dosis mayores de 400-800 UI puede producir, raramente en general, diarrea, náuseas, flatulencia, espasmos abdominales y sangrado gingival.

**Presentación**

**30  
Cápsulas  
Recubiertas**