

VADEMECUM



ADIUVO®



*DROGUERIA EUROPEA*

**ADIUVO®**

***DROGUERIA EUROPEA***



**ADIUVO®**

**BPM**

**Buenas Prácticas  
de Manufactura**

*Adiuvo está desarrollado para las siguientes clasificaciones terapéuticas:*

- **Analgésicos**
- **Antiparasitarios**
- **Antiácidos, antiulceroso y protectores gástricos**
- **Antialérgicos**
- **Antiprostático**
- **Antimicóticos**
- **Anticonvulsivos**
- **Antirreumáticos**
- **Antidepresivos**
- **Antibióticos**
- **Antineuríticos**
- **Antiasmático**
- **Antiartríticos**
- **Antiagregante plaquetario**
- **Disfunción eréctil**
- **Expectorantes**
- **Gel íntimo de baño**
- **Hipercolesterolemia**
- **Hipoglucemiantes**
- **Musculoesquelético**
- **Regeneradores de la flora intestinal**
- **Vitaminas y Minerales**

## VADEMECUM

**Acetaminofén 500**

Acetaminofén 500 mg

**Indicaciones:**

Está indicado para el tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve a moderada y estados febriles.

RA/ Hipoglucemia y dermatitis alérgica, por lo general, raras o muy raras.

**Presentación**100  
Comprimidos**Acetaminofén 750**

Acetaminofén 750 mg

**Indicaciones:**

Está indicado para el tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve a moderada y estados febriles.

RA/ Hipoglucemia y dermatitis alérgica, por lo general, raras o muy raras.

**Presentación**100  
Tabletas**Acetaminofén 100**

Acetaminofén 100mg/mL

**Indicaciones:**

Está indicado para el tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve a moderada y estados febriles.

RA/ Enrojecimiento de la piel, ampollas, erupción.

**Presentación**15 mL  
Suspensión Oral  
(Gotas Orales)**Aciclovir**

Aciclovir 5%

**Indicaciones:**

Esta indicado para el tratamiento de las manifestaciones tópicas del herpes simple y zoster.

RA/ Ardor, escozor, resequedad, descamación y otras.

**Presentación**15 g  
Crema Tópica**Ácido Fólico 5**

Ácido Fólico 5 mg

**Indicaciones:**

Está indicado en el tratamiento y prevención de la deficiencia de Ácido Fólico, especialmente durante la gestación, lactancia y períodos de crecimiento rápidos., También esta indicado en la prevención de las malformaciones del tubo neural (espinia bífida, meningocele, anencefalia).

RA/ Eritema, fiebre, prurito y broncoespasmo.

**Presentación**100  
Tabletas



## Ácido Ibandrónico 150


Ácido Ibandrónico 150 mg

### Indicaciones:

También llamado Ibandronato, es un medicamento que pertenece al grupo de los bifosfonatos. Está indicado en el tratamiento de la osteoporosis en mujeres que han alcanzado la menopausia.  
RA/ Dispepsia, cefalea, dolor musculoesquelético, trastornos gastrointestinales y otras.

### Presentación

1  
Tableta  
Recubierta



## Alendronato 70

Ácido Alendrónico 70 mg

### Indicaciones:

Es un bisfosfonato de segunda generación, primer fármaco que no sólo previene la pérdida de hueso, sino que origina su endurecimiento. Se trata de un potente inhibidor de la resorción ósea, pero a diferencia de otros bisfosfonatos de la primera generación, no inhibe la mineralización ósea.  
RA/ Cefalea, flatulencia, trastornos gastroesofágicos y otras.

### Presentación

4  
Tabletas



## Ambroxol 15/5

Ambroxol Clorhidrato 15mg/5 mL

### Indicaciones:

Está indicado para afecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias que requieran tratamiento secretolítico.  
RA/ Vómitos, diarrea, dispepsia, dolor abdominal, sequedad de boca, urticaria.

### Presentación

120 mL  
Jarabe



## Amitriptilina 25

Amitriptilina Clorhidrato 25 mg

### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento del trastorno depresivo mayor en adultos, tratamiento del dolor neuropático en adultos, tratamiento profiláctico de la cefalea crónica tipo tensional en los adultos, tratamiento profiláctico de la migraña en adultos y tratamiento de la enuresis nocturna en los niños de edad igual o superior a 6 años.  
RA/ Es probable que con dosis altas se produzcan arritmias cardíacas e hipotensión grave.

### Presentación

100  
Tabletas  
Recubiertas



## Amlodipina 5

Amlodipina 5mg

### Indicaciones:

Está indicado para la hipertensión arterial alta o un cierto tipo de dolor en el pecho llamado angina.  
RA/ Cefalea, somnolencia, mareo, (inicio del tto.), debilidad, palpitaciones y otras.

### Presentación

30  
Tabletas

## VADEMECUM



### Amoxicilina

Amoxicilina 500 mg

**BIOEQUIVALENTE**

**Indicaciones:**

Antibiótico utilizado para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, como neumonía; bronquitis; gonorrea; y las infecciones de los oídos, nariz, garganta, vías urinarias y la piel.  
RA/ Fiebre, trastorno gastrointestinal y otras.

**Presentación**

100  
Cápsulas



### Amoxicilina 875 + Ácido Clavulánico 125

Amoxicilina Trihidratada 875 mg + Ácido Clavulánico 125 mg

**BIOEQUIVALENTE**

**Indicaciones:**

Antibiótico utilizado para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, incluyendo infecciones en los oídos, pulmones, senos, piel y vías urinarias.  
RA/ Fiebre, trastorno gastrointestinal y otras.

**Presentación**

15  
Tabletas  
Recubiertas



### Atenolol 100


Atenolol 100 mg

**Indicaciones:**

Está indicado para tratar la hipertensión. Prevención de angina (dolor en el tórax) · Tratamiento de los ataques cardíacos. Actúa relajando los vasos sanguíneos y la disminución de la frecuencia cardíaca para mejorar el flujo sanguíneo y disminuir la presión arterial.  
RA/ Bradicardia, hipotensión, fenómeno de rainau, fatiga, náuseas y otras.

**Presentación**

100  
Tabletas



### Atorvastatina 20

Atorvastatina 20 mg

**BIOEQUIVALENTE**

**Indicaciones:**

Se utiliza junto con una dieta balanceada, pérdida de peso y ejercicio para reducir el riesgo de infarto y apoplejía y para reducir la probabilidad de que se necesite una cirugía de corazón en las personas que tienen una enfermedad del corazón o que estén en riesgo de desarrollar enfermedad del corazón.  
RA/ Cefalea, somnolencia, diarrea, dolor abdominal, mialgias y otras.

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas



### Atorvastatina 40

Atorvastatina 40 mg

**BIOEQUIVALENTE**

**Indicaciones:**

Se utiliza junto con una dieta balanceada, pérdida de peso y ejercicio para reducir el riesgo de infarto y apoplejía y para reducir la probabilidad de que se necesite una cirugía de corazón en las personas que tienen una enfermedad del corazón o que estén en riesgo de desarrollar enfermedad del corazón.  
RA/ Cefalea, somnolencia, diarrea, dolor abdominal, mialgias y otras.

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas



## Azitromicina 500

Azitromicina 500 mg


### Indicaciones:

Antibiótico utilizado para tratar ciertas infecciones bacterianas, como bronquitis, neumonía, enfermedades de transmisión sexual (ITS) e infecciones de los oídos, pulmones, senos nasales, piel, garganta y órganos reproductivos.

RA/ Diarrea, náuseas, dolor abdominal, vomito, anorexia y otras.

### Presentación

30  
Tabletas  
Recubiertas



## Bacillus Clausii

Esporas de Bacillus Clausii

### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento y profilaxis de las alteraciones de la flora intestinal. Tratamiento para la recuperación de la flora bacteriana, desordenes agudos y crónicos en lactantes

RA/ No reporta.

### Presentación

10  
Ampollas  
Bebibles



## Bisoprolol 5

Bisoprolol Fumarato 5 mg

### Indicaciones:

Es un antagonista beta adrenérgico activo por vía oral. Actúa específicamente sobre los receptores beta-1, tiene una baja solubilidad en lípidos y se elimina por vía renal y fecal. El Bisoprolol fue inicialmente aprobado para el tratamiento de la hipertensión, pero posteriormente se ha comprobado su eficacia en la cardiopatía isquémica y en la insuficiencia cardíaca.

RA/ Fatiga, bradicardia, isquemia periférica, tos y otras.

### Presentación

30  
Comprimidos  
Recubiertos



## Bisoprolol 10

Bisoprolol Fumarato 10 mg

### Indicaciones:

Es un antagonista beta adrenérgico activo por vía oral. Actúa específicamente sobre los receptores beta-1, tiene una baja solubilidad en lípidos y se elimina por vía renal y fecal. El Bisoprolol fue inicialmente aprobado para el tratamiento de la hipertensión, pero posteriormente se ha comprobado su eficacia en la cardiopatía isquémica y en la insuficiencia cardíaca.

RA/ Fatiga, bradicardia, isquemia periférica, tos y otras.

### Presentación

30  
Comprimidos  
Recubiertos



## Bisoprolol 5 + Hidroclorotiazida 6.25

Bisoprolol 5 mg + Hidroclorotiazida 6.25 mg

### Indicaciones:

Este medicamento comprende un bloqueante selectivo de receptores beta (bisoprolol) y un diurético tiazídico (Hidroclorotiazida, medicamento para eliminar agua del cuerpo). Se utiliza para tratar la presión sanguínea elevada (hipertensión primaria) en pacientes adultos cuya presión sanguínea no está suficientemente controlada con Bisoprolol o Hidroclorotiazida solos.

RA/ Fatiga, bradicardia, isquemia periférica, tos y otras.

### Presentación

30  
Comprimidos  
Recubiertos

## VADEMECUM



### Bisoprolol 10 + Hidroclorotiazida 6.25

Bisoprolol 10 mg + Hidroclorotiazida 6.25 mg

#### Indicaciones:

Este medicamento comprende un bloqueante selectivo de receptores beta (Bisoprolol) y un diurético tiazídico (Hidroclorotiazida, medicamento para eliminar agua del cuerpo). Se utiliza para tratar la presión sanguínea elevada (hipertensión primaria) en pacientes adultos cuya presión sanguínea no está suficientemente controlada con Bisoprolol o Hidroclorotiazida solos.  
RA/ Fatiga, bradicardia, isquemia periférica, tos y otras.

#### Presentación

30  
Comprimidos  
Recubiertos



### Candesartán 16 + Hidroclorotiazida 12.5

Candesartán Cilexetil 16 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg

#### Indicaciones:

El Candesartán Cilexetilo actúa bloqueando la hormona angiotensina II, lo cual causa relajación de los vasos sanguíneos y produce la disminución de la presión sanguínea. La Hidroclorotiazida pertenece a la clase de medicamentos llamados diuréticos. Su efecto es promover la excreción urinaria de sodio, cloruro y agua, lo cual da como resultado la disminución de la presión sanguínea.  
RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga y otras.

#### Presentación

28  
Tabletas



### Candesartán 32

Candesartán Cilexetil 32 mg

#### Indicaciones:

El Candesartán Cilexetilo actúa bloqueando la hormona angiotensina II, lo cual causa relajación de los vasos sanguíneos y produce la disminución de la presión sanguínea.  
RA / Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga y otras.

#### Presentación

28  
Tabletas

**BIOEQUIVALENTE**



### Calcio + D3

Citrato de Calcio 1500 mg + Vitamina D3 200 UI

#### Indicaciones:

Está indicado en los tratamientos de estados carenciales de Calcio y Vitamina D. Suplemento de Calcio y Vitamina D como terapia coadyuvante en el tratamiento específico de la osteoporosis, en pacientes con riesgo elevado de sufrir deficiencias combinadas de Calcio y Vitamina D.  
RA/ Estreñimiento, gases, vómitos, náuseas, dolor de cabeza, debilidad.

#### Presentación

30  
Tabletas  
Recubiertas

**BIOEQUIVALENTE**



### Carvedilol 25

Carvedilol 25mg

#### Indicaciones:

Antihipertensivo, antiaginoso, beta bloqueados no selectivo, alfa bloqueador y antioxidante. Está indicado para la hipertensión arterial, angina de pecho, insuficiencia cardiaca congestiva.  
RA/ Mareos, cefalea, fatiga, bradicardia, hipotensión postural y otras.

#### Presentación

30  
Tabletas



## Cefalexina 500

Cefalexina Anhidra 500 mg

### Indicaciones:

Antibiótico de primera generación de cefalosporinas con excelente actividad contra la mayoría de bacterias gram-positivas. Principalmente en el tratamiento de la otitis media y las infecciones de las vías respiratorias (por ejemplo, faringitis, amigdalitis, neumonía lobar) causadas por estafilococos susceptibles, Streptococcus pneumoniae, estreptococos del grupo A y beta-hemolíticos.  
RA / Diarrea, trastornos gastrointestinales y otras.

### Presentación

30  
Cápsulas



## Cefixima 100

Cefixima 100mg/5mL

### Indicaciones:

Antibiótico utilizado para el tratamiento de las infecciones causadas por microorganismos sensibles: Infecciones de vías respiratorias altas: Faringitis y amigdalitis. Infecciones de vías respiratorias bajas: Bronquitis aguda, episodios de reagudización de bronquitis crónica y neumonías. Infecciones ORL: Otitis media causada Infecciones de vías urinarias no complicadas causadas.  
RA/ Diarrea, heces blandas.

### Presentación

100 mL  
Polvo para  
Suspensión



## Cefixima 400

Cefixima 400 mg

### Indicaciones:

Antibiótico utilizado para el tratamiento de las infecciones causadas por microorganismos sensibles: Infecciones de vías respiratorias altas: Faringitis y amigdalitis. Infecciones de vías respiratorias bajas: Bronquitis aguda, episodios de reagudización de bronquitis crónica y neumonías. Infecciones ORL: Otitis media causada Infecciones de vías urinarias no complicadas causadas.  
RA/ Diarrea, heces blandas.

### Presentación

30  
Tabletas  
Recubiertas



## Ceftriaxona 1g IM

Ceftriaxona Sódica 1 g

### Indicaciones:

Antibiótico utilizado para tratar determinadas infecciones ocasionadas por bacterias, como la gonorrea (ITS), la meningitis y las infecciones de los pulmones, los oídos, la piel, las vías urinarias, la sangre, los huesos, las articulaciones y el abdomen. También se aplica la Ceftriaxona inyectable antes de determinados tipos de cirugía para prevenir las infecciones que pueden presentarse después de la operación.  
RA/ Diarrea, Trastornos gastrointestinales, colitis, eosinofilia y otras.

### Presentación

Polvo para  
Solución  
Inyectable



## Cilostazol 100

Cilostazol 100 mg

### Indicaciones:

Está indicado para reducir los síntomas de la claudicación intermitente (dolor en las piernas que empeora al caminar y mejora al estar en reposo, provocado por el estrechamiento de los vasos sanguíneos que irrigan sangre a las piernas) colaborando así al mejoramiento del flujo de sangre a las piernas.  
RA/ Equimosis, edema (periférico, facial), anorexia, cefalea, mareo y otras.

### Presentación

28  
Comprimidos

## VADEMECUM



### Cinarizina 75

Cinarizina 75 mg

**Indicaciones:**

Está indicado para el control de trastornos vestibulares como vértigo, tinintus, náusea y vómitos como los observados en el síndrome de Meniere.  
RA/ Produce somnolencia en un 20 al 25% de los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento.

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas



### Ciprofloxacina 500

Ciprofloxacina 500 mg

**Indicaciones:**

La Ciprofloxacina es un agente antimicrobiano de la clase de las Fluoroquinolonas. Es un activo frente a un amplio espectro de gérmenes gram-negativos aerobios, incluyendo patógenos entericos. Es administrada en tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio inferior (bronquitis, neumonías, absceso pulmonar, infecciones de la piel e infecciones de los huesos y de las articulaciones).  
RA/ Cefaleas, fatiga, trastornos gastrointestinales, vértigo, temblor y otras.

**BIOEQUIVALENTE**

**Presentación**

100  
Tabletas  
Recubiertas



### Citicolina 500

Citicolina 500 mg

**Indicaciones:**

Está indicado en el tratamiento de pacientes con lesiones cerebrales graves de naturaleza vascular o traumática, con o sin pérdida de conocimiento, para el tratamiento de daños degenerativos y lesiones vasculares cerebrales crónicas en la demencia senil. Tratamiento de los trastornos neurológicos y cognitivos asociados a los accidentes cerebrovasculares en fase aguda y sub aguda y cognitivos asociados a traumatismos craneales.  
RA/ Muy raras: alucinaciones, cefalea, vértigo, hipotensión arterial y otras.

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas



### Claritromicina 500

Claritromicina 500 mg

**Indicaciones:**

Antibiótico utilizado en infecciones del tracto respiratorio, tales como faringitis, amigdalitis y sinusitis (adecuadamente diagnosticada) infecciones del tracto respiratorio inferior, tales como bronquitis aguda, exacerbación aguda de la bronquitis crónica y de las neumonías bacterianas. Infecciones de la piel y tejidos blandos, como foliculitis, celulitis y erisipela.  
RA/ Dolor abdominal, diarreas, náuseas, vómitos.

**Presentación**

10  
Tabletas  
Recubiertas



### Clindamicina 300

Clindamicina 300 mg

**Indicaciones:**

Antibiótico utilizado para tratar ciertos tipos de infecciones bacterianas, como infecciones de los pulmones, la piel, la sangre, los órganos reproductores femeninos y los órganos internos. La Clindamicina pertenece a una clase de medicamentos llamados antibióticos tipo Lincomicina. Actúa al retardar o frenar la multiplicación de las bacterias.  
RA/ Diarrea, náuseas, trastornos gastrointestinales, mal sabor de boca y otras.

**Presentación**

50  
Cápsulas



## Clopidogrel 75

Clopidogrel 75 mg

**BIOEQUIVALENTE**

### Indicaciones:

Está indicado en pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio, un infarto cerebral o que padecen enfermedad arterial periférica establecida. Pacientes adultos que presentan un síndrome coronario agudo y pacientes adultos con fibrilación auricular.

RA/ Hematoma, epistaxis, hemorragia gastrointestinal, diarrea y otras.

### Presentación

30  
Tabletas  
Recubiertas



## Colágeno 10 Hidrolizado

Colágeno Hidrolizado 10 g

### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento, control, prevención y mejora de las siguientes enfermedades, afecciones y síntomas: mejora la salud de la piel, ayuda a aliviar el dolor, prevenir la pérdida ósea, aumenta la masa muscular y promueve la salud del corazón.

RA/ Sensación de pesadez en el estómago, diarrea leve y erupciones.

### Presentación

30 Sobres  
Polvo para  
Suspensión  
Oral



## DermaGuard SPF 50+

### Indicaciones:

DermaGuard con factor de protección 50+ (FPS50+) diseñado especialmente para brindar la protección necesaria en actividades expuestas a la radiación solar. Otorga protección contra rayos ultravioletas del tipo A y B (UVA/UVB).

### Presentación

100 mL  
Loción Tópica  
Protector Solar



## Dexametopropeno 25

Dexametopropeno 25 mg

### Indicaciones:

El Dexametopropeno es un fármaco perteneciente a la familia de los AINES (antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica). Está indicado en el tratamiento sintomático del dolor agudo de diversa etiología.

RA/ Dolor y ardor estomacal, cefalea, mareos, somnolencia y otras.

### Presentación

10  
Comprimidos  
Recubiertos



## Dexametopropeno 25 Solución Bebible

Dexametopropeno 25 mg

### Indicaciones:

El Dexametopropeno es un fármaco perteneciente a la familia de los AINES (antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica). Está indicado en el tratamiento sintomático del dolor agudo de diversa etiología.

RA/ Dolor y ardor estomacal, cefalea, mareos, somnolencia y otras.

### Presentación

10 Sobres  
Solución  
Oral



### Dexketoprofeno Inyectable 50 MG/2 mL

Dexketoprofeno Trometamol 36.9 mg

**Indicaciones:**

El Dexketoprofeno es un fármaco perteneciente a la familia de los AINES (antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica). Está indicado en el tratamiento sintomático del dolor agudo de diversa etiología. RA/ Dolor y ardor estomacal, cefalea, mareos, somnolencia y otras.

**Presentación**

10  
Ampollas  
IM / IV / Infusión IV



### Diclofenaco Sódico 50

Diclofenaco Sódico 50 mg

**Indicaciones:**

Está indicado para el tratamiento de enfermedades reumáticas crónicas inflamatorias tales como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artrosis, reumatismo extra articular, ataque agudo de gota, dismenorrea primaria, inflamaciones y tumefacciones postraumático. RA/ Cefalea, mareo, somnolencia, vértigo, insomnio y otras.

**Presentación**

100  
Tabletas con  
Recubierta  
Entérica



### Diclofenaco Potásico 100 SR

Diclofenaco Potásico 100

**Indicaciones:**

El Diclofenaco Potásico es un medicamento inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa y miembro de la familia de antiinflamatorios no esteroides (AINE). Es un miorelajante e indicado para reducir inflamaciones y como analgésico, pues reduce dolores causados por heridas menores y dolores tan intensos como la artritis. RA/ Trastornos gastrointestinales, cefaleas, mareos, vértigo y otras.

**Presentación**

100  
Cápsulas con  
Pellets de  
Liberación  
Sostenida



### Dicloxacilina 500

Dicloxacilina 500 mg

**Indicaciones:**

Antibiótico betalactámico bactericida indicado contra la mayoría de Streptococcus y Staphylococcus. Infecciones de vías respiratorias altas (amigdalitis, faringitis). Infecciones de vías respiratorias bajas (bronquitis, neumonías de focos múltiples, bronconeumonía). Infecciones de piel y tejidos blandos (furunculosis, celulitis, impétigo, impétigo ampolloso, piodermitis). Heridas infectadas por Staphylococcus. Artritis séptica, osteomielitis. RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, estomatitis y otras.

**Presentación**

100  
Cápsulas



### Dicloxacilina 125/5

Dicloxacilina 125mg/5 mL

**Indicaciones:**

Está indicado en el tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio, piel, tejidos blandos y huesos, tracto urinario, otitis, meningitis y septicemias. RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, estomatitis y otras.

**Presentación**

60 mL  
Polvo para  
Suspensión



## Diflah 500

Diosmina 450 mg + Hesperidina 50 mg

### Indicaciones:

Está indicado para el alivio a corto plazo del edema y sistemas relacionados con la insuficiencia venosa crónica RA/ Trastornos digestivos Y neurovegetativos.

### Presentación

30  
Comprimidos  
Recubiertos



## Dobesilato Cálcico 500

Dobesilato Cálcico Monohidrato 500 mg

### Indicaciones:

Actúa en las paredes capilares regulando las funciones fisiológicas deterioradas como permeabilidad creciente y resistente disminuida. Aumenta la flexibilidad del eritrocito, inhibe la hiperagregación de la plaqueta y, en la retinopatía diabética, reduce la hiperviscosidad de la sangre, mejorando así las características geológicas de la sangre y la irrigación del tejido fino.  
RA/ Trastornos gastrointestinales, erupciones cutáneas y otras.

### Presentación

100  
Cápsulas



## Dolo-NervioVital N

Tiamina (Vitamina B1) 50 mg, Piridoxina (Vitamina B6) 50 mg, Cianocobalamina (Vitamina B12) 1000 mcg, Diclofenaco Sódico 50 mg

### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de enfermedades reumáticas crónicas inflamatorias tales como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artrosis. Reumatismo extraarticular. Tratamiento sintomático del ataque agudo de gota. Tratamiento sintomático de la dismenorrea primaria. Tratamiento de inflamaciones y tumefacciones postraum. Antiinflamatorio con acción analgésica y antineurítico.  
RA/ Prurito, urticaria, erupción cutánea.

### Presentación

100  
Tabletas  
Recubiertas



## Dolo-NervioVital XR

Tiamina Monohidrato (Vitamina B1) 100 mg, Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6) 100 mg, Cianocobalamina (Vitamina B12) 1000 mcg, Diclofenaco Sódico 100 mg

### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de enfermedades reumáticas crónicas inflamatorias tales como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artrosis. Reumatismo extraarticular. Tratamiento sintomático del ataque agudo de gota. Tratamiento sintomático de la dismenorrea primaria. Tratamiento de inflamaciones y tumefacciones postraum. Antiinflamatorio con acción analgésica y antineurítico.  
RA/ Prurito, urticaria, erupción cutánea.

### Presentación

100 Tabletas  
Recubiertas de  
Liberación  
Prolongada



## Enalapril 20

Enalapril 20 mg

### Indicaciones:

El Enalapril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), utilizado en el tratamiento de la hipertensión y algunos tipos de insuficiencia cardíaca crónica.  
RA/ Alergias cutáneas, hipotensión ortostática, cefalea, tos y otras.

### Presentación

100  
Tabletas

## VADEMECUM



### Enqiovit

Multi Vitaminas y Multiminerales + Q10

**Indicaciones:**

Aporta las cantidades adecuadas de los nutrientes esenciales si usted no consume una variedad de alimentos nutritivos.  
RA/ Diarrea, urticaria, fatiga, piel enrojecida y otras.

**Presentación**

30  
Cápsulas



### Escitalopram 10

Escitalopran 10 mg

**Indicaciones:**

Está indicado para el tratamiento de la depresión (episodios depresivos mayores), trastornos de ansiedad (tales como trastorno de angustia, trastornos de ansiedad social, trastornos de ansiedad generalizada).  
RA/ Náuseas, somnolencia, xerostomía, temblor, insomnio y otras.

**BIOEQUIVALENTE**

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas



### Escitalopram 20

Escitalopran 20 mg

**Indicaciones:**

Está indicado para el tratamiento de la depresión (episodios depresivos mayores), trastornos de ansiedad (tales como trastorno de angustia, trastornos de ansiedad social, trastornos de ansiedad generalizada).  
RA/ Náuseas, somnolencia, xerostomía, temblor, insomnio y otras.

**BIOEQUIVALENTE**

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas



### Esomeprazol 20

Esomeprazol 20 mg

**Indicaciones:**

Está indicado para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, una afección en la que el reflujo retrógrado del contenido gástrico provoca acidez estomacal y posibles lesiones del esófago, también se usa para disminuir la probabilidad de que las personas que están tomando medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, desarrollen úlceras.  
RA/ Diarreas, estreñimiento, náuseas, cefaleas y otras.

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas



### Esomeprazol 40

Esomeprazol 40 mg

**Indicaciones:**

Está indicado para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, una afección en la que el reflujo retrógrado del contenido gástrico provoca acidez estomacal y posibles lesiones del esófago, también se usa para disminuir la probabilidad de que las personas que están tomando medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, desarrollen úlceras.  
RA/ Diarreas, estreñimiento, náuseas, cefaleas y otras.

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas



## Fluconazol 150

Fluconazol 150 mg

### Indicaciones:

Está indicado para tratar las infecciones por hongos, incluidas la infecciones por levaduras de la vagina, la boca, la garganta, el esófago, el abdomen, los pulmones, la sangre y otros órganos. También se usa para tratar la meningitis provocada por hongos, prevenir las infecciones por levaduras en pacientes tratados con quimioterapia o radioterapia antes de un trasplante de médula ósea.  
RA/ Cefaleas, náuseas, vomito, dolor abdominal y otras.

### Presentación

20  
Cápsulas



## Flunarizina 10

Flunarizina 10 mg

### Indicaciones:

Está indicado en la profilaxis de la migraña, para el vértigo y los trastornos vestibulares, y en trastornos vasculares cerebrales y periféricos. Se utiliza también como adyuvante en la terapia antiepiléptica en pacientes que no responden a los tratamientos estándar.  
RA/ Síntomas del trastorno del sueño, boca seca, letargo, desorientación y otras.

### Presentación

30  
Tabletas



## Fluoxetina 20

Fluoxetina 20 mg

### Indicaciones:

Está indicado para trastornos cognitivos incluidos la demencia degenerativa primaria, demencia vascular y forma intermedias de ambas, que cursan con déficit de memoria, trastornos en la concentración y humor depresivo.  
RA/ Mareos, sensación de hormigueo, trastornos del sueño, náuseas y otras.

**BIOEQUIVALENTE**

### Presentación

30  
Cápsulas



## Gabapentina 300

Gabapentina 300 mg

### Indicaciones:

Está indicada para el tratamiento del dolor neurótico, generalmente definido como dolor debido al daño nervioso, (dolor persistente en un sitio afectado anteriormente por herpes zoster) y complicaciones dolorosas de la diabetes, dolor por lesiones nerviosas, dolor de miembro fantasma, fibromialgia y neuralgia del trigémino.  
RA/ Mareos, somnolencia y edema periférico.

**BIOEQUIVALENTE**

### Presentación

30  
Cápsulas



## Ginkgo Biloba

Ginkgo Biloba 80 mg

### Indicaciones:

Está indicado en adultos para episodios depresivos mayores, trastorno obsesivo-compulsivo, bulimia nerviosa. En niños mayores de 8 años episodios depresivos moderados a graves.  
RA/ Muy rara vez molestias gastrointestinales y cefaleas. Pueden tener lugar reacciones alérgicas, que algunos autores han atribuido a la presencia de ácido ginkgólico.

### Presentación

30  
Cápsulas

## VADEMECUM

**Glibenclamida 5**

Glibenclamida 5 mg

**Indicaciones:**


Está indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus no insulino dependiente (tipo 2) en el adulto cuando las medidas dietéticas, el ejercicio físico y la pérdida de peso no son suficientes por sí solos para lograr un control adecuado de la glucemia.  
RA/ Cefalea, hambre intensa, náuseas, vómitos, somnolencia y otras.

**Presentación**100  
Comprimidos**Gliclazida 60 MR**

Gliclazida 60 mg

**Indicaciones:**

Está indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo 2) en el adulto cuando las medidas dietéticas, el ejercicio físico y la pérdida de peso no son suficientes por sí solos para controlar la glucemia.  
RA/ Cefalea, hambre intensa, náuseas, vómitos, astenia y otras.

**Presentación**30  
Tabletas de  
Liberación  
Modificada**Glimepirida 4**

Glimepirida 4 mg

**Indicaciones:**

Está indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II, cuando la dieta, el ejercicio físico y la reducción de peso por sí solos no son adecuados.  
RA/ Trombocitopenia, leucopenia, granulocitopenia, agranulocitosis, eritropenia y otras.

**Presentación**30  
Tabletas**Glucosamina sulfato + Condroitina sulfato sódico**

Glucosamina Sulfato 1500 mg + Condroitina Sulfato Sódico 1200 mg

**Indicaciones:**

Está indicado en enfermedades osteo-articular degenerativa, osteoartritis primarias y secundarias: Artrosis cervical coxofemoral, artosis de la rodilla, lumbar dorsal y sacral, escapilohumoral, distrofias osteo-articulares.  
RA/ Trastornos gastrointestinales.

**Presentación**30 Sobres  
Polvo Granulado  
para suspensión**Ibuprofeno 400**

Ibuprofeno 400 mg

**Indicaciones:**

Es un antiinflamatorio no esteroide (AINE) el cual es empleado para el tratamiento de artritis reumatoide, espondilitis anquilopoyetica y otros procesos reumáticos agudos y crónicos, procesos dolorosos de intensidad leve y moderada como el dolor dental, cefaleas y sintomático de la fiebre en cuadros febriles de etiología diversa.  
RA/ Anemia, náuseas, dispepsia, xerostomía, dolor epigástrico y otras.

**Presentación**100  
Tabletas  
Recubiertas



## Ibuprofeno 600

Ibuprofeno 600 mg

### Indicaciones:

Es un antiinflamatorio no esteroide (AINE) el cual es empleado para el tratamiento de artritis reumatoide, espondilitis anquilopoyetica y otros procesos reumáticos agudos y crónicos, procesos dolorosos de intensidad leve y moderada como el dolor dental, cefaleas y sintomático de la fiebre en cuadros febriles de etiología diversa.  
RA/ Anemia, náuseas, dispepsia, xerostomía, dolor epigástrico y otras.

### Presentación

100  
Tabletas  
Recubiertas



## Indapamida SR 1.5

Indapamida 1.5 mg

### Indicaciones:

Está indicada para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, como neumonía; bronquitis; gonorrea; y las infecciones de los oídos, nariz, garganta, vías urinarias y la piel.  
RA/ Fiebre, trastorno gastrointestinal y otras.

### Presentación

30  
Tabletas Recubiertas  
de Liberación  
Prolongada



## Intidiva

### Indicaciones:

Ayuda a restaurar los niveles normales del ph y proporciona protección natura contra la sensibilidad, picazón, irritación, flujos y olores no deseados.

### Presentación

200 mL  
Jabón Intimo



## Irbesartán 150

Irbesartán 150 mg

### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) y tratamiento de la nefropatía en pacientes adultos con diabetes tipo 2 e hipertensión como parte de su tratamiento antihipertensivo.  
RA/ Mareo, vértigo, cefalea, taquicardia.

**BIOEQUIVALENTE**

### Presentación

28  
Tabletas  
Recubiertas



## Irbesartán 300

Irbesartán 300 mg

### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) y tratamiento de la nefropatía en pacientes adultos con diabetes tipo 2 e hipertensión como parte de su tratamiento antihipertensivo.  
RA/ Mareo, vértigo, cefalea, taquicardia.

**BIOEQUIVALENTE**

### Presentación

28  
Tabletas  
Recubiertas

## VADEMECUM



### Irbesartán 300 + Amlodipina 5

Irbesartán 300 mg + Amlodipina 5 mg

#### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial).  
RA/ Mareos, hipercalcemia, diarrea, dolor abdominal o acidez estomacal y otras.

#### Presentación

30  
Tabletas  
Recubiertas

#### BIOEQUIVALENTE



### Irbesartán 150 + Hidroclorotiazida 12.5

Irbesartán 150 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg

#### Indicaciones:

Está indicado para tratar la presión arterial alta, enfermedad del riñón provocada por la diabetes en pacientes con diabetes tipo 2 y presión arterial alta. Esta combinación se recomienda cuando hay ciertos pacientes que no responden a una monoterapia de solo Irbesartán, sino que es necesario, una combinación con un diurético, en este caso Hidroclorotiazida, para poder controlar su volumen sanguíneo y bajar su presión arterial.  
RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga y otras.

#### Presentación

28  
Tabletas  
Recubiertas

#### BIOEQUIVALENTE



### Irbesartán 300 + Hidroclorotiazida 12.5

Irbesartán 300 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg

#### Indicaciones:

Está indicado para tratar la presión arterial alta, enfermedad del riñón provocada por la diabetes en pacientes con diabetes tipo 2 y presión arterial alta. Esta combinación se recomienda cuando hay ciertos pacientes que no responden a una monoterapia de solo Irbesartán, sino que es necesario, una combinación con un diurético, en este caso Hidroclorotiazida, para poder controlar su volumen sanguíneo y bajar su presión arterial.  
RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga y otras.

#### Presentación

28  
Tabletas  
Recubiertas

#### BIOEQUIVALENTE



### Irbesartán 300 + Hidroclorotiazida 25

Irbesartán 300 mg + Hidroclorotiazida 25 mg

#### Indicaciones:

Está indicado para tratar la presión arterial alta, enfermedad del riñón provocada por la diabetes en pacientes con diabetes tipo 2 y presión arterial alta. Esta combinación se recomienda cuando hay ciertos pacientes que no responden a una monoterapia de solo Irbesartán, sino que es necesario, una combinación con un diurético, en este caso Hidroclorotiazida, para poder controlar su volumen sanguíneo y bajar su presión arterial.  
RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga y otras.

#### Presentación

28  
Tabletas  
Recubiertas



### Ketorolaco 20

Ketorolaco 20 mg

#### Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento a corto plazo (≤ 5 días) del dolor moderado a severo, generalmente postoperatorio.  
RA/ Úlceras GI, sangrado, perforación, sangrado postoperatorio, insuficiencia renal aguda y otras.

#### Presentación

30  
Tabletas



## Lansoprazol 30

Lansoprazol 30 mg

### Indicaciones:

Pertenece a una clase de compuestos antisecretores, ha sido caracterizado como un inhibidor de la bomba de ácido gástrico, ya que bloquea el paso final de la producción de ácido. Es indicado para el tratamiento de úlceras duodenal y gástrica, tratamiento de esofagitis por reflujo y profilaxis de esofagitis por reflujo.

RA/ Diarrea, estreñimiento, náuseas, cefaleas, aumento de apetito.

### Presentación

100  
Cápsulas de  
Liberación  
Retardada



## Leflunomida 20

Leflunomida 20 mg

### Indicaciones:

La Leflunomida es un medicamento inmunosupresor que se emplea principalmente para el tratamiento de la artritis reumatoide y la artritis psoriásica. Actúa provocando un bloqueo en la síntesis de pirimidina.

RA/ Leucopenia, leves reacciones alérgicas, anorexia, pérdida de peso, cefalea y otras.

### Presentación

30  
Comprimidos  
Recubiertos



## Levofloxacin 500

Levofloxacin 500 mg

### Indicaciones:

Es un antibiótico del grupo de las quinolonas es efectivo en contra de un buen número de bacterias Gram positivas y Gram negativas, por lo que se considera un antibiótico de amplio espectro. Por esta razón, se acostumbra administrar la Levofloxacin de manera empírica en infecciones como la neumonía bacteriana, adquirida en la comunidad o infecciones urinarias antes de que se conozca el organismo causal específico.

RA/ Mareos, cefalea, náuseas, temblor, vaginitis y otras.

### Presentación

30  
Comprimidos  
Recubiertos



## Levofloxacin 750

Levofloxacin 750 mg

### Indicaciones:

Es un antibiótico del grupo de las quinolonas es efectivo en contra de un buen número de bacterias Gram positivas y Gram negativas, por lo que se considera un antibiótico de amplio espectro. Por esta razón, se acostumbra administrar la Levofloxacin de manera empírica en infecciones como la neumonía bacteriana, adquirida en la comunidad o infecciones urinarias antes de que se conozca el organismo causal específico.

RA/ Mareos, cefalea, náuseas, temblor, vaginitis y otras.

### Presentación

10  
Tabletas  
Recubiertas



## Linagliptina 5

Linagliptina 5 mg

### Indicaciones:

Está indicado en adultos con diabetes mellitus tipo 2 como tratamiento asociado a dieta y ejercicio para mejorar el control glucémico como: Monoterapia cuando la metformina no es adecuada debido a intolerancia o está contraindicada debido a insuficiencia renal, tratamiento en combinación.

RA/ Hipoglucemia, urticaria, tos y estreñimiento.

### Presentación

20  
Tabletas  
Recubiertas

## VADEMECUM

**Linagliptina 2.5 + Metformina 500**

Linagliptina 2.5 mg + Metformina Clorhidrato 500 mg

**Indicaciones:**

Está indicada como un complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2.  
RA/ Acidosis láctica, insuficiencia cardíaca, pancreatitis.

**Presentación**

20  
Tabletas  
Recubiertas

**Linagliptina 2.5 + Metformina 850**

Linagliptina 2.5 mg + Metformina Clorhidrato 850 mg

**Indicaciones:**

Está indicada como un complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2.  
RA/ Acidosis láctica, insuficiencia cardíaca, pancreatitis.

**Presentación**

20  
Tabletas  
Recubiertas

**Loratadina 10**

Loratadina 10 mg

**Indicaciones:**

Está indicada para aliviar los síntomas de urticaria crónica y otras afecciones alérgicas dermatológicas. También funciona para el tratamiento y control de los síntomas de la rinitis alérgica, como estornudos, rinorrea y prurito. A su vez ayuda al alivio de la conjuntivitis alérgica y sus síntomas tales como lagrimeo y escozor de ojos.  
RA/ Fatiga, sedación, cefalea, alopecia, nerviosismo y otras.

**Presentación**

30  
Tabletas

**Loratadina Jarabe**

Loratadina 5mg/5mL

**Indicaciones:**

Está indicada para pacientes pediátricos, geriátricos o pacientes que presentan problemas al deglutir. Está indicada para aliviar los síntomas de urticaria crónica y otras afecciones alérgicas dermatológicas. También funciona para el tratamiento y control de los síntomas de la rinitis alérgica, como estornudos, rinorrea y prurito. A su vez ayuda al alivio de la conjuntivitis alérgica y sus síntomas tales como lagrimeo y escozor de ojos.  
RA/ Fatiga, sedación, cefalea, alopecia, nerviosismo y otras.

**Presentación**

60 mL  
Jarabe

**Losartán 50**

Losartán Potásico 50 mg

**Indicaciones:**

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en adultos, niños y adolescentes de 6 a 18 años de edad, tratamiento de la enfermedad renal en pacientes adultos con hipertensión y diabetes tipo 2 con proteinuria > 0,5 g/día como parte del tratamiento antihipertensivo y tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica en pacientes adultos cuando el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA).  
RA/ Mareo, anemia, somnolencia, cefalea y migraña.

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas



## Losartán 100

Losartán Potásico 100 mg

### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en adultos, niños y adolescentes de 6 a 18 años de edad, tratamiento de la enfermedad renal en pacientes adultos con hipertensión y diabetes tipo 2 con proteinuria > 0,5 g/día como parte del tratamiento antihipertensivo y tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica en pacientes adultos cuando el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA).  
RA/ Mareo, anemia, somnolencia, cefalea y migraña.

### Presentación

30  
Tabletas  
Recubiertas



## Losartán 50 + Hidroclorotiazida 12.5

Losartán Potásico 50 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg

### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en pacientes cuya presión arterial no está controlada adecuadamente con Losartán o Hidroclorotiazida solos.  
RA/ Angiodema, trastornos del gusto, purpura de Henoch-Scholenin, insuficiencia renal.

### Presentación

30  
Tabletas  
Recubiertas



## Losartán 100 + Hidroclorotiazida 25

Losartán Potásico 100 mg + Hidroclorotiazida 25 mg

### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en pacientes cuya presión arterial no está controlada adecuadamente con Losartán o Hidroclorotiazida solos.  
RA/ Angiodema, trastornos del gusto, purpura de Henoch-Scholenin, insuficiencia renal.

### Presentación

30  
Tabletas  
Recubiertas



## Meloxicam 15

Meloxicam 15 mg

### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento sintomático de corta duración de las crisis agudas de Artrosis, tratamiento sintomático a largo plazo de artritis reumatoide o espondilitis anquilosante.  
RA/ Anemia, insomnio, vértigo, leucocitopenia y cefaleas.

### Presentación

30  
Tabletas



## Meloxicam + Glucosamina Sulfato

Meloxicam 15 mg + Glucosamina Sulfato 1500 mg

### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento sintomático de corto plazo de la artrosis y otras formas de reumatismo extraarticular.  
RA/ Trastornos gastrointestinales.

### Presentación

30 Sobres  
Polvo Granulado  
para suspensión  
Oral

## VADEMECUM

**Metformina 750 XR**

Metformina Clorhidrato 750 mg

**Indicaciones:**

Está indicada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para el control de la hiperglicemia que no puede ser controlada mediante dieta, ejercicio o disminución de peso, o cuando la terapia con insulina no es requerida o posible.

RA/ Molestias gastrointestinales, anorexia, acidosis láctica y otras.

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas  
de Liberación  
Extendida

**Metformina 850**

Metformina Clorhidrato 850 mg

**Indicaciones:**

Está indicado en conjunto con la dieta y el ejercicio para mejorar el control glicémico en adultos con diabetes tipo II. Puede utilizarse concomitantemente con una sulfonilurea o insulina para mejorar el control glicémico.

RA/ Molestias GI, anorexia, acidosis láctica, disminución de vitamina B12, anemia aplásica o hemolítica.

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas

**Metformina 500 + Glibenclamida 5**

Metformina Clorhidrato 500 mg + Glibenclamida 5 mg

**Indicaciones:**

Está indicado como tratamiento junto a dieta y ejercicio para controlar la hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (no dependiente de la insulina).

RA/ RA/ Vómito, diarrea, dolor abdominal, pérdida del apetito.

**Presentación**

100  
Comprimidos  
Recubiertos

**Metformina 1000 + Glibenclamida 5**

Metformina Clorhidrato 1000 mg + Glibenclamida 5 mg

**Indicaciones:**

Está indicado como tratamiento junto a dieta y ejercicio para controlar la hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (no dependiente de la insulina).

RA/ Vómito, diarrea, dolor abdominal, pérdida del apetito.

**Presentación**

40  
Comprimidos  
Recubiertos

**Metformina 1000 + Glimepirida 2**

Metformina Clorhidrato 1000 mg + Glimepirida 2 mg

**Indicaciones:**

Está indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II, cuando la dieta, el ejercicio físico y la reducción de peso, especialmente en pacientes con sobrepeso, cuando la dieta prescrita y el ejercicio por sí solos no sean suficientes para un control glucémico adecuado.

RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, sensación de pesadez de estómago, dolor abdominal.

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas



## Metformina 1000 + Glimpirida 4

Metformina Clorhidrato 1000 mg + Glimpirida 4 mg

### Indicaciones:

Están indicadas para la diabetes mellitus tipo II cuando la dieta ha fallado y especialmente si el paciente tiene sobrepeso. Las tabletas de Metformina y Glimpirida pueden administrarse solas como terapia inicial, o pueden administrarse en combinación con una sulfonilurea o insulina. RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, sensación de pesadez de estómago, dolor abdominal.

### Presentación

30  
Tabletas  
Recubiertas



## Montelukast 4

Montelukast 4 mg

### Indicaciones:

Está indicado para prevenir la dificultad para respirar, la opresión en el pecho, la sibilancia y la tos que el asma causa. También se usa para prevenir el broncoespasmo durante el ejercicio. Se emplea, igualmente, para tratar los síntomas de la rinitis alérgica tanto estacional como permanente. Pertenecer a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor del leucotrieno. RA/ Cefalea y fatiga.

### Presentación

30  
Tabletas  
Masticables



## Montelukast 5

Montelukast 5 mg

### Indicaciones:

Está indicado para prevenir la dificultad para respirar, la opresión en el pecho, la sibilancia y la tos que el asma causa. También se usa para prevenir el broncoespasmo durante el ejercicio. Se emplea, igualmente, para tratar los síntomas de la rinitis alérgica tanto estacional como permanente. Pertenecer a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor del leucotrieno. RA/ Cefalea y fatiga.

### Presentación

30  
Tabletas  
Masticables



## Montelukast 10

Montelukast 10 mg

### Indicaciones:

Está indicado para prevenir la dificultad para respirar, la opresión en el pecho, la sibilancia y la tos que el asma causa. También se usa para prevenir el broncoespasmo durante el ejercicio. Se emplea, igualmente, para tratar los síntomas de la rinitis alérgica tanto estacional como permanente. Pertenecer a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor del leucotrieno. RA/ Cefalea y fatiga.

### Presentación

30  
Tabletas  
Recubiertas



## Narastys

DHA, Multivitaminas, Multiminerales, Ácido Fólico

### Indicaciones:

Este producto puede ayudarle a obtener las cantidades adecuadas de los nutrientes esenciales si usted no consume una variedad de alimentos nutritivos.

RA/ Náuseas, cefalea y efecto diabético.

### Presentación

30  
Cápsulas  
de Gelatina  
Blanda

## VADEMECUM



### Nebivolol 5

Nebivolol 5 mg

#### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial), insuficiencia cardíaca crónica estable de leve a moderada, asociado a tratamiento estándar en pacientes ancianos de 70 o más años.

RA/ Alucinaciones, psicosis, confusión y sequedad en los ojos.

#### Presentación

30  
Tabletas



### NervioVital

Vit. B1 100 mg + B6 200 mg + B12 200 mcg

#### Indicaciones:

Está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales de las vitaminas B1, B6 y B12 debido al incremento de las necesidades, reducción del consumo o reducción de la absorción, que podrían manifestarse como dolores de espalda, lesiones en piel y mucosas como la estomatitis y glositis, neuralgias y anemia.

RA/ cambios en el color y olor de la orina, dolor de cabeza, somnolencia, náuseas y vómitos.

#### Presentación

100  
Tabletas  
Recubiertas



### NervioVital 25000

Vitamina B1 + B6 + B12

#### Indicaciones:

Esta indicado, para la salud, un importante beneficio es el incremento de nuestra capacidad de memoria y concentración. Se ha visto que sobre todo en las personas mayores la ingesta de vitaminas del complejo B mejora la memoria y estabiliza el estado de ánimo.

RA/ Color rosa en la orina, reacciones alérgicas, náuseas, vómito y otras.

#### Presentación

Solución  
Inyectable



### Neupentin

Cabapentina 300 mg + Mononitrato de Tiamina (Vitamina B1) 100 mg + Cianocobalamina ( Vitamina B12) 0.20 mg

#### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de dolores neuropáticos periféricos, como la neuropatía diabética dolorosa y en la neuralgia post-herpética en adultos. Es también empleado en el síndrome del miembro fantasma, neuropatía en pacientes con cáncer y neuropatías posteriores a un cuadro de herpes zóster.

RA/ Mareos, somnolencia y edema periférico.

#### Presentación

20  
Comprimidos  
Recubiertos



### Nifedipina 20 SR

Nifedipina 20 mg

#### Indicaciones:

Está indicado en el manejo de angina crónica estable o vasoespástica; tratamiento de hipertensión.

RA/ Falla cardíaca, enrojecimiento, constipación, diarrea, flatulencia y otras.

#### Presentación

30  
Tabletas  
Recubiertas  
de Liberación  
Prolongada



## Nitazoxanida 500

Nitazoxanida 500 mg

### Indicaciones:

Antiparasitario de amplio espectro indicado para tratar la diarrea causada por el protozooario *Giardia Lambia* o *Cryptosporidium Parvum*. Se sospecha que una diarrea es causada por protozoos cuando dura más de 7 días.  
RA/ Náuseas, vómitos, cefalea, diarrea, dolor abdominal y otras.

### Presentación

6  
Tabletas  
Recubiertas



## Nitazoxanida 100/5

Nitazoxanida 100 mg / 5 mL

### Indicaciones:

Antiparasitario de amplio espectro indicado para tratar la diarrea causada por el protozooario *Giardia Lambia* o *Cryptosporidium Parvum*. Se sospecha que una diarrea es causada por protozoos cuando dura más de 7 días.  
RA/ Náuseas, vómitos, cefalea, diarrea, dolor abdominal y otras.

### Presentación

30 ml  
Polvo para  
Suspensión



## Olmesartán 20

Olmesartán Medoxomil 20 mg

### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en adultos y tratamiento de la hipertensión en niños y adolescentes de 6 a menos de 18 años de edad.  
RA/ Dolor de espalda, diarrea, cefalea, rinitis y otras.

### Presentación

28  
Tabletas  
Recubiertas



## Olmesartán 40

Olmesartán Medoxomil 40 mg

### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en adultos y tratamiento de la hipertensión en niños y adolescentes de 6 a menos de 18 años de edad.  
RA/ Dolor de espalda, diarrea, cefalea, rinitis y otras.

### Presentación

28  
Tabletas  
Recubiertas



## Olmesartán 20 + Amlodipina 5

Olmesartán Medoxomil 20 mg + Amlodipina 5 mg

### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en pacientes adultos cuya presión arterial no está adecuadamente controlada con Olmesartán Medoxomil o Amlodipina en monoterapia.  
RA/ Mareo, dolor de cabeza, hinchazón de los tobillos, pies y otras.

### Presentación

30  
Tabletas  
Recubiertas

## VADEMECUM



## Omeprazol 20

Omeprazol 20 mg

**Indicaciones:**

Está indicado en el tratamiento de la úlcera duodenal y de la úlcera gástrica benigna, incluyendo las que complican los tratamientos con fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Reflujo gastroesofágico RA/ Náuseas, diarrea, cefalea, estreñimiento, flatulencia y otras.

**Presentación**

100  
Cápsulas  
Gastrorresistentes



## Pantoprazol 40

Pantoprazol 40 mg

**Indicaciones:**

Está indicado en adultos y adolescentes a partir de 12 años para esofagitis por reflujo. Pantoprazol está indicado para erradicación de *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) en combinación con terapia antibiótica adecuada en pacientes con *H. pylori* asociado a úlceras, úlcera gástrica y duodenal, síndrome de Zollinger Ellison y otras enfermedades hipersecretoras patológicas.

RA/ Trastornos del sueño, cefalea, vértigos, alteraciones del gusto y otras.

**Presentación**

100  
Tabletas de  
Liberación  
Retardada



## Pantoprazol 40

Pantoprazol 40 mg

**Indicaciones:**

Está indicado en adultos y adolescentes a partir de 12 años para esofagitis por reflujo. Pantoprazol está indicado para erradicación de *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) en combinación con terapia antibiótica adecuada en pacientes con *H. pylori* asociado a úlceras, úlcera gástrica y duodenal, síndrome de Zollinger Ellison y otras enfermedades hipersecretoras patológicas.

RA/ Trastornos del sueño, cefalea, vértigos, alteraciones del gusto y otras.

**Presentación**

30  
Tabletas de  
Liberación  
Retardada



## Persea Gratissima 100 + Glycine Max 200

Persea Gratissima 100 mg + Glycine Max 200 mg

**Indicaciones:**

Está indicado en el tratamiento sintomático de acción lenta de la osteoartritis de cadera y rodilla. Reumatología, tratamiento sintomático de la acción lenta de la osteoartritis. Prevención de la degradación del cartilago.

RA/ Fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y otras.

**Presentación**

30  
Cápsulas



## Pregabalina 75

Pregabalina 75 mg

**Indicaciones:**

Está indicado en el tratamiento del dolor neuropático periférico y central en adultos, trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en adultos, epilepsia y en el tratamiento combinado de las crisis parciales con o sin generalización secundaria.

RA/ Estado de ánimo eufórico, confusión, irritabilidad, desorientación, insomnio y otras.

**Presentación**

30  
Cápsulas



## Pregabalina 150

Pregabalina 150 mg

### Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento del dolor neuropático periférico y central en adultos, trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en adultos, epilepsia y en el tratamiento combinado de las crisis parciales con o sin generalización secundaria.  
RA/ Estado de ánimo eufórico, confusión, irritabilidad, desorientación, insomnio y otras.

### Presentación

30  
Cápsulas



## Pre&Probióticos

Mezcla Probiótica (1x10<sup>9</sup> de UFC)

### Indicaciones:

Está indicado para una variedad de trastornos gastrointestinales. Los Probióticos parecen alterar la microflora intestinal y pueden ejercer su efecto. Los probióticos se han utilizado para tratar problemas intestinales como diarrea aguda y crónica, síndrome del intestino irritable, SIBO, IBD, etc.  
RA/ No presenta.

### Presentación

30 Sobres  
Polvo para  
suspensión  
oral



## Rosuvastatina 10

Rosuvastatina 10 mg

### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento del hipercolesterolemia, adultos, adolescentes y niños de edad igual o mayor de 6 años con hipercolesterolemia primaria (tipo IIa incluyendo hipercolesterolemia familiar heterocigótica) o dislipidemia mixta (tipo IIb) como medida complementaria a la dieta cuando la respuesta obtenida con la dieta y otros tratamientos no farmacológicos (p. ej., ejercicio, pérdida de peso) no ha sido adecuada. Prevención de eventos cardiovasculares, Prevención de eventos cardiovasculares mayores en pacientes considerados de alto riesgo.  
RA/ Cefalea, mareos, diarrea, estreñimiento, náuseas y otras.

### Presentación

30  
Tabletas  
Recubiertas



## Rosuvastatina 20

Rosuvastatina 20 mg

### Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento del hipercolesterolemia, adultos, adolescentes y niños de edad igual o mayor de 6 años con hipercolesterolemia primaria (tipo IIa incluyendo hipercolesterolemia familiar heterocigótica) o dislipidemia mixta (tipo IIb) como medida complementaria a la dieta cuando la respuesta obtenida con la dieta y otros tratamientos no farmacológicos (p. ej., ejercicio, pérdida de peso) no ha sido adecuada. Prevención de eventos cardiovasculares, Prevención de eventos cardiovasculares mayores en pacientes considerados de alto riesgo.  
RA/ Cefalea, mareos, diarrea, estreñimiento, náuseas y otras.

### Presentación

30  
Tabletas  
Recubiertas



## Rupatadina 10

Rupatadina 10 mg

### Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento sintomático de la rinitis alérgica y la urticaria en adultos y adolescentes (mayores de 12 años).  
RA/ Faringitis, rinitis, apetito aumentado, somnolencia y otras.

### Presentación

100  
Tabletas

## VADEMECUM



### Saccharomyces Boulardii 200

Saccharomyces Boulardii 200 mg

#### Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de la diarrea: diarrea del viajero, diarrea viral en niños y diarrea asociada con antibióticos, tratamiento del síndrome del intestino irritable, tratamiento y prevención de complicaciones digestivas después de la terapia con antibióticos: diarrea, colitis, candidiasis y prevención de la diarrea durante la alimentación enteral continua en adultos.  
RA/ Flatulencia, urticaria.

#### Presentación

10  
sobres  
Polvo para  
suspensión



### Saccharomyces Boulardii 250

Saccharomyces Boulardii 250 mg

#### Indicaciones:

Está indicado en adultos y niños para el tratamiento sintomático de las diarreas agudas inespecíficas y en la prevención y tratamiento sintomático de los procesos diarreicos producidos por la administración de antibióticos.  
RA/ Reacción anafiláctica con prurito, urticaria, rash cutáneo, flatulencia.

#### Presentación

10  
sobres  
Polvo para  
suspensión



### Saccharomyces Boulardii 250

Saccharomyces Boulardii 250 mg

#### Indicaciones:

Está indicado en adultos y niños para el tratamiento sintomático de las diarreas agudas inespecíficas y en la prevención y tratamiento sintomático de los procesos diarreicos producidos por la administración de antibióticos.  
RA/ Reacción anafiláctica con prurito, urticaria, rash cutáneo, flatulencia.

#### Presentación

10  
Cápsulas



### Sertralina 50

Sertralina 50 mg

#### Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de episodios depresivos mayores, prevención de reaparición de episodios depresivos mayores, trastorno de angustia, con o sin agorafobia, trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) en adultos y pacientes pediátricos de 6-17 años, trastorno de ansiedad social (fobia social) y trastorno por estrés post-traumático (TEPT).  
RA/ Náuseas, apetito disminuido, apetito aumentado, insomnio.

#### Presentación

30  
Tabletas  
Recubiertas



### Sildenafil 50

Sildenafil 50 mg

#### Indicaciones:

Es un inhibidor potente y selectivo de Guanosin Monofosfatocíclico Fosfodiesterasa (GMPc), responsable de la acción periférica sobre las erecciones, siendo indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil.  
RA/ Cefalea, rubor, mareos, dispepsia, diarrea y otras.

#### Presentación

4  
Comprimidos  
Recubiertos



## Sildenafil 100

Sildenafil 100 mg

### Indicaciones:

Es un inhibidor potente y selectivo de Guanosin Monofosfatocíclico Fosfodiesterasa (GMPc), responsable de la acción periférica sobre las erecciones, siendo indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil. RA/ Cefalea, rubor, mareos, dispepsia, diarrea y otras.

### Presentación

4  
Comprimidos  
Recubiertos



## Silnamys

Multivitaminico + Aminoácidos

### Indicaciones:

Suplemento nutricional multivitaminico en conjunto con aminoácidos esenciales, un producto dietético. RA/ No presenta.

### Presentación

110 mL  
Jarabe



## Sitagliptina 100

Sitagliptina 100 mg

### Indicaciones:

Está indicado para mejorar el control glucémico en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2: Como monoterapia en pacientes controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio por sí solos y para los que el uso de Metformina no es adecuado debido a contraindicaciones o intolerancia. Como terapia oral doble en combinación con Metformina en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con el tratamiento de Metformina sola, no proporcionen un control glucémico adecuado. Como terapia oral triple en combinación con una sulfonilurea y Metformina en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con el tratamiento dual con estos medicamentos, no proporcionen un control glucémico adecuado. RA/ Dolor de cabeza, mareo, estreñimiento, vómitos.

### Presentación

10  
Tabletas  
Recubiertas



## Tamsulosina 0.4

Tamsulosina Clorhidrato 0.4 mg

### Indicaciones:

Está indicado en hombres para tratar los síntomas del agrandamiento de la próstata (hiperplasia prostática benigna) que incluye dificultad para orinar (intermitencia, goteo, debilidad en el flujo de orina y vaciado incompleto de la vejiga), dolor al orinar y necesidad de orinar con más frecuencia y urgencia.

RA/ Mareos, edema, cefalea, náuseas, diarrea y otras.

### Presentación

30  
Cápsulas de  
Liberación  
Prolongada



## Tamsulosina 0.4 + Dutasterida 0.5

Tamsulosina Clorhidrato 0.4 mg + Dutasterida 0.5 mg

### Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de próstata (HBP) y reducción del riesgo de retención aguda de orina (RAO) y de cirugía en pacientes con síntomas de moderados a graves de HBP.

RA/ Mareo, dolor de cabeza, estreñimiento, diarrea, náuseas y otras.

### Presentación

30  
Cápsulas

## VADEMECUM

**BIOEQUIVALENTE**



### Telmisartan 80


Telmisartán 80 mg

**Indicaciones:**

Está indicado para la hipertensión esencialmente en adultos, prevención cardiovascular, enfermedad cardiovascular aterotrombótica o enfermedad arterial periférica. Diabetes mellitus tipo 2 con lesión de órgano diana documentada.  
RA/ Diarrea, angioedema, dolor de espalda, infecciones respiratorias y otras.

**Presentación**

30  
Tabletas



### Tramadol 50

Tramadol Clorhidrato 50 mg

**Indicaciones:**

El Tramadol es un analgésico opiode de acción central. Es un antagonista puro no selectivo en los receptores de opioides  $\mu$ ,  $\delta$  y  $\kappa$  con una afinidad mayor para el receptor, utilizado para el tratamiento de dolor de intensidad moderada a severa y tiene un efecto antitussivo.  
RA/ Somnolencia, sudoración, mareos, vómitos, xerostomía y otras.

**Presentación**

100  
Cápsulas



### Tridiuvo

Clotrimazol 1% + Neomicina 0.5% + Betametasona 0.05%

**Indicaciones:**

Antiinflamatorio, antibacteriano, antimicótico tópico. Afecciones inflamatorias, micóticas y bacterianas de la piel, causadas por gérmenes sensibles al Clotrimazol y/o a la Neomicina. Dermatitis por contacto, seborreica, eccema.  
RA/ Hipersensibilidad a alguno de los componentes, afecciones tuberculosas o virales de la piel.

**Presentación**

20  
Gramos



### Trimetazidina 35 MR

Clorhidrato de Trimetazidina 35 mg

**Indicaciones:**

Está indicada en adultos como terapia adicional para el tratamiento sintomático de pacientes con angina de pecho estable que no están adecuadamente controlados o no toleran terapias anti anginosas de primera línea.  
RA/ Cefalea, rubor facial, taquicardia refleja, hipotensión, bradicardia y otras.

**Presentación**

30  
Tabletas  
Recubiertas  
de Liberación  
Modificada



### Verapamilo 240 SR

Verapamilo Clorhidrato 240 mg

**Indicaciones:**

El Clorhidrato de Verapamilo es un bloqueante de los canales de Calcio activo por vía oral se administra para el tratamiento de la angina, la hipertensión y las taquiarritmias supraventriculares.  
RA/ Bradicardia, hipotensión, rash, mareos, fatiga y otras.

**Presentación**

20  
Tabletas



## Vitamina E 400

Vitamina E400 UI

### Indicaciones:

Está indicada en la prevención y tratamiento de deficiencia de Vitamina E, en enfermedades con síndrome de malabsorción que cursen con esteatorrea, resecciones gastrointestinales, enfermedad celíaca, fibrosis quística, enfermedad del tracto hepato-biliar (colestasis crónica, obstrucción biliar, atresia biliar) y abetalipoproteinemia.  
RA/ Diarrea, náuseas, flatulencia, espasmos abdominales y sangrado gingival.

### Presentación

30  
Cápsulas de  
Gelatina Blanda



## Xtrina 81

Aspirina 81 mg

### Indicaciones:

Está indicado para el alivio del dolor, la fiebre y la inflamación de una variedad de afecciones como la gripe, el resfriado común. Para reducir el riesgo de mortalidad vascular en pacientes con sospecha de infarto agudo de miocardio, para reducir el riesgo de un primer infarto de miocardio, para la profilaxis del tromboembolismo venoso después del reemplazo total de cadera.  
RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, hemorragia y / o ulceración gastrointestinal y otras.

### Presentación

100  
Tabletas de  
Liberación  
Retardada



## Zinc 50

Zinc 50 mg

### Indicaciones:

Está indicado en los estados carenciales de Zinc, siempre que no puedan ser corregidos mediante dieta  
RA/ Puede provocar deficiencia de cobre.

### Presentación

100  
Tabletas  
Recubiertas



## Zinc 100

Zinc 100 mg

### Indicaciones:

Está indicado en los estados carenciales de Zinc, siempre que no puedan ser corregidos mediante dieta  
RA/ Puede provocar deficiencia de cobre.

### Presentación

100  
Tabletas  
Recubiertas



## Zinc 10/5

Zinc 10mg/5mL

### Indicaciones:

Está indicado en los estados carenciales de Zinc, siempre que no puedan ser corregidos mediante dieta  
RA/ Puede provocar deficiencia de cobre.

### Presentación

120 mL  
Jarabe

## 2021

## Enero

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

## Febrero

D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

## Marzo

D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

## Abril

D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

## Mayo

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

## Junio

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

## Julio

D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

## Agosto

D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

## Septiembre

D	L	M	M	J	V	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

## Octubre

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

## Noviembre

D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

## Diciembre

D	L	M	M	J	V	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	





ADIUVO®

VADEMECUM

Honduras *Droguería Europea S.A.*  
(+504) 2235-6831

El Salvador *Droguería Europea S.A., de C.V.*  
(+503) 2264-2033

Costa Rica *Droguería Europea S.A.*  
(+506) 4881-1300

Nicaragua *Distribuidora Europea Nicaragua S.A.*  
(+505) 2298-0777

Guatemala *Droguería Europea Guatemala S.A.*  
[info@adiuvohn.com](mailto:info@adiuvohn.com)