

Ficha Técnica

NervioVital 25 000

Vitamina B1+B6+B12

Jeringa prellenada 2ml +agua cescarable



| | |
|---------------------------------------|---|
| Nombre del Medicamento | NervioVital 25000 |
| Nombre Genérico | Vitamina B1 + B6 + B12 Solución Inyectable |
| Composición Quali-Cuantitativa | Cada jeringa prellenada con 2 mL de solución contiene: Vitamina B1 (Tiamina Clorhidrato) 100 mg Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato) 100 mg Vitamina B12 (Cianocobalamina) 25000 mcg Excipientes c.s.p. |
| Forma Farmacéutica | Solución Inyectable |
| Datos Clínicos | |
| - Indicaciones Terapéuticas | Prevención y tratamiento de deficiencia importante de vitamina B12 y de vitaminas B1 y B6 debidas a una reducción de la absorción, reducción de la ingesta o aumento de los requerimientos, que podrían causar complicaciones neurológicas. Estas situaciones incluyen: regímenes alimenticios desequilibrados o restrictivos, estado nutricional deteriorado, convalecencias, infección prolongada, y pueden darse en pacientes y población en riesgo como por ejemplo diabéticos, ancianos, personas que abusan del alcohol o en caso de tratamientos con medicación que afecte al estatus vitamínico, así como en pacientes con dolor neuropático asociado a neuritis y neuralgia (neuropatías) con probable deficiencia de las tres vitaminas citadas. |
| - Vía de Administración | Intramuscular |
| - Contraindicaciones | <ul style="list-style-type: none"> • Hipersensibilidad a los principios activos, a las cobalaminas (ej. hidroxocobalamina), al cobalto o a alguno de los excipientes incluidos en la Advertencia sobre excipientes. • Tratamientos con levodopa ver sección Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. • Pacientes con Enfermedad de Leber (atrofia hereditaria del nervio óptico) o ambliopía tabáquica, que Podrían degenerar más. |
| - Presentación | NervioVital 25,000 se presenta en estuche que contiene una jeringa prellenada de 2mL y una aguja descartable. |
| - Incompatibilidades | No aplica |
| Régimen de prescripción | La dosis recomendada es de 2 mL, una o dos veces por semana hasta que mejoren los síntomas; después de 3 semanas si es necesario se puede administrar 2 mL al mes. |
| Condición de Almacenamiento | Almacenar a temperatura inferior a 30°C, en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz y la humedad. Mantener fuera del alcance de los niños. |
| Leyendas especiales | No administrar a niños menores de seis meses ya que contiene alcohol bencílico. Consulte a su médico en caso de embarazo y lactancia. |
| Países donde está aprobado | Honduras, El Salvador |
| Laboratorio Fabricante | Saga Lifesciences Limited, Ahmedabad, India |
| Fecha de Revisión | Mayo 2018 |