


Ficha Técnica

Dexketoprofeno 25

Dexketoprofeno 25mg tabletas recubiertas



Nombre del Medicamento	Dexketoprofeno 25
Nombre Genérico	Dexketoprofeno 25 mg tabletas recubiertas
Composición Cualitativa-Cuantitativa	Cada tableta recubierta contiene: Dexketoprofeno trometamol 36.90 mg equivalente a Dexketoprofeno.....25 mg Excipientes c.s.p.
Forma Farmacéutica	Tabletas recubiertas
Datos Clínicos	
- Indicaciones Terapéuticas	Tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve o moderada, tal como dolor musculoesquelético, dismenorrea, odontalgia.
- Vía de Administración	Oral
- Contraindicaciones	Dexketoprofeno Tabletas no se administrará en los siguientes casos: <ul style="list-style-type: none"> • hipersensibilidad al principio activo, a cualquier otro AINE o a alguno de los excipientes. • pacientes en los cuales sustancias con acción similar (p. ej. ácido acetilsalicílico, u otros AINE) precipitan ataques de asma, broncoespasmo, rinitis aguda, o causan pólipos nasales, urticaria o edema angioneurótico. • reacciones fotoalérgicas o fototóxicas conocidas durante el tratamiento con ketoprofeno o fibratos. • pacientes con antecedentes de hemorragia gastrointestinal o perforación relacionados con tratamientos anteriores con AINE. • pacientes con úlcera péptica/hemorragia gastrointestinal activa o con cualquier antecedente de sangrado, ulceración o perforación gastrointestinal. • pacientes con dispepsia crónica. • pacientes con otras hemorragias activas u otros trastornos hemorrágicos. • pacientes con la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. • pacientes con insuficiencia cardíaca grave. • pacientes con disfunción renal moderada a grave (aclaramiento de creatinina <59 ml/min). • pacientes con disfunción hepática grave (puntuación de Child-Pugh 10 - 15). • pacientes con diátesis hemorrágica y otros trastornos de la coagulación. • pacientes con deshidratación grave (causada por vómitos, diarrea o ingesta insuficiente de líquidos) • durante el tercer trimestre del embarazo o lactancia.
- Presentación	Caja con 10, 30, 50, 100, 500 y 1000 tabletas recubiertas.
- Incompatibilidades	No aplica
Régimen de prescripción	Dexketoprofeno no está destinado para su uso a largo plazo y el tratamiento debe limitarse al periodo sintomático. Se puede minimizar la aparición de reacciones adversas si se utilizan las dosis eficaces menores durante el menor tiempo posible para controlar los síntomas. <i>Adultos:</i> De acuerdo con la naturaleza e intensidad del dolor, la dosis recomendada es generalmente de 12,5 mg cada 4 - 6 horas, o de 25 mg cada 8 horas. La dosis total diaria no debe sobrepasar los 75 mg.
Condición de Almacenamiento	Almacenar a temperatura inferior a 30 °C. Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños.
Leyendas especiales	No aplica
Países donde está aprobado	Honduras, El Salvador, Costa Rica
Laboratorio Fabricante	SAG Manufacturing S.L.U., España
Fecha de Revisión	Enero 2019