

Ficha Técnica

Sildenafil 100

Sildenafil 100mg comprimidos recubiertos



Nombre del Medicamento	Sildenafil 100
Nombre Genérico	Sildenafil 100 mg comprimidos recubiertos
Composición Cualitativa	Cada comprimido recubierto contiene: Sildenafil Citrato 140.48 mg equivalente a Sildenafil 100 mg Excipientes c.s.p.
Forma Farmacéutica	Comprimidos Recubiertos
Datos Clínicos	
- Indicaciones Terapéuticas	Tratamiento de la disfunción eréctil en hombres, que es la incapacidad para obtener o mantener una erección suficiente para una actividad sexual satisfactoria. Para que sildenafil sea efectivo es necesaria la estimulación sexual.
- Vía de Administración	Oral
- Contraindicaciones	Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. De acuerdo con sus conocidos efectos sobre la vía óxido nítrico/guanosina monofosfato cíclica (GMPc), sildenafil ha demostrado potenciar los efectos hipotensores de los nitratos, estando contraindicada la administración concomitante de sildenafil con los dadores de óxido nítrico (tales como nitrito de amilo) o nitratos en cualquiera de sus formas. No se deben utilizar fármacos para el tratamiento de la disfunción eréctil, incluyendo sildenafil, en hombres a los que la actividad sexual esté desaconsejada (por ejemplo: pacientes con disfunciones cardiovasculares graves tales como angina inestable o insuficiencia cardíaca grave). Sildenafil está contraindicado en pacientes que han perdido la visión en un ojo debido a neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIA-NA), independientemente de si este episodio se asoció o no con la exposición previa a un inhibidor de la PDE5.
- Presentación	Blíster de 4 comprimidos recubiertos en caja.
- Incompatibilidades	No aplica
Régimen de prescripción	<i>Uso en adultos:</i> La dosis recomendada es de 50 mg tomados a demanda, aproximadamente una hora antes de la actividad sexual. En base a la eficacia y tolerancia, la dosis se puede aumentar a 100 mg o disminuir a 25 mg. La dosis máxima recomendada es de 100 mg. La pauta máxima de dosificación recomendada es de una vez al día. Si se toma Sildenafil con alimentos, el inicio de su acción farmacológica podría retrasarse en comparación a cuando se toma en ayunas. <i>Uso en ancianos:</i> No se requiere ajuste de la dosis en ancianos. <i>Uso en pacientes con insuficiencia renal:</i> Las dosis recomendadas descritas en "Uso en adultos" son aplicables a pacientes con insuficiencia renal leve a moderada (aclaramiento de creatinina = 30-80 ml/min).
Condición de Almacenamiento	Almacenar a temperatura inferior a 30°C. Proteger de la luz y la humedad. Mantener fuera del alcance de los niños.
Leyendas especiales	No aplica
Países donde está aprobado	Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala
Laboratorio Fabricante	Saga Lifesciences Limited, Ahmedabad, India
Fecha de Revisión	Enero 2021