DROGUERIA EUROPEA



ADIUVO®

Productos de CALIDAD para su BIENESTAR

Adiuvohn

Vademécum

ADIUVO®



GENÉRICOS DE CALIDAD

MISMA CALIDAD

MISMA EFICACIA

www.adiuvopharma.com

info@adiuvopharma.com





ADIUVO®

Está desarrollado para las siguientes clasificaciones terapéuticas:

- Analgésicos, Antiinflamatorios
- Analgésicos, Antiinflamatorios, Antipiréticos,
- Analgésicos, Antiinflamatorios, Antipiréticos, Antireumáticos, Antineuríticos
- Analgésicos
- Antialérgicos
- Antialérgicos, Antiasmático
- Antibióticos
- Anticoagulantes
- Anticonvulsivante,Neuropatias
- Antidepresivos
- Antidiabéticos
- Antiepilépticos, Neuropáticos
- Antiespasmódicos
- Antiestrogénico Antiandrogénico débil Antialdosterónico
- Antihipertensivos
- Hipolipemiantes
- Antimicóticos
- Antiparasitarios
- Antiparasitarios, Antifúngicos, Antivirales
- Antiparkinson
- Antivirales
- Bifosfonatos (osteoporosis)
- Diuréticos
- Expectorantes
- Fibras
- Hipoglicemiantes
- Hipotiroidismo
- Inhibidores de la agregación plaquetaria
- Multivitamínicos
- Probióticos
- Protectores Gástricos
- Psicoestimulantes y Nootrópicos
- Tratamiento de Acné
- Urológicos
- Cosméticos



Acetaminofén 100

Acetaminofén 100mg/mL

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve a moderada y estados febriles.
RA/ Enrojecimiento de la piel, ampollas, erupción.

Presentación

15 mL
Suspensión Oral
(Gotas Orales)



Acetaminofén 500

Acetaminofén 500 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve a moderada y estados febriles.
RA/ Hipoglucemia y dermatitis alérgica, por lo general, raras o muy raras.

Presentación

100
Comprimidos



Acetaminofén 750

Acetaminofén 750 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve a moderada y estados febriles.
RA/ Hipoglucemia y dermatitis alérgica, por lo general, raras o muy raras.

Presentación

100
Tabletas



Aciclovir

Aciclovir 5%

Indicaciones:

Esta indicado para el tratamiento de las manifestaciones tópicas del herpes simple y zoster.
RA/ Ardor, escozor, resequedad, descamación y otras.

Presentación

15 g
Crema Tópica



Ácido Fólico 5

Ácido Fólico 5 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento y prevención de la deficiencia de Ácido Fólico, especialmente durante la gestación, lactancia y períodos de crecimiento rápidos., También está indicado en la prevención de las malformaciones del tubo neural (espina bífida, meningocele, anencefalia).
RA/ Eritema, fiebre, prurito y broncoespasmo.

Presentación

100
Tabletas



Ácido Ibandrónico 150

Ácido Ibandrónico 150 mg

Indicaciones:

También llamado Ibandronato, es un medicamento que pertenece al grupo de los bifosfonatos. Está indicado en el tratamiento de la osteoporosis en mujeres que han alcanzado la menopausia.
RA/ Dispepsia, cefalea, dolor musculoesquelético, trastornos gastrointestinales y otras.

Presentación

1 Tableta Recubierta



Alendronato 70

Ácido Alendrónico70 mg

Indicaciones:

Es un bisfosfonato de segunda generación, primer fármaco que no sólo previene la pérdida de hueso, sino que origina su endurecimiento. Se trata de un potente inhibidor de la resorción ósea, pero a diferencia de otros bisfosfonatos de la primera generación, no inhibe la mineralización ósea.
RA/ Cefalea, flatulencia, trastornos gastroesofágicos y otras.

Presentación

4 Tabletas



Akothac

Alfa Cetoanálogo de aminoácidos esenciales

Indicaciones:

Prevención y tratamiento de daños causados por un fallo o deficiencia en el metabolismo de proteínas en enfermedades renal crónica en relación con un consumo limitado de la ingesta de proteínas en la dieta.
RA/Puede presentarse ácides estomacal y náuseas

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Ambroxol 15/5

Ambroxol Clorhidrato 15mg/5 mL

Indicaciones:

Está indicado para afecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias que requieran tratamiento secretolítico.
RA/ Vómitos, diarrea, dispepsia, dolor abdominal, sequedad de boca, urticaria.

Presentación

120 mL Jarabe



Ambroxol 7.5 + Clenbuterol 0.005/5

Ambroxol 7.5 mg + Clenbuterol 0.005/5 mL

Indicaciones:

Reducción de la viscosidad de las secreciones mucosas, facilitando su expulsión, en procesos catarrales y gripales, para adultos y niños mayores de 2 años. Asma bronquial, bronquitis asmática y espástica.
RA/ En rara ocasión se presentan reacciones de hipersensibilidad, prurito, angioedema, náuseas, vómitos.

Presentación

120 mL Jarabe



Ambroxol 15 + Dextrometorfano 7.5

Ambroxol Clorhidrato 15 mg + Dextrometorfano Hidrobromuro 7.5mg

Indicaciones:

Indicado para el alivio de la tos, debido a irritaciones menores de los bronquios Y de la garganta, coadyuvante en procesos broncopulmonares que cursen conaumento de la viscosidad y adherencia del moco.
RA/Diarrea, náuseas, vómito; cefalea, gastritis

Presentación

120 mL Jarabe



Amitriptilina 25

Amitriptilina Clorhidrato 25 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento del trastorno depresivo mayor en adultos, tratamiento del dolor neuropático en adultos, tratamiento profiláctico de la cefalea crónica tipo tensional en los adultos, tratamiento profiláctico de la migraña en adultos y tratamiento de la enuresis nocturna en los niños de edad igual o superior a 6 años.
RA/ Es probable que con dosis altas se produzcan arritmias cardiacas e hipotensión grave.

Presentación

100 Tabletas Recubiertas



Amlodipina 5

Amlodipina 5 mg

Indicaciones:

Está indicado para la hipertención arterial alta o un cierto tipo de dolor en el pecho llamado angina.
RA/ Cefalea, somnolencia, mareo, (inicio del tto.), debilidad, palpitaciones y otras.

Presentación

30 Tabletas



Amlodipina 10

Amlodipina 10 mg

Indicaciones:

Esta indicado para la hipertensión arterial alta a un cierto tipo de dolor en el pecho llamado angina.
RA/Cefalea, somnolencia, mareo,(al inicio del tto.)debilidad,palpitaciones y otras

Presentación

30 Tabletas



Amoxicilina

Amoxicilina 500 mg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Antibiotico utilizado para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, como neumonía; bronquitis; gonorrea; y las infecciones de los oídos, nariz, garganta, vías urinarias y la piel.
RA/ Fiebre, trastorno gastrointestinal y otras.

Presentación

100 Cápsulas



Amoxicilina + Ácido Clavulánico

Amoxicilina 400 mg + Ácido Clavulánico 57 mg

Indicaciones:

Antibiótico utilizado para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, incluyendo infecciones en los oídos, pulmones, senos, piel y vías urinarias.
RA/ Fiebre, trastornos gastrointestinales y otras.

Presentación

70 ml Polvo para Suspensión



BIOEQUIVALENTE

Amoxicilina 875 + Ácido Clavulánico 125

Amoxicilina Trihidratada 875 mg + Ácido Clavulánico 125 mg

Indicaciones:

Antibiotico utilizado para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, incluyendo infecciones en los oídos, pulmones, senos, piel y vías urinarias.
RA/ Fiebre, trastorno gastrointestinal y otras.

Presentación

15 Tabletas Recubiertas



Amoxicilina 125 / 5

Amoxicilina 125 mg / 5 mL

Indicaciones:

Antibiotico utilizado para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, como neumonia,bronuits;gonorrea;y las infecciones de los oidos , nariz, garganta,vias urinarias y la piel.
RA/Trastorno gastrointestinal y otras

Presentación

60 ml Polvo para Suspensión



Amoxicillina 250

Amoxicillina 250mg / 5 mL

Indicaciones:

Antibiotico utilizado para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, como neumonia,bronuits;gonorrea;y las infecciones de los oidos , nariz, garganta,vias urinarias y la piel.
RA/Trastorno gastrointestinal y otras

Presentación

100 ml Polvo para Suspensión



Amikacina 500/2

Amikacina 500 mg / 2 mL

Indicaciones:

Es un antibiótico del grupo de los aminoglucósidos que actúan eliminando bacterias (gérmenes) que causan infecciones. Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones víricas como la gripe o el catarro.
RA/La amikacina puede causar problemas de los nervios,ardor, hormigueo o entumecimiento en las manos, brazos, pies o piernas

Presentación

1 Ampolla Solución Inyectable



Atenolol 100

Atenolol 100 mg

Indicaciones:

Está indicado para tratar la hipertensión. Prevención de angina (dolor en el tórax) ·Tratamiento de los ataques cardíacos. Actúa relajando los vasos sanguíneos y la disminución de la frecuencia cardíaca para mejorar el flujo sanguíneo y disminuir la presión arterial.
RA/ Bradicardia, hipotensión, fenómeno de rainau, fatiga, náuseas y otras.

Presentación

100 Tabletas



Atorvastatina 10

Atorvastatina 10 mg

Indicaciones:

Se utiliza junto con una dieta balanceada, pérdida de peso y ejercicio para reducir el riesgo de infarto y apoplejía y para reducir la probabilidad de que se necesite una cirugía de corazón en las personas que tienen una enfermedad del corazón o que estén en riesgo de desarrollar enfermedad del corazón.
RA/ Cefalea, somnolencia, diarrea, dolor abdominal, mialgias y otras

Presentación

30 Comprimidos Recubiertos



BIOEQUIVALENTE

Atorvastatina 20

Atorvastatina 20 mg

Indicaciones:

Se utiliza junto con una dieta balanceada, pérdida de peso y ejercicio para reducir el riesgo de infarto y apoplejía y para reducir la probabilidad de que se necesite una cirugía de corazón en las personas que tienen una enfermedad del corazón o que estén en riesgo de desarrollar enfermedad del corazón.
RA/ Cefalea, somnolencia, diarrea, dolor abdominal, mialgias y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



BIOEQUIVALENTE

Atorvastatina 40

Atorvastatina 40 mg

Indicaciones:

Se utiliza junto con una dieta balanceada, pérdida de peso y ejercicio para reducir el riesgo de infarto y apoplejía y para reducir la probabilidad de que se necesite una cirugía de corazón en las personas que tienen una enfermedad del corazón o que estén en riesgo de desarrollar enfermedad del corazón.
RA/ Cefalea, somnolencia, diarrea, dolor abdominal, mialgias y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Atorvastatina 80

Atorvastatina 80 mg

Indicaciones:

Se utiliza junto con una dieta balanceada, pérdida de peso y ejercicio para reducir el riesgo de infarto y apoplejía y para reducir la probabilidad de que se necesite una cirugía de corazón en las personas que tienen una enfermedad del corazón o que estén en riesgo de desarrollar enfermedad del corazón.
RA/ Cefalea, somnolencia, diarrea, dolor abdominal, mialgias y otras

Presentación

30 Comprimidos Recubiertos



Azitromicina

Azitromicina Anhidra 200 mg / 5 mL

Indicaciones:

Está indicada para el tratamiento de las siguientes infecciones, Sinusitis bacteriana aguda (adecuadamente diagnosticada), otitis bacteriana media aguda (adecuadamente diagnosticada), faringitis, amigdalitis, exacerbación aguda de la bronquitis crónica (adecuadamente diagnosticada), neumonía adquirida en la comunidad de leve a moderada, infecciones de la piel y tejidos blandos, uretritis y cervicitis no complicadas causadas por Chlamydia trachomatis.
RA/ Náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal, cefalea, somnolencia e hiperactividad.

Presentación

15 mL, 22.5 mL 30 mL, Polvo para Suspensión Oral



Azitromicina 500


Azitromicina 500 mg

Indicaciones:

Antibiotico utilizado para tratar ciertas infecciones bacterianas, como bronquitis, neumonía, enfermedades de transmisión sexual (ITS) e infecciones de los oídos, pulmones, senos nasales, piel, garganta y órganos reproductivos.
RA/ Diarrea, náuseas, dolor abdominal, vomito, anorexia y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Bacillus Clausii

Esporas de Bacillus Clausii

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento y profilaxis de las alteraciones de la flora intestinal, Tratamiento para la recuperación de la flora bacteriana, desordenes agudos y crónicos en lactantes
RA/ No reporta.

Presentación

10 Ampollas Bebibles



Bacillus Clausii Plus

Esporas de Bacillus Clausii

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento y profilaxis de las alteraciones de la flora intestinal, Tratamiento para la recuperación de la flora bacteriana, desordenes agudos y crónicos en lactantes
RA/ No reporta.

Presentación

5 Ampollas Bebibles



Beclometasona 250

Beclometasona Dipropionato Anhidra 250 mcg

Indicaciones:

Pacientes asmáticos que no pueden controlar los síntomas con dosis máximas de mantenimiento de broncodilatadores o inhaladores.
RA/ Erupción, urticaria, prurito y eritema.

Presentación

200 Dosis de Solución para Inhalación



Bisoprolol 5

Bisoprolol Fumarato 5 mg

Indicaciones:

Es un antagonista beta adrenérgico activo por vía oral. Actúa específicamente sobre los receptores beta-1, tiene una baja solubilidad en lípidos y se elimina por vía renal y fecal. El Bisoprolol fue inicialmente aprobado para el tratamiento de la hipertensión, pero posteriormente se ha comprobado su eficacia en la cardiopatía isquémica y en la insuficiencia cardíaca.
RA/ Fatiga, bradicardia, isquemia periférica, tos y otras.

Presentación

30 Comprimidos Recubiertos



Bisoprolol 10


Bisoprolol Fumarato 10 mg

Indicaciones:

Es un antagonista beta adrenérgico activo por vía oral. Actúa específicamente sobre los receptores beta-1, tiene una baja solubilidad en lípidos y se elimina por vía renal y fecal. El Bisoprolol fue inicialmente aprobado para el tratamiento de la hipertensión, pero posteriormente se ha comprobado su eficacia en la cardiopatía isquémica y en la insuficiencia cardíaca.
RA/ Fatiga, bradicardia, isquemia periférica, tos y otras.

Presentación

30 Comprimidos Recubiertos



Bisoprolol 5 + Hidroclorotiazida 6.25

Bisoprolol 5 mg + Hidroclorotiazida 6.25 mg

Indicaciones:

Este medicamento comprende un bloqueante selectivo de receptores beta (Bisoprolol) y un diurético tiazídico (Hidroclorotiazida, medicamento para eliminar agua del cuerpo). Se utiliza para tratar la presión sanguínea elevada (hipertensión primaria) en pacientes adultos cuya presión sanguínea no está suficientemente controlada con Bisoprolol o Hidroclorotiazida solos.
RA/ Fatiga, bradicardia, isquemia periférica, tos y otras.

Presentación

30 Comprimidos Recubiertos



Bisoprolol 10 + Hidroclorotiazida 6.25

Bisoprolol 10 mg + Hidroclorotiazida 6.25 mg

Indicaciones:

Este medicamento comprende un bloqueante selectivo de receptores beta (Bisoprolol) y un diurético tiazídico (Hidroclorotiazida, medicamento para eliminar agua del cuerpo). Se utiliza para tratar la presión sanguínea elevada (hipertensión primaria) en pacientes adultos cuya presión sanguínea no está suficientemente controlada con Bisoprolol o Hidroclorotiazida solos.
RA/ Fatiga, bradicardia, isquemia periférica, tos y otras.

Presentación

30 Comprimidos Recubiertos



Budesónida 1/2

Budesónida 1mg / 2 mL

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de mantenimiento con glucocorticoides para el control de la inflamación subyacente de las vías respiratorias en pacientes con asma bronquial. Tratamiento de seudo crup muy grave (laringitis subglótica) en el que está indicada la hospitalización.
RA/ Erupción cutánea, dermatitis de contacto, urticaria, angioedema y reacción anafiláctica.

Presentación

20 Ampollas de Suspención para Inhalación por Nebulizador



Bupropión 300

Bupropión Clorhidrato 300 mg

Indicaciones:

Medicamento que se utiliza para tratar la depresión y otros trastornos. También es usado como tratamiento para ayudar a las personas a dejar de fumar.
RA/ Puede provocar ansiedad, excitación,somnolencia, boca seca, nauseas, mareos entreo otros

Presentación

100 Tabletas de Liberación Extendida



Calcio + D3

Citrato de Calcio 1500 mg + Vitamina D3 200 UI

Indicaciones:

Está indicado en los tratamientos de estados carenciales de Calcio y Vitamina D. Suplemento de Calcio y Vitamina D como terapia coadyuvante en el tratamiento específico de la osteoporosis, en pacientes con riesgo elevado de sufrir deficiencias combinadas de Calcio y Vitamina D.
RA/ Estreñimiento, gases, vómitos, náuseas, dolor de cabeza, debilidad.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Candesartán 16 + Hidroclorotiazida 12.5

BIOEQUIVALENTE

Candesartán Cilexetil 16 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg

Indicaciones:

El Candesartán Cilexetilo actúa bloqueando la hormona angiotensina II, lo cual causa relajación de los vasos sanguíneos y produce la disminución de la presión sanguínea. La Hidroclorotiazida pertenece a la clase de medicamentos llamados diuréticos. Su efecto es promover la excreción urinaria de sodio, cloruro y agua, lo cual da como resultado la disminución de la presión sanguínea.
RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga y otras.

Presentación

28 Tabletas



Candesartán 32

BIOEQUIVALENTE

Candesartán Cilexetilo 32 mg

Indicaciones:

El Candesartán Cilexetilo actúa bloqueando la hormona angiotensina II, lo cual causa relajación de los vasos sanguíneos y produce la disminución de la presión sanguínea.
RA / Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga y otras.

Presentación

28 Tabletas



Carvedilol 6.25

BIOEQUIVALENTE

Carvedilol 6.25 mg

Indicaciones:

Antihipertensivo, antiaginoso, beta bloqueados no selectivo, alfa bloqueador y antioxidante. Está indicado para la hipertensión arterial, angina de pecho, insuficiencia cardiaca congestiva.
RA/ Mareos, cefalea, fatiga, bradicardia, hipotensión postural y otras.

Presentación

30 Tabletas



Carvedilol 12.5

Carvedilol 12.5 mg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Antihipertensivo, antiaginoso, beta bloqueados no selectivo, alfa bloqueador y antioxidante. Está indicado para la hipertensión arterial, angina de pecho, insuficiencia cardiaca congestiva.
RA/ Mareos, cefalea, fatiga, bradicardia, hipotensión postural y otras.

Presentación

30 Tabletas



Carvedilol 25

Carvedilol 25 mg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Antihipertensivo, antiaginoso, beta bloqueados no selectivo, alfa bloqueador y antioxidante. Está indicado para la hipertensión arterial, angina de pecho, insuficiencia cardiaca congestiva.
RA/ Mareos, cefalea, fatiga, bradicardia, hipotensión postural y otras.

Presentación

30 Tabletas



Cefalexina 500

Cefalexina Anhidra 500 mg

Indicaciones:

Antibiotico de primera generación de cefalosporinas con excelente actividad contra la mayoría de bacterias gram-positivas. Principalmente en el tratamiento de la otitis media y las infecciones de las vías respiratorias (por ejemplo, faringitis, amigdalitis, neumonía lobar) causadas por estafilococos susceptibles, Streptococcuspneumoniae, estreptococos del grupo A y beta-hemolíticos.
RA / Diarrea, trastornos gastrointestinales y otras.

Presentación

30 Cápsulas



Cefixima 100

Cefixima 100mg/5mL

Indicaciones:

Antibiotico utilizado para el tratamiento de las infecciones causadas por microorganismos sensibles: Infecciones de vías respiratorias altas: Faringitis y amigdalitis. Infecciones de vías respiratorias bajas: Bronquitis aguda, episodios de reagudización de bronquitis crónica y neumonías. Infecciones ORL: Otitis media, Infecciones de vías urinarias no complicadas
RA/ Diarrea, heces blandas.

Presentación

100 mL Polvo para Suspensión



Cefixima 400

Cefixima 400 mg

Indicaciones:

Antibiotico utilizado para el tratamiento de las infecciones causadas por microorganismos sensibles: Infecciones de vías respiratorias altas: Faringitis y amigdalitis. Infecciones de vías respiratorias bajas: Bronquitis aguda, episodios de reagudización de bronquitis crónica y neumonías. Infecciones ORL: Otitis media, Infecciones de vías urinarias no complicadas
RA/ Diarrea, heces blandas.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Ceftriaxona 1g IM

Ceftriaxona Sódica 1 g

Indicaciones:

Antibiotico utilizado para tratar determinadas infecciones ocasionadas por bacterias, como la gonorrea (ITS), la meningitis y las infecciones de los pulmones, los oídos, la piel, las vías urinarias, la sangre, los huesos, las articulaciones y el abdomen. También se aplica la Ceftriaxona inyectable antes de determinados tipos de cirugía para prevenir las infecciones que pueden presentarse después de la operación.
RA/ Diarrea, Trastornos gastrointestinales, colitis, eosinifilia y otras.

Presentación

1 Vial 1g de Ceftriaxona
+ 1 Ampolla de Lidocaina
Polvo para Solución Inyectable



Cetirizina 10

Cetirizina Diclorhidrato 10 mg

Indicaciones:

Es un medicamento antialérgico,está indicado en adultos y niños a partir de 6 años para:el alivio de los síntomas nasales y oculares de la rinitis alérgica estacional,el alivio de la urticaria,alergia al polen, el polvo y otras sustancias suspendidas en el aire, y las alergias a otras sustancias (como ácaros del polvo, caspa de animales, cucarachas y mohos) entre otros.
RA/Somnolencia , dolor estomago,diarrea , vómitos entre otros

Presentación

100 Tabletas Recubiertas



Cilostazol 100

Cilostazol 100 mg

Indicaciones:

Está indicado para reducir los síntomas de la claudicación intermitente (dolor en las piernas que empeora al caminar y mejora al estar en reposo, provocado por el estrechamiento de los vasos sanguíneos que irrigan sangre a las piernas) colaborando así al mejoramiento del flujo de sangre a las piernas.
RA/ Equimosis, edema (periférico, facial), anorexia, cefalea, mareo y otras.

Presentación

28 Comprimidos



Cinarizina 75

Cinarizina 75 mg

Indicaciones:

Está indicado para el control de trastornos vestibulares como vértigo, tinintus, náusea y vómitos como los observados en el síndrome de Menniere.
RA/ Produce somnolencia en un 20 al 25% de los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Ciprofloxacina 500

BIOEQUIVALENTE


Ciprofloxacina 500 mg

Indicaciones:

La Ciprofloxacina es un agente antimicrobiano de la clase de las Fluoroquinolonas. Es un activo frente a un amplio espectro de germenes gram-negativos aerobios, incluyendo patogenos entericos. Es administrada en tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio inferior (bronquitis, neumonias, absceso pulmonar, infecciones de la piel e infecciones de los huesos y de las articulaciones.
RA/ Cefaleas, fatiga, trastornos gastrointestinales, vertigo, temblor y otras.

Presentación

100 Tabletas Recubiertas



Citicolina 1/ 10

Citicolina 1g / 10 mL

Indicaciones:

Esta indicado en el tratamieno de pacientes con lesiones cerebrales graves de naturaleza vascular o traumática,con o sin perdida de conocimientos para el tratamiento de falos defenerativos y lesiones vasculares cerebrales cronicas en la demencia senil. Tratamiento de los cerebrovasculares en fase aguda y sub aguda y cognitivos asociados a traumatismos craneales.
RA/ Muy raras: alucinaciones, cefalea , vertigo y otras

Presentación

10 Sobres Bebibles



Citicolina 500

Citicolina 500 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de pacientes con lesiones cerebrales graves de naturaleza vascular o traumática, con o sin pérdida de conocimiento, para el tratamiento de daños degenerativos y lesiones vasculares cerebrales crónicas en la demencia senil. Tratamiento de los trastornos neurológicos y cognitivos asociados a los accidentes cerebrovasculares en fase aguda y sub aguda y cognitivos asociados a traumatismos craneales.
RA/ Muy raras: alucinaciones, cefalea, vértigo, hipotensión arterial y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Claritromicina 500

Claritromicina 500 mg

Indicaciones:

Antibiotico utilizado en infecciones del tracto respiratorio, tales como faringitis, amigdalitis y sinusitis (adecuadamente diagnosticada) infecciones del tracto respiratorio inferior, tales como bronquitis aguda, exacerbación aguda de la bronquitis crónica y de las neumonías bacterianas. Infecciones de la piel y tejidos blandos, como foliculitis, celulitis y erisipela.
RA/ Dolor abdominal, diarreas, náuseas, vómitos.

Presentación

10 Tabletas Recubiertas



Claritromicina 125/5

Claritromicina polvo para suspension 125mg / 5ml

Indicaciones:

Antibiotico utilizado en infecciones del tracto respiratorio tales como Faringitis, amigdalitis y sinusitis(Adecuadamente diagnosticada)infecciones del tracto respiratorio inferior, tales como bronuitis aguda,exacerbación aguda de la bronuitis crónica y de las neumonías bacterianas. Infecciones de la piel y tegidos blandos como foliculitis,celulitis,erisipela.
RA/ Dolor Abdominal , diarreas, nauseas , vomitos.

Presentación

60 mL Polvo para Suspensión Oral



Clindamicina 300

Clindamicina 300 mg

Indicaciones:

Antibiotico utilizado para tratar ciertos tipos de infecciones bacterianas, como infecciones de los pulmones, la piel, la sangre, los órganos reproductores femeninos y los órganos internos. La Clindamicina pertenece a una clase de medicamentos llamados antibióticos tipo Lincomicina. Actúa al retardar o frenar la multiplicación de las bacterias.
RA/ Diarrea, náuseas, trastornos gastrointestinales, mal sabor de boca y otras.

Presentación

50 Cápsulas



Clindamicina 100 + Ketoconazol 400

Clindamicina 100 mg + Ketoconazol 400 mg

Indicaciones:

Tratamiento de la vaginosis bacteriana originada por Gardnerella vaginalis y otras bacterias anaerobias como Bacteroides fragilis, así como así como en vaginitis mixtas y candidiasis vaginal.
RA/Puede provocar irritación vulvar,reseuedad en la mucosa vaginal y prurito

Presentación

7 Cápsulas de Gelatina Blanda Vía Vaginal



Colágeno 10 Hidrolizado

Colágeno Hidrolizado 10 g

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento, control, prevención y mejora de las siguientes enfermedades, afecciones y síntomas: mejora la salud de la piel, ayuda a aliviar el dolor, prevenir la pérdida ósea, aumenta la masa muscular y promueve la salud del corazón.
RA/ Sensación de pesadez en el estómago, diarrea leve y erupciones.

Presentación

30 Sobres Polvo para Suspensión Oral



Colchicina 0.5

Colchicina 0.5 mg

Indicaciones:

La colchicina se usa para prevenir los ataques de gota (dolor repentino e intenso en una o más articulaciones, causado por niveles anormalmente altos de una sustancia llamada ácido úrico en la sangre) en adultos. La colchicina también se usa para aliviar el dolor de los ataques de gota cuando ocurren. La colchicina también se usa para tratar la fiebre mediterránea familiar (FMF; una condición innata que causa episodios de fiebre, dolor e hinchazón del área del estómago, pulmones y articulaciones en adultos y niños mayores de 4 años de edad.
RA/Diarrea,náuseas, vómitos, dolor abdominal

Presentación

40 Tabletas



BIOEQUIVALENTE

Clopidogrel 75

Clopidogrel 75 mg

Indicaciones:

Está indicado en pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio, un infarto cerebral o que padecen enfermedad arterial periférica establecida. Pacientes adultos que presentan un síndrome coronario agudo y pacientes adultos con fibrilación auricular.
RA/ Hematoma, epistaxis, hemorragia gastrointestinal, diarrea y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Deflazacort 6

Deflazacort 6 mg

Indicaciones:

Tratamiento de las agudizaciones y/o terapia de mantenimiento de la artritis reumatoide y de la artritis psoriásica cuando se han mostrado ineficaces los tratamientos conservadores; polimialgia reumática; fiebre reumática aguda; lupus eritematoso sistémico; dermatomiositis grave; periarteritis nudosa; arteritis craneal y granulomatosis de Wegener.
RA/ Dolor de cabeza, períodos menstruales irregulares o ausentes, cicatrización lenta de las cortadas y golpes, debilidad muscular, dolor de articulaciones.

Presentación

10 Tabletas



Deflazacort 30

Deflazacort 30 mg

Indicaciones:

Tratamiento de las agudizaciones y/o terapia de mantenimiento de la artritis reumatoide y de la artiris psoriasica cuando se han mostrado ineficaces los tratamientos conservadores;polimialgia reumática; fiebre reumática aguda;lupus eritematoso sistématico;dermatomiositis grave;periarteritis nudosa;arteritis craneal y glanulomatosis de Wegener. RA/Dolor de cabeza,periodos menstruales irregulares o ausentes, cicatrización lenta de las cortadas y golpes , debilidad muscular , dolor de articulaciones.

Presentación

30 Tabletas



Dermaguard After Sun

Indicaciones:

Enriquecido con Aloe Vera, hidrata la piel y ayuda a combatir los efectos de la sequedad por el sol, viento y agua.

Presentación

300 mL de Gel



Dermaguard Kids

Indicaciones:

Dermaguard Kids con factor de protección 50+ diseñado para protección de los rayos UVA y UVB, evitar o disminuir las quemaduras debido a la exposición del sol.

Presentación

120 mL Loción Tópica Protecor Solar



DermaGuard SPF 50+

Indicaciones:

Dermaguard con factor de protección 50+ (FPs50+) diseñado especialmente para brindar la protección necesaria en actividades expuestas a la radiación solar. Otorga protección contra rayos ultravioletas del tipo A y B (UVA/UVB).

Presentación

100 mL Loción Tópica Protector Solar



Desvenlafaxina 50

Desvenlafaxina 50 mg

Indicaciones:

Es un antidepresivo de la clase de inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina y se toma por vía oral.
RA/Estreñimiento , perdida de apetito, mareos , somnolencia entre otros

Presentación

30 Tabletas de Liberación Extendida



Desvenlafaxina 100

Desvenlafaxina 100 mg

Indicaciones:

Es un antidepresivo de la clase de inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina y se toma por vía oral.
RA/Estreñimiento , perdida de apetito, mareos , somnolencia entre otros

Presentación

30 Tabletas de Liberación Extendida



Dexketoprofeno 25

Dexketoprofeno 25 mg

Indicaciones:

El Dexketoprofeno es un fármaco perteneciente a la familia de los AINEs (antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica). Está indicado en el tratamiento sintomático del dolor agudo de diversa etiología.
RA/ Dolor y ardor estomacal, cefalea, mareos, somnolencia y otras.

Presentación

10 Tabletas Recubiertas



Dexketoprofeno 25 Solución Bebible

Dexketoprofeno 25 mg

Indicaciones:

El Dexketoprofeno es un fármaco perteneciente a la familia de los AINEs (antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica). Está indicado en el tratamiento sintomático del dolor agudo de diversa etiología.
RA/ Dolor y ardor estomacal, cefalea, mareos, somnolencia y otras.

Presentación

10 Sobres Solución Oral



Dexketoprofeno Inyectable 50 MG/2 mL

Dexketoprofeno Trometamol 36.9 mg

Indicaciones:

El Dexketoprofeno es un fármaco perteneciente a la familia de los AINEs (antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica). Está indicado en el tratamiento sintomático del dolor agudo de diversa etiología.
RA/ Dolor y ardor estomacal, cefalea, mareos, somnolencia y otras.

Presentación

10 Ampollas IM / IV / Infusión IV



Diclofenaco Potásico 100 SR

Diclofenaco Potásico 100 mg

Indicaciones:

El Diclofenaco Potásico es un medicamento inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa y miembro de la familia de antiinflamatorios no esteroides (AINE). Es un miorelajante e indicado para reducir inflamaciones y como analgésico, pues reduce dolores causados por heridas menores y dolores tan intensos como la artritis.
RA/ Trastornos gastrointestinales, cefaleas, mareos, vértigo y otras.

Presentación

100 Cápsulas con Pellets de Liberación Sostenida



Diclofenaco Sódico 50

Diclofenaco Sódico 50 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de enfermedades reumáticas crónicas inflamatorias tales como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artrosis, reumatismo extra articular, ataque agudo de gota, dismenorrea primaria, inflamaciones y tumefacciones postraumático.
RA/ Cefalea, mareo, somnolencia, vértigo, insomnio y otras.

Presentación

100 Tabletas con Recubierta Entérica



Diclofenaco 9/5


Diclofenaco Sódico 9 mg / 5 ml

Indicaciones:

Tratamiento a corto plazo de las siguientes afecciones agudas: dolores agudos e intensos por osteoartritis y artritis reumatoide, dismenorrea primaria, crisis migrañosas, inflamaciones y tumefacciones postraumáticas y como tratamiento sintomático del ataque agudo de gota.
RA/ Mareo, vértigo, náuseas, vómitos, diarreas

Presentación

120 mL Suspensión Oral



Dicloxacilina 125/5

Dicloxacilina 125mg/5 mL

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio, piel, tejidos blandos y huesos, tracto urinario, otitis, meningitis y septicemias.
RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, estomatitis y otras.

Presentación

60 mL Polvo para Suspensión



Dicloxacilina 500

Dicloxacilina 500 mg

Indicaciones:

Antibiótico betalactámico bactericida indicado contra la mayoría de Streptococcus y Sthapylococcus. Infecciones de vías respiratorias altas (amigdalitis, faringitis). Infecciones de vías respiratorias bajas (bronquitis, neumonías de focos múltiples, bronconeumonía). Infecciones de piel y tejidos blandos (furunculosis, celulitis, impétigo, impétigo ampolloso, piodermitis). Heridas infectadas por Staphylococcus. Artritis séptica, osteomielitis.
RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, estomatitis y otras.

Presentación

100 Cápsulas



Diflah 500

Diosmina 450 mg + Hesperidina 50 mg

Indicaciones:

Está indicado para el alivio a corto plazo del edema y sistemas relacionados con la insuficiencia venosa crónica
RA/ Trastornos digestivos Y neurovegetativos.

Presentación

30 Comprimidos Recubiertos



Dobesilato Cálcico 500

Dobesilato Cálcico Monohidrato 500 mg

Indicaciones:

Actúa en las paredes capilares regulando las funciones fisiológicas deterioradas como permeabilidad creciente y resistente disminuida. Aumenta la flexibilidad del eritrocito, inhibe la hiperagregacion de la plaqueta y, en la retinopatía diabética, reduce la hiperviscosidad de la sangre, mejorando así las características geológicas de la sangre y la irrigación del tejido fino.

RA/ Trastornos gastrointestinales, erupciones cutáneas y otras.

Presentación

100 Cápsulas



Dolo-NervioVital N

Tiamina (Vitamina B1) 50 mg, Piridoxina (Vitamina B6) 50 mg,
Cianocobalamina (Vitamina B12) 1000 mcg, Diclofenaco Sódico 50 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de enfermedades reumáticas crónicas inflamatorias tales como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artrosis. Reumatismo extraarticular. Tratamiento sintomático del ataque agudo de gota. Tratamiento sintomático de la dismenorrea primaria. Tratamiento de inflamaciones y tumefacciones postraum. Antiinflamatorio con acción analgésica y antineurítico.

RA/ Prurito, urticaria, erupción cutánea.

Presentación

100 Tabletas Recubiertas



Dolo-NervioVital XR

Tiamina Monohidrato (Vitamina B1) 100 mg, Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6) 100 mg,
Cianocobalamina (Vitamina B12) 1000 mcg, Diclofenaco Sódico 100 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de enfermedades reumáticas crónicas inflamatorias tales como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artrosis. Reumatismo extraarticular. Tratamiento sintomático del ataque agudo de gota. Tratamiento sintomático de la dismenorrea primaria. Tratamiento de inflamaciones y tumefacciones postraum. Antiinflamatorio con acción analgésica y antineurítico.

RA/ Prurito, urticaria, erupción cutánea.

Presentación

100 Tabletas Recubiertas de Liberación Prolongada



Doxiciclina 100

Doxiciclina 100 mg

Indicaciones:

La Doxiciclina es un antibióticodel grupo de las tetraciclinas que previene el crecimiento y propagación de las bacterias grampositivas(+) ygramnegativas(-),Se usa en el tratamiento de neumonía y otras infecciones como la enfermedad de Lyme, el acné, la rosácea, la enfermedad periodontal y la malaria.

RA/Hinchazón de los labios,Urticaria,diarrea y otros

Presentación

100 Cápsulas



Duloxetina 60

Duloxetina 60 mg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

La Duloxetina se utiliza para tratar la depresión en adultos,el trastorno de ansiedad generalizada Y el dolor neuropático diabético (a menudo descrito como quemazón, dolor punzante, como pinchazos, escozor, o como un calambre eléctrico. Puede haber una pérdida de sensibilidad en el área afectada, o puede ocurrir que al tocar la zona o ponerla en contacto con calor, frío o presión se produzca dolor). RA/Náuseas , cefalea, reseuedad en la boca, somnolencia , mareos y otras

Presentación

30 Cápsulas de Liberación Retardada



Enalapril 20

Enalapril 20 mg

Indicaciones:

El Enalapril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), utilizado en el tratamiento de la hipertensión y algunos tipos de insuficiencia cardíaca crónica.
RA/ Alergias cutáneas, hipotensión ortostática, cefalea, tos y otras.

Presentación

100 Tabletas



Enqiovit

Multi Vitaminas y Multiminerales + Q10

Indicaciones:

Aporta las cantidades adecuadas de los nutrientes esenciales si usted no consume una variedad de alimentos nutritivos.
RA/ Diarrea, urticaria, fatiga, piel enrojecida y otras.

Presentación

30 Cápsulas



Escitalopram 10

BIOEQUIVALENTE

Escitalopram 10 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la depresión (episodios depresivos mayores), trastornos de ansiedad (tales como trastorno de angustia, trastornos de ansiedad social, trastornos de ansiedad generalizada).
RA/ Nauseas, somnolencia, xerostomía, temblor, insomnio y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Escitalopram 20

BIOEQUIVALENTE

Escitalopram 20 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la depresión (episodios depresivos mayores), trastornos de ansiedad (tales como trastorno de angustia, trastornos de ansiedad social, trastornos de ansiedad generalizada).
RA/ Nauseas, somnolencia, xerostomía, temblor, insomnio y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Esomeprazol 20

Esomeprazol 20 mg

Indicaciones:

Está indicado para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, una afección en la que el reflujo retrógrado del contenido gástrico provoca acidez estomacal y posibles lesiones del esófago, también se usa para disminuir a probabilidad de que las personas que están tomando medicamentos antiinflamatorios no esteroides, desarrollen úlceras.
RA/ Diarreas, estreñimiento, náuseas, cefaleas y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Esomeprazol 40

Esomeprazol 40 mg

Indicaciones:

Está indicado para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, una afección en la que el reflujo retrógrado del contenido gástrico provoca acidez estomacal y posibles lesiones del esófago, también se usa para disminuir a probabilidad de que las personas que están tomando medicamentos antiinflamatorios no esteroides, desarrollen úlceras.
RA/ Diarreas, estreñimiento, náuseas, cefaleas y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Espirinolactona 25

Espirinolactona 25 mg

Indicaciones:

Hipertensión arterial esencial, tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica clases III y IV de la NYHA, asociado a su tratamiento convencional e hiperaldosteronismo primario.
RA/ Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (quistes y pólipos), trastornos de la sangre y del sistema linfático, trastornos del sistema nervioso.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Espironolactona 100


Espironolactona 100 mg

Indicaciones:

Hipertensión arterial esencial, tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica clases III y IV de la NYHA, asociado a su tratamiento convencional e hiperaldosteronismo primario.
RA/ Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (quistes y pólipos), trastornos de la sangre y del sistema linfático, trastornos del sistema nervioso.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Etoricoxib 120

Etoricoxib 120 mg

Indicaciones:

Ayuda a reducir el dolor y la hinchazón (inflamación) en las articulaciones y músculos de personas de 16 años de edad y mayores con artrosis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y gota.El etoricoxib es un fármaco de la clase de antiinflamatorios no esteroideos conocidos como inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, que actúan disminuyendo el dolor crónico, agudo y la inflamación.
RA/Dolor de estomago, dolor de cabeza,estreñimiento o diarrea y otros

Presentación

100 Tabletas Recubiertas



Fenofibrato 160

Fenofibrato 160 mg

Indicaciones:

Está indicado para: Tratamiento de la hipertrigliceridemia grave con o sin niveles bajos de colesterol HDL, hiperlipidemia mixta cuando las estatinas están contraindicadas o no se toleran e hiperlipidemia mixta en pacientes con alto riesgo cardiovascular junto a una estatina cuando los triglicéridos y el colesterol HDL no están adecuadamente controlados.
RA/ Disminución de hemoglobina, disminución del recuento de leucocitos, cefalea, eritema multiforme.

Presentación

10 Cápsulas



Fexofenadina 180

Fexofenadina 180 mg

Indicaciones:

Se usa para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica estacional (fiebre del heno), incluyendo secresión nasal; estornudos; enrojecimiento, picazón u ojos acuosos; o picazón de la nariz, la garganta, o el paladar en adultos y niños de 2 años de edad y mayores.
RA/Dolor de cabeza, nauseas , mareos ,somnolencia y otras

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Furosemida 40

Furosemida 40 mg

Indicaciones:

Edema asociado a insuficiencia cardiaca congestiva, cirrosis hepática (ascitis), y enfermedad renal, incluyendo síndrome nefrótico (tiene prioridad el tratamiento de la enfermedad básica), hipertensión arterial leve y moderada.
RA/ Micción frecuente, visión borrosa, dolor de cabeza, estreñimiento y diarrea

Presentación

100 Tabletas



Fluconazol 150

Fluconazol 150 mg

Indicaciones:

Está indicado para tratar las infecciones por hongos, incluidas la infecciones por levaduras de la vagina, la boca, la garganta, el esófago, el abdomen, los pulmones, la sangre y otros órganos. También se usa para tratar la meningitis provocada por hongos, prevenir las infecciones por levaduras en pacientes tratados con quimioterapia o radioterapia antes de un trasplante de medula ósea.
RA/ Cefaleas, nauseas, vomito, dolor abdominal y otras.

Presentación

20 Cápsulas



Flunarizina 10

Flunarizina 10 mg

Indicaciones:

Está indicado en la profilaxis de la migraña, para el vértigo y los trastornos vestibulares, y en trastornos vasculares cerebrales y periféricos. Se utiliza también como adyuvante en la terapia antiepiléptica en pacientes que no responden a los tratamientos estándar.
RA/ Síntomas del trastorno del sueño, boca seca, letargo, desorientación y otras.

Presentación

30 Tabletas



BIOEQUIVALENTE

Fluoxetina 20

Fluoxetina 20 mg

Indicaciones:

Está indicado para trastornos cognitivos incluidos la demencia degenerativa primaria, demencia vascular y forma intermedias de ambas, que cursan con déficit de memoria, trastornos en la concentración y humor depresivo.
RA/ Mareos, sensación de hormigueo, trastornos del sueño, náuseas y otras.

Presentación

30 Cápsulas



Fluticasone furoato 27.5

Fluticasone furoato 27.5mcg / Dosis

Indicaciones:

Se usa como tratamientopara aliviar los síntomas de la rinitis, como estornudos y secreción, congestión o picazón en la nariz y picazón y ojos llorosos, provocado por la fiebre del heno u otras alergias (ocasionadas por una alergia al polen, al moho, y al polvo.
RA/Dolor de cabeza,secreción nasal entre otras

Presentación

120 Dosis Suspensión en Spray Nasal



BIOEQUIVALENTE

Gabapentina 300

Gabapentina 300 mg

Indicaciones:

Está indicada para el tratamiento del dolor neurótico, generalmente definido como dolor debido al daño nervioso, (dolor persistente en un sitio afectado anteriormente por herpes zoster) y complicaciones dolorosas de la diabetes, dolor por lesiones nerviosas, dolor de miembro fantasma, fibromialgia y neuralgia del trigémino.
RA/ Mareos, somnolencia y edema periférico.

Presentación

30 Cápsulas



Gentamicina 160/2

Gentamicina 160 mg / 2 ml

Indicaciones:

Es un antibiótico aminoglucósido que se emplea habitualmente con otros antibacterianos para el tratamiento de las infecciones sistémicas graves producidas por gramnegativos sensibles y otros microorganismos.
RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, disminución del apetito, y dolor de cabeza.

Presentación

10 Ampollas Solución Inyectable IM



Ginkgo Biloba

Ginkgo Biloba 80 mg

Indicaciones:

Está indicado en adultos para episodios depresivos mayores, trastorno obsesivo-compulsivo, bulimia nerviosa. En niños mayores de 8 años episodios depresivos moderados a graves.
RA/ Muy rara vez molestias gastrointestinales y cefaleas. Pueden tener lugar reacciones alérgicas, que algunos autores han atribuido a la presencia de ácido Ginkgólido.

Presentación

30 Cápsulas



Glibenclamida 5

Glibenclamida 5 mg

Indicaciones:

Está indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus no insulinodependiente (tipo 2) en el adulto cuando las medidas dietéticas, el ejercicio físico y la pérdida de peso no son suficientes por sí solos para lograr un control adecuado de la glucemia.
RA/ Cefalea, hambre intensa, náuseas, vómitos, somnolencia y otras.

Presentación

100 Comprimidos Recubiertos



Gliclazida 60 MR

Glicazida 60 mg

Indicaciones:

Está indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo 2) en el adulto cuando las medidas dietéticas, el ejercicio físico y la pérdida de peso no son suficientes por sí solos para controlar la glucemia.
RA/ Cefalea, hambre intensa, náuseas, vómitos, astenia y otras.

Presentación

30 Tabletas de Liberación Modificada



Glimepirida 4


Glimepirida 4 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II, cuando la dieta, el ejercicio físico y la reducción de peso por sí solos no son adecuados.
RA/ Trombocitopenia, leucopenia, granulocitopenia, agranulocitosis, eritropenia y otras.

Presentación

30 Tabletas



Glucosamina Sulfato + Condroitina Sulfato Sódico

Glucosamina Sulfato 1500 mg + Condroitina Sulfato Sódico 1200 mg

Indicaciones:

Está indicado en enfermedades osteo-articular degenerativa, osteoartritis primarias y secundarias: Artrosis cervical coxofemoral, artosis de la rodilla, lumbar dorsal y sacral, escapilohumoral, distrofias osteo-articulares.
RA/ Trastornos gastrointestinales.

Presentación

30 Sobres Polvo Granulado para Suspensión



Hedera Helix D.7/100

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento sintomático del catarro agudo (inflamación) del tracto respiratorio acompañado de tos; tratamiento de los síntomas de enfermedades bronquiales inflamatorias crónicas.
RA/Nauseas, vomitos , diarrea entre otras

Presentación

100 mL Jarabe



Hioscina 10

Hioscina 10 mg

Indicaciones:

Es un antiespasmódico abdominal derivado de la escopolamina que se utiliza para tratar el dolor y las molestias causadas por cólicos abdominales u otras actividades espasmódicas del aparato digestivo.
RA/Tauicardia, mareos, seuedad en la boca y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Ibuprofeno 400

Ibuprofeno 400 mg

Indicaciones:

Es un antinflamatorio no esteroide (AINE) el cual es empleado para el tratamiento de artritis reumatoide, espondilitis anquilopoyetica y otros procesos reumáticos agudos y crónicos, procesos dolorosos de intensidad leve y moderada como el dolor dental, cefaleas y sintomático de la fiebre en cuadros febriles de etiología diversa.
RA/ Anemia, náuseas, dispepsia, xerostomía, dolor epigástrico y otras.

Presentación

100 Tabletas Recubiertas



Ibuprofeno 600

Ibuprofeno 600 mg

Indicaciones:

Es un antinflamatorio no esteroide (AINE) el cual es empleado para el tratamiento de artritis reumatoide, espondilitis anquilopoyetica y otros procesos reumáticos agudos y crónicos, procesos dolorosos de intensidad leve y moderada como el dolor dental, cefaleas y sintomático de la fiebre en cuadros febriles de etiología diversa.
RA/ Anemia, náuseas, dispepsia, xerostomía, dolor epigástrico y otras.

Presentación

100 Tabletas Recubiertas



Indapamida SR 1.5

Indapamida 1.5 mg

Indicaciones:

Está indicado en hipertensión esencial en adultos.
RA/: Hipersensibilidad al principio activo, a otras sulfamidas, o a alguno de los excipientes, insuficiencia renal grave, encefalopatía hepática o alteración grave de la función hepática e hipopotasemia.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas de Liberacion Prolongada



Intidiva

Indicaciones:

Ayuda a restaurar los niveles normales del ph y proporciona protección natural contra la sensibilidad, picazón, irritación, flujos y olores no deseados.

Presentación

200 mL Jabón Intimo



Irbesartán 150

BIOEQUIVALENTE

Irbesartán 150 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) y tratamiento de la nefropatía en pacientes adultos con diabetes tipo 2 e hipertensión como parte de su tratamiento antihipertensivo.
RA/ Mareo, vértigo, cefalea, taquicardia.

Presentación

28 Tabletas Recubiertas



Irbesartán 150 + Hidroclorotiazida 12.5

BIOEQUIVALENTE

Irbesartán 150 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg

Indicaciones:

Está indicado para tratar la presión arterial alta, enfermedad del riñón provocada por la diabetes en pacientes con diabetes tipo 2 y presión arterial alta. Esta combinación se recomienda cuando hay ciertos pacientes que no responden a una monoterapia de solo Irbesartán, sino que es necesario, una combinación con un diurético, en este caso Hidroclorotiazida, para poder controlar su volumen sanguíneo y bajar su presión arterial.
RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga y otras.

Presentación

28 Tabletas Recubiertas



Irbesartán 300

BIOEQUIVALENTE

Irbesartán 300 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) y tratamiento de la nefropatía en pacientes adultos con diabetes tipo 2 e hipertensión como parte de su tratamiento antihipertensivo.
RA/ Mareo, vértigo, cefalea, taquicardia.

Presentación

28 Tabletas Recubiertas



Irbesartán 300 + Amlodipina 5

Irbesartán 300 mg + Amlodipina 5 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial).
RA/ Mareos, hipercalcemia, diarrea, dolor abdominal o acidez estomacal y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Irbesartán 300 +Hidroclorotiazida 12.5

BIOEQUIVALENTE

Irbesartán 300 mg +Hidroclorotiazida 12.5mg

Indicaciones:

Está indicado para tratar la presión arterial alta, enfermedad del riñón provocada por la diabetes en pacientes con diabetes tipo 2 y presión arterial alta. Esta combinación se recomienda cuando hay ciertos pacientes que no responden a una monoterapia de solo Irbesartán, sino que es necesario, una combinación con un diurético, en este caso Hidroclorotiazida, para poder controlar su volumen sanguíneo y bajar su presión arterial.
RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga y otras.

Presentación

28 Tabletas Recubiertas



Irbesartán 300 + Hidroclorotiazida 25

BIOEQUIVALENTE

Irbesartán 300 mg + Hidroclorotiazida 25 mg

Indicaciones:

Está indicado para tratar la presión arterial alta, enfermedad del riñón provocada por la diabetes en pacientes con diabetes tipo 2 y presión arterial alta. Esta combinación se recomienda cuando hay ciertos pacientes que no responden a una monoterapia de solo Irbesartán, sino que es necesario, una combinación con un diurético, en este caso Hidroclorotiazida, para poder controlar su volumen sanguíneo y bajar su presión arterial.
RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga y otras.

Presentación

28 Tabletas Recubiertas



Isotretinoína 10

Isotretinoína 10mg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

La Isotretinoína, es un fármaco usado mayoritariamente para el acné severo o quístico, pero también se emplea para una serie de cánceres y algunas condiciones severas de la pie.
RA/descamación de la piel en las palmas de las manos y plantas de los pies,sequedad de la piel, ojos, boca o nariz,hemorragia (sangrado) nasal entre otras.

Presentación

30 Cápsulas de Gelatina Blanda



Isotretinoína 20

Isotretinoína 20mg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

La Isotretinoína, es un fármaco usado mayoritariamente para el acné severo o quístico, pero también se emplea para una serie de cánceres y algunas condiciones severas de la pie.
RA/descamación de la piel en las palmas de las manos y plantas de los pies,sequedad de la piel, ojos, boca o nariz,hemorragia (sangrado) nasal entre otras.

Presentación

30 Cápsulas de Gelatina Blanda



Itraconazol 100

Itraconazol 100 mg

Indicaciones:

Está indicado para tratar infecciones micóticas de los pulmones que se pueden propagar a todo el cuerpo, también para tratar infecciones micóticas de las uñas de los pies.
RA/Alérgicas graves, insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar, pancreatitis, hepatotoxicidad.

Presentación

12 Cápsulas



Ketorolaco 20

Ketorolaco Trometamina 20 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento a corto plazo (≤ 5 días) del dolor moderado a severo, generalmente postoperatorio.
RA/ Úlceras GI, sangrado, perforación, sangrado postoperatorio, insuficiencia renal aguda y otras.

Presentación

30 Tabletas



Lamotrigina 100

Lamotrigina 100 mg

Indicaciones:

Es usado como medicamento, especialmente para la epilepsia y el trastorno bipolar. Pertenece a grupos de fármacos que potencian la inhibición mediada por los canales de sodio, como lo son la fenitoina, carbamazepina y el ácido valproico.
RA/Sarpullido , malestar estomacal entre otras.

Presentación

30 Tabletas



Lansoprazol 30

Lansoprazol 30 mg

Indicaciones:

Pertenece a una clase de compuestos antisecretores, ha sido caracterizado como un inhibidor de la bomba de ácido gástrico, ya que bloquea el paso final de la producción de ácido. Es indicado para el tratamiento de ulceras duodenal y gástrica, tratamiento de esofagitis por reflujo y profilaxis de esofagitis por reflujo.
RA/ Diarrea, estreñimiento, náuseas, cefaleas, aumento de apetito.

Presentación

100 Cápsulas de Liberación Retardada



Levofloxacina 500

Levofloxacina 500 mg

Indicaciones:

Es un antibiótico del grupo de las quinolonas es efectivo en contra de un buen número de bacterias Gram positivas y Gram negativas, por lo que se considera un antibiótico de amplio espectro. Por esta razón, se acostumbra administrar la Levofloxacina de manera empírica en infecciones como la neumonía bacteriana, adquirida en la comunidad o infecciones urinarias antes de que se conozca el organismo causal especifico.
RA/ Mareos, cefalea, náuseas, temblor, vaginitis y otras.

Presentación

30 Comprimidos Recubiertos



Levofloxacina 750

Levofloxacina 750 mg

Indicaciones:

Es un antibiótico del grupo de las quinolonas es efectivo en contra de un buen número de bacterias Gram positivas y Gram negativas, por lo que se considera un antibiótico de amplio espectro. Por esta razón, se acostumbra administrar la Levofloxacina de manera empírica en infecciones como la neumonía bacteriana, adquirida en la comunidad o infecciones urinarias antes de que se conozca el organismo causal especifico.
RA/ Mareos, cefalea, náuseas, temblor, vaginitis y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Levosulpirida 25

Levosulpirida 25 mg

Indicaciones:

Tratamiento a corto plazo del síndrome dispéptico (anorexia, distensión abdominal, sensación de sensibilidad epigástrica, cefalea postprandial, acidez estomacal, eructación, diarrea, estreñimiento) por retraso del vaciado gástrico relacionado con factores orgánicos (gastroparesia diabética, cáncer, etc.).
RA/Agitación , Somnolencia, trastornos de alimentación entre otras.

Presentación

30 Tabletas



Levotiroxina 25

BIOEQUIVALENTE


Levotiroxina Sódica 25 mcg

Indicaciones:

Tratamiento del bocio eutiroideo benigno, prevención de la recidiva tras cirugía del bocio eutiroideo, dependiendo del estado hormonal postquirúrgico, terapia sustitutiva en casos de hipotiroidismos, terapia de supresión en el carcinoma tiroideo.
RA/ Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, insuficiencia adrenal, insuficiencia hipofisaria y tirotoxicosis no tratadas, tratamiento con Levotiroxina no debe iniciarse en caso de infarto agudo de miocardio, miocarditis aguda y pancarditis aguda.

Presentación

100 Tabletas



Levotiroxina 50

Levotiroxina Sódica 50 mcg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Tratamiento del bocio eutiroideo benigno, prevención de la recidiva tras cirugía del bocio eutiroideo, dependiendo del estado hormonal postquirúrgico, terapia sustitutiva en casos de hipotiroidismos, terapia de supresión en el carcinoma tiroideo.
RA/ Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, insuficiencia adrenal, insuficiencia hipofisaria y tirotoxicosis no tratadas, tratamiento con Levotiroxina no debe iniciarse en caso de infarto agudo de miocardio, miocarditis aguda y pancarditis aguda.

Presentación

100 Tabletas



Levotiroxina 75

Levotiroxina Sódica 75 mcg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Tratamiento del bocio eutiroideo benigno, prevención de la recidiva tras cirugía del bocio eutiroideo, dependiendo del estado hormonal postquirúrgico, terapia sustitutiva en casos de hipotiroidismos, terapia de supresión en el carcinoma tiroideo.
RA/ Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, insuficiencia adrenal, insuficiencia hipofisaria y tirotoxicosis no tratadas, tratamiento con Levotiroxina no debe iniciarse en caso de infarto agudo de miocardio, miocarditis aguda y pancarditis aguda.

Presentación

100 Tabletas



Levotiroxina 100

Levotiroxina Sódica 100 mcg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Tratamiento del bocio eutiroideo benigno, prevención de la recidiva tras cirugía del bocio eutiroideo, dependiendo del estado hormonal postquirúrgico, terapia sustitutiva en casos de hipotiroidismos, terapia de supresión en el carcinoma tiroideo.
RA/ Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, insuficiencia adrenal, insuficiencia hipofisaria y tirotoxicosis no tratadas, tratamiento con Levotiroxina no debe iniciarse en caso de infarto agudo de miocardio, miocarditis aguda y pancarditis aguda.

Presentación

100 Tabletas



Levotiroxina 125

Levotiroxina Sódica 125 mcg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Tratamiento del bocio eutiroideo benigno, prevención de la recidiva tras cirugía del bocio eutiroideo, dependiendo del estado hormonal postquirúrgico, terapia sustitutiva en casos de hipotiroidismos, terapia de supresión en el carcinoma tiroideo.
RA/ Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, insuficiencia adrenal, insuficiencia hipofisaria y tirotoxicosis no tratadas, tratamiento con Levotiroxina no debe iniciarse en caso de infarto agudo de miocardio, miocarditis aguda y pancarditis aguda.

Presentación

100 Tabletas



Levotiroxina 150

Levotiroxina Sódica 150 mcg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Tratamiento del bocio eutiroideo benigno, prevención de la recidiva tras cirugía del bocio eutiroideo, dependiendo del estado hormonal postquirúrgico, terapia sustitutiva en casos de hipotiroidismos, terapia de supresión en el carcinoma tiroideo.
RA/ Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, insuficiencia adrenal, insuficiencia hipofisaria y tirotoxicosis no tratadas, tratamiento con Levotiroxina no debe iniciarse en caso de infarto agudo de miocardio, miocarditis aguda y pancarditis aguda.

Presentación

100 Tabletas



Linagliptina 5

Linagliptina 5 mg

Indicaciones:

Está indicado en adultos con diabetes mellitus tipo 2 como tratamiento asociado a dieta y ejercicio para mejorar el control glucémico como: Monoterapia cuando la Metformina no es adecuada debido a intolerancia o está contraindicada debido a insuficiencia renal, tratamiento en combinación.
RA/ Hipoglucemia, urticaria, tos y estreñimiento.

Presentación

20 Tabletas Recubiertas



Linagliptina 2.5 + Metformina 500

Linagliptina 2.5 mg + Metformina Clorhidrato 500 mg

Indicaciones:

Está indicada como un complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2.
RA/ Acidosis láctica, insuficiencia cardíaca, pancreatitis.

Presentación

20 Tabletas Recubiertas



Linagliptina 2.5 + Metformina 850

Linagliptina 2.5 mg + Metformina Clorhidrato 850 mg

Indicaciones:

Está indicada como un complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2.
RA/ Acidosis láctica, insuficiencia cardíaca, pancreatitis.

Presentación

20 Tabletas Recubiertas



Loratadina 10

Loratadina 10 mg

Indicaciones:

Está indica para aliviar los síntomas de urticaria crónica y otras afecciones alérgicas dermatológicas. También funciona para el tratamiento y control de los síntomas de la rinitis alérgica, como estornudos, rinorrea y prurito. A su vez ayuda al alivio de la conjuntivitis alérgica y sus síntomas tales como lagrimeo y escozor de ojos.
RA/ Fatiga, sedación, cefalea, alopecia, nerviosismo y otras.

Presentación

30 y 100 Tabletas



Loratadina Jarabe

Loratadina 5mg/5mL

Indicaciones:

Está indicada para pacientes pediátricos, geriátricos o pacientes que presentan problemas al deglutir. Está indicada para aliviar los síntomas de urticaria crónica y otras afecciones alérgicas dermatológicas. También funciona para el tratamiento y control de los síntomas de la rinitis alérgica, como estornudos, rinorrea y prurito. A su vez ayuda al alivio de la conjuntivitis alérgica y sus síntomas tales como lagrimeo y escozor de ojos.
RA/ Fatiga, sedación, cefalea, alopecia, nerviosismo y otras.

Presentación

60 mL Jarabe



Losartán 50

Losartán Potásico 50 mg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en adultos, niños y adolescentes de 6 a 18 años de edad, tratamiento de la enfermedad renal en pacientes adultos con hipertensión y diabetes tipo 2 con proteinuria > 0,5 g/día como parte del tratamiento antihipertensivo y tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica en pacientes adultos cuando el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA).
RA/ Mareo, anemia, somnolencia, cefalea y migraña.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Losartán 50 + Hidroclorotiazida 12.5

Losartán Potásico 50 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en pacientes cuya presión arterial no está controlada adecuadamente con Losartán o Hidroclorotiazida solos.
RA/ Angiodema, trastornos del gusto, purpura de Henoch-Scholenin, insuficiencia renal.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Losartán 100

Losartán Potásico 100 mg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en adultos, niños y adolescentes de 6 a 18 años de edad, tratamiento de la enfermedad renal en pacientes adultos con hipertensión y diabetes tipo 2 con proteinuria > 0,5 g/día como parte del tratamiento antihipertensivo y tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica en pacientes adultos cuando el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA).
RA/ Mareo, anemia, somnolencia, cefalea y migraña.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Losartán 100 + Hidroclorotiazida 25

Losartán Potásico 100 mg + Hidroclorotiazida 25 mg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en pacientes cuya presión arterial no está controlada adecuadamente con Losartán o Hidroclorotiazida solos.
RA/ Angiodema, trastornos del gusto, purpura de Henoch-Scholenin, insuficiencia renal.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Meloxicam 15

Meloxicam 15 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento sintomático de corta duración de las crisis agudas de Artrosis, tratamiento sintomático a largo plazo de artritis reumatoide o espondilitis anquilosante.
RA/ Anemia, insomnio, vértigo, leucocitopenia y cefaleas.

Presentación

30 Tabletas



Meloxicam + Glucosamina Sulfato

Meloxicam 15 mg + Glucosamina Sulfato 1500 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento sintomático de corto plazo de la artrosis y otras formas de reumatismo extraarticular.
RA/ Trastornos gastrointestinales.

Presentación

30 Sobres Polvo Granulado para Suspensión Oral



Memantina 20

Memantina Clorhidrato 20 mg

Indicaciones:

Tratamiento de pacientes con enfermad Alzheimer de moderada a grave.
RA/ Somnolencia, confusión, vértigo, alteración del equilibrio y alteración de la marcha.

Presentación

20 Tabletas Recubiertas



Metformina 750 XR

Metformina Clorhidrato 750 mg

Indicaciones:

Está indicada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para el control de la hiperglicemia que no puede ser controlada mediante dieta, ejercicio o disminución de peso, o cuando la terapia con insulina no es requerida o posible.
RA/ Molestias gastrointestinales, anorexia, acidosis láctica y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas de Liberación Prolongada



Metformina 850

BIOEQUIVALENTE

Metformina Clorhidrato 850 mg

Indicaciones:

Está indicado en conjunto con la dieta y el ejercicio para mejorar el control glicémico en adultos con diabetes tipo II. Puede utilizarse concomitantemente con una sulfonilurea o insulina para mejorar el control glicémico.
RA/ Molestias GI, anorexia, acidosis láctica, disminución de vitamina B12, anemia aplásica o hemolítica.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Metformina 1000 XR

Metformina Clorhidrato 1000 mg

Indicaciones:

Esta indicada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para el control de la hiperglicemia ie no puede ser contralada mediante dieta , ejercicio, disminución de peso o cuando la terapua con insulina no es requerida o posible.
RA/Molestias gastrointestinales , anorexia ,acidosis láctica y otras

Presentación

30 Tabletas de Liberación Extendida



Metformina 500 + Glibenclamida 5

Metformina Clorhidrato 500 mg + Glibenclamida 5 mg

Indicaciones:

Está indicado como tratamiento junto a dieta y ejercicio para controlar la hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (no dependiente de la insulina).
RA/ RA/ Vómito, diarrea, dolor abdominal, perdida del apetito.

Presentación

100 Comprimidos Recubiertos



Metformina 1000 + Glibenclamida 5

Metformina Clorhidrato 1000 mg +Glibenclamida 5 mg

Indicaciones:

Está indicado como tratamiento junto a dieta y ejercicio para controlar la hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (no dependiente de la insulina).
RA/ Vómito, diarrea, dolor abdominal, perdida del apetito.

Presentación

40 Comprimidos Recubiertos



Metformina 1000 + Glimepirida 2

Metformina Clorhidrato 1000 mg + Glimepirida 2 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de la diabetes meillitus tipo II, cuando la dieta, el ejercicio físico y la reducción de peso, especialmente en pacientes con sobrepeso, cuando la dieta prescrita y el ejercicio por sí solos no sean suficientes para un control glucémico adecuado.
RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, sensación de pesadez de estómago, dolor abdominal.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Metformina 1000 + Glimepirida 4

Metformina Clorhidrato 1000 mg + Glimepirida 4 mg

Indicaciones:

Están indicadas para la diabetes mellitus tipo II cuando la dieta ha fallado y especialmente si el paciente tiene sobrepeso. Las tabletas de Metformina y Glimiperida pueden administrarse solas como terapia inicial, o pueden administrarse en combinación con una sulfonilurea o insulina.
RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, sensación de pesadez de estómago, dolor abdominal.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Metronidazol 500


Metronidazol 500 mg

Indicaciones:

Esta indicado para la amebiasis, infecciones bacterianas anaerobias y mixtas aerobias-anaerobias, vaginosis bacteriana.
RA/ Vómitos, náuseas, diarrea, estreñimiento, molestias estomacales.

Presentación

100 Tabletas



Mirtazapina 30

Mirtazapina 30 mg

Indicaciones:

La Mirtazapina es un medicamento utilizado para tratar el trastorno depresivo mayor en adultos.
RA/ somnolencia, mareos, ansiedad, confusión, aumento de peso y apetito.

Presentación

28 Tabletas Recubiertas



BIOEQUIVALENTE

Montelukast 4

Montelukast 4 mg

Indicaciones:

Está indicado para prevenir la dificultad para respirar, la opresión en el pecho, la sibilancia y la tos que el asma causa. También se usa para prevenir el broncoespasmo durante el ejercicio. Se emplea, igualmente, para tratar los síntomas de la rinitis alérgica tanto estacional como permanente. Pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor del leucotrieno.
RA/ Cefalea y fatiga.

Presentación

30 Tabletas Masticables



BIOEQUIVALENTE

Montelukast 5

Montelukast 5 mg

Indicaciones:

Está indicado para prevenir la dificultad para respirar, la opresión en el pecho, la sibilancia y la tos que el asma causa. También se usa para prevenir el broncoespasmo durante el ejercicio. Se emplea, igualmente, para tratar los síntomas de la rinitis alérgica tanto estacional como permanente. Pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor del leucotrieno.
RA/ Cefalea y fatiga.

Presentación

30 Tabletas Masticables



Montelukast 10


Montelukast 10 mg

Indicaciones:

Está indicado para prevenir la dificultad para respirar, la opresión en el pecho, la sibilancia y la tos que el asma causa. También se usa para prevenir el broncoespasmo durante el ejercicio. Se emplea, igualmente, para tratar los síntomas de la rinitis alérgica tanto estacional como permanente. Pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor del leucotrieno.
RA/ Cefalea y fatiga.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Naproxeno 550


Naproxeno 550 mg

Indicaciones:

El Naproxeno es un medicamento antinflamatorio no esteroideo que se emplea en el tratamiento del dolor leve a moderado, la fiebre, la inflamación y la rigidez provocados por afecciones como artrosis, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, tendinitis.
RA/Estreñimiento, gases,Sed excesiva,mareos, somnolencia y otras.

Presentación

100 Tabletas Recubiertas



Narastys

DHA, Multivitaminas, Multiminerales, Ácido Fólico

Indicaciones:

Este producto puede ayudarle a obtener las cantidades adecuadas de los nutrientes esenciales si usted no consume una variedad de alimentos nutritivos.
RA/ Nauseas, cefalea y efecto diabetogénico.

Presentación

30 Cápsulas de Gelatina Blanda



Nebivolol 5

Nebivolol 5 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial), insuficiencia cardiaca crónica estable de leve a moderada, asociado a tratamiento estándar en pacientes ancianos de 70 o más años.
RA/ Alucinaciones, psicosis, confusión y sequedad en los ojos.

Presentación

30 Tabletas



Neriovital

Vit. B1 100 mg + B6 200 mg + B12 200 mcg

Indicaciones:

Está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales de las vitaminas B1, B6 y B12 debido al incremento de las necesidades, reducción del consumo o reducción de la absorción, que podrían manifestarse como dolores de espalda, lesiones en piel y mucosas como la estomatitis y glositis, neuralgias y anemia.
RA/ Cambios en el color y olor de la orina, dolor de cabeza, somnolencia, náuseas y vómitos.

Presentación

100 Tabletas Recubiertas



NervioVital 25000

Vitamina B1 + B6 + B12

Indicaciones:

Esta indicado, para la salud, un importante beneficio es el incremento de nuestra capacidad de memoria y concentración. Se ha visto que sobre todo en las personas mayores la ingesta de vitaminas del complejo B mejora la memoria y estabiliza el estado de ánimo.
RA/ Color rosa en la orina, reacciones alérgicas, náuseas, vómito y otras.

Presentación

1 Jeringa prellenada con 2 mL + aguja descartable Solución Inyectable



Neupentin

Gabapentina 300 mg + Mononitrato de Tiamina (Vitamina B1) 100 mg + Cianocobalamina (Vitamina B12) 0.20 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de dolores neuropáticos periféricos, como la neuropatía diabética dolorosa y en la neuralgia post-herpética en adultos. Es también empleado en el síndrome del miembro fantasma, neuropatía en pacientes con cáncer y neuropatías posteriores a un cuadro de herpes zóster.
RA/ Mareos, somnolencia y edema periférico.

Presentación

20 Comprimidos Recubiertos



Nifedipina 20 SR

Nifedipina 20 mg

Indicaciones:

Está indicado en el manejo de angina crónica estable o vasoespástica; tratamiento de hipertensión.
RA/ Falla cardíaca, enrojecimiento, constipación, diarrea, flatulencia y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas de Liberación Prolongada



Nitazoxanida 100/5

Nitazoxanida 100 mg / 5 mL

Indicaciones:

Antiparasitario de amplio espectro indicado para tratar la diarrea causada por el protozoario Giargia Lambia o Crystosporidium Parvum. Se sospecha que una diarrea es causada por protozoos cuando dura más de 7 días.
RA/ Nauseas, vómitos, cefalea, diarrea, dolor abdominal y otras.

Presentación

30 ml Polvo para Suspensión



Nitazoxanida 500

Nitazoxanida 500 mg

Indicaciones:

Antiparasitario de amplio espectro indicado para tratar la diarrea causada por el protozoario Giargia Lambia o Crystosporidium Parvum. Se sospecha que una diarrea es causada por protozoos cuando dura más de 7 días.
RA/ Nauseas, vómitos, cefalea, diarrea, dolor abdominal y otras.

Presentación

6 Tabletas Recubiertas



Olmesartán 20

BIOEQUIVALENTE

Olmesartán Medoxomil 20 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en adultos y tratamiento de la hipertensión en niños y adolescentes de 6 a menos de 18 años de edad.
RA/ Dolor de espalda, diarrea, cefalea, rinitis y otras.

Presentación

28 Tabletas Recubiertas



Olmesartán 20 + Amlodipina 5

BIOEQUIVALENTE


Olmesartán Medoxomil 20 mg + Amlodipina 5 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en pacientes adultos cuya presión arterial no está adecuadamente controlada con Olmesartán Medoxomil o Amlodipina en monoterapia.
RA/ Mareo, dolor de cabeza, hinchazón de los tobillos, pies y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Olmesartán 40

BIOEQUIVALENTE

Olmesartán Medoxomil 40 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en adultos y tratamiento de la hipertensión en niños y adolescentes de 6 a menos de 18 años de edad.
RA/ Dolor de espalda, diarrea, cefalea, rinitis y otras.

Presentación

28 Tabletas Recubiertas



Olmesartán 40 + Amlodipina 5

BIOEQUIVALENTE

Olmesartán Medoxomil 40 mg + Amodipina 5 mg

Indicaciones:

Tratamiento de la hipertensión esencial. Olmesartán + Amlodipina está indicado en pacientes adultos cuya presión arterial no está adecuadamente controlada con Olmesartán Medoxomilo o Amlodipino en monoterapia.
RA/ Hiperglucemia, hiperpotasemia, hipertrigliceridemia, hiperuricemia, confusión y depresión.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Olmesartán 40 + Amlodipina 10

BIOEQUIVALENTE

Olmesartán Medoxomil 40 mg + Amodipina 10 mg

Indicaciones:

Tratamiento de la hipertensión esencial. Olmesartán + Amlodipina está indicado en pacientes adultos cuya presión arterial no está adecuadamente controlada con Olmesartán Medoxomilo o Amlodipino en monoterapia.
RA/ Hiperglucemia, hiperpotasemia, hipertrigliceridemia, hiperuricemia, confusión y depresión.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Omeprazol 20


Omeprazol 20 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de la úlcera duodenal y de la úlcera gástrica benigna, incluyendo las que complican los tratamientos con fármacos antiinflamatorios no esteroides (AINEs). Reflujo gastroesofágico
RA/ Náuseas, diarrea, cefalea, estreñimiento, flatulencia y otras.

Presentación

100 Cápsulas Gastrorresistentes



Pantoprazol 40

Pantoprazol 40 mg

Indicaciones:

Está indicado en adultos y adolescentes a partir de 12 años para esofagitis por reflujo. Pantoprazol está indicado para erradicación de Helicobacter pylori (H. pylori) en combinación con terapia antibiótica adecuada en pacientes con H. pylori asociado a úlceras, úlcera gástrica y duodenal, síndrome de Zollinger Ellison y otras enfermedades hipersecretoras patológicas.
RA/ Trastornos del sueño, cefalea, vértigos, alteraciones del gusto y otras.

Presentación

100 Tabletas de Liberación Retardada



Penicilina G Benzatínica 1.200.000 IU

Indicaciones:
se usa paratratar y prevenir ciertas infecciones provocadas por bacterias. La inyección de penicilina G benzatina es una clase de antibióticos llamados tetraciclinas. Funciona matando las bacterias que causan infecciones.
RA/Nauseas,Vómitos,dolor e inflamación y otras.

Presentación
1 Vial Con 1 g de Penicilina + 1 Ampolla de Lidocaina Suspension Inyectable



Persea Gratissima 100 mg + Glycine Max 200 mg

Persea Gratissima 100 mg + Glycine Max 200 mg

Indicaciones:
Está indicado en el tratamiento sintomático de acción lenta de la osteoartritis de cadera y rodilla. Reumatología, tratamiento sintomático de la acción lenta de la osteoartritis. Prevención de la degradación del cartílago.
RA/ Fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y otras.

Presentación
30 Cápsulas



Pregabalina 75

BIOEQUIVALENTE

Pregabalina 75 mg

Indicaciones:
Está indicado en el tratamiento del dolor neuropático periférico y central en adultos, trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en adultos, epilepsia y en el tratamiento combinado de las crisis parciales con o sin generalización secundaria.
RA/ Estado de ánimo eufórico, confusión, irritabilidad, desorientación, insomnio y otras.

Presentación
30 Cápsulas



Pregabalina 150

BIOEQUIVALENTE

Pregabalina 150 mg

Indicaciones:
Está indicado en el tratamiento del dolor neuropático periférico y central en adultos, trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en adultos, epilepsia y en el tratamiento combinado de las crisis parciales con o sin generalización secundaria.
RA/ Estado de ánimo eufórico, confusión, irritabilidad, desorientación, insomnio y otras.

Presentación
30 Cápsulas



Pre & Probióticos

Mezcla Probiótica ($1x10^9$ de UFC)

Indicaciones:
Está indicado para una variedad de trastornos gastrointestinales. Los Probióticos parecen alterar la microflora intestinal y pueden ejercer su efecto. Los probióticos se han utilizado para tratar problemas intestinales como diarrea aguda y crónica, síndrome del intestino irritable, SIBO, IBD, etc.
RA/ No presenta.

Presentación
30 Sobres Polvo para Suspensión Oral



Pre & Probióticos Plus

Mezcla probióticas (1x10^{8}de UFC) + Vitamina A + Vitamina C + Vitamina E

Indicaciones:

Está indicado para una variedad de trastornos gastrointestinales. Los Probióticos parecen alterar la microflora intestinal y pueden ejercer su efecto. Los probióticos se han utilizado para tratar problemas intestinales como diarrea aguda y crónica, síndrome del intestino irritable, SIBO, IBD, etc.
RA/ No presenta.

Presentación

30 Cápsulas



Progesterona 200

Progesterona 200 mg

Indicaciones:

Pertenece al grupo de medicamentos denominados progestágenos y contiene progesterona natural,se usa para los trastornos ligados a una insuficiencia en progesterona, también en el tratamiento hormonal sustitutivo para la menopausia, para resolver algunos problemas de fertilidad y Otros.
RA/Cefalea,malestar estomacal, vómito , diarrea,cansancio y otras

Presentación

30 Cápsulas de Gelatina Blanda Vía de Administración Oral y Vaginal



Quetiapina 25

Quetiapina 25 mg

Indicaciones:

Quetiapina esta indicado en tratamiento del trastorno bipolar, tratamiento de los episodios maníaticos moderados a graces en el trastorno bipolar,tratamiento de los episodios depresivos mayores en el trastorno bipolaro para el tratamiento de la recurrencia de episodios maníaticos o depresivos de pacientes con trastorno bipolar quienes previamente han respondido al tratamiento con quetiapina. El tratamiento adicional de los episodios mayores en pacientes con Trastorno Depresivo Mayor entre otro. RA Mareos , boca seca,indigestión,dolor en las articulaciones y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Quetiapina 50

Quetiapina 50 mg

Indicaciones:

Quetiapina esta indicado en tratamiento del trastorno bipolar, tratamiento de los episodios maníaticos moderados a graces en el trastorno bipolar,tratamiento de los episodios depresivos mayores en el trastorno bipolaro para el tratamiento de la recurrencia de episodios maníaticos o depresivos de pacientes con trastorno bipolar quienes previamente han respondido al tratamiento con quetiapina. El tratamiento adicional de los episodios mayores en pacientes con Trastorno Depresivo Mayor entre otro. RA Mareos , boca seca,indigestión,dolor en las articulaciones y otras.

Presentación

30 Tabletas de Liberación Extendida



Quetiapina 100

Quetiapina 100 mg

Indicaciones:

Quetiapina esta indicado en tratamiento del trastorno bipolar, tratamiento de los episodios maníaticos moderados a graces en el trastorno bipolar,tratamiento de los episodios depresivos mayores en el trastorno bipolaro para el tratamiento de la recurrencia de episodios maníaticos o depresivos de pacientes con trastorno bipolar quienes previamente han respondido al tratamiento con quetiapina. El tratamiento adicional de los episodios mayores en pacientes con Trastorno Depresivo Mayor entre otro. RA Mareos , boca seca,indigestión,dolor en las articulaciones y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Quetiapina 300

Quetiapina 300 mg

Indicaciones:

Quetiapina esta indicado en tratamiento del trastorno bipolar, tratamiento de los episodios maníaticos moderados a graces en el trastorno bipolar,tratamiento de los episodios depresivos mayores en el trastorno bipolaro para el tratamiento de la recurrencia de episodios maníaticos o depresivos de pacientes con trastorno bipolar quienes previamente han respondido al tratamiento con quetiapina. El tratamiento adicional de los episodios mayores en pacientes con Trastorno Depresivo Mayor entre otro. RA Mareos , boca seca,indigestión,dolor en las articulaciones y otras.

Presentación

30 Tabletas de Liberación Extendida



Rivaroxabán 10

Rivaroxabán 10 mg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Es un anticoagulante, Está indicado para tratar la trombosis venosa profunda (TVP; un coágulo, generalmente en la pierna) y la embolia pulmonar (EP; un coágulo de sangre en el pulmón) en los adultos.
RA/Espasmo muscular,dolor de estómago , vómitos y otras

Presentación

28 Tabletas Recubiertas



Rivaroxabán 15

Rivaroxabán 15 mg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Es un anticoagulante, Está indicado para tratar la trombosis venosa profunda (TVP; un coágulo, generalmente en la pierna) y la embolia pulmonar (EP; un coágulo de sangre en el pulmón) en los adultos.
RA/Espasmo muscular,dolor de estómago , vómitos y otras

Presentación

28 Tabletas Recubiertas



Rivaroxabán 20

Rivaroxabán 20 mg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Es un anticoagulante, Está indicado para tratar la trombosis venosa profunda (TVP; un coágulo, generalmente en la pierna) y la embolia pulmonar (EP; un coágulo de sangre en el pulmón) en los adultos.
RA/Espasmo muscular,dolor de estómago , vómitos y otras

Presentación

28 Tabletas Recubiertas



Rosuvastatina 10

Rosuvastatina 10 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la hipercolesterolemia, adultos, adolescentes y niños de edad igual o mayor de 6 años con hipercolesterolemia primaria (tipo IIa incluyendo hipercolesterolemia familiar heterocigótica) o dislipidemia mixta (tipo IIb) como medida complementaria a la dieta cuando la respuesta obtenida con la dieta y otros tratamientos no farmacológicos (p. ej., ejercicio, pérdida de peso) no ha sido adecuada. Prevención de eventos cardiovasculares, Prevención de eventos cardiovasculares mayores en pacientes considerados de alto riesgo.
RA/ Cefalea, mareos, diarrea, estreñimiento, náuseas y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Rosuvastatina 20

Rosuvastatina 20 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la hipercolesterolemia, adultos, adolescentes y niños de edad igual o mayor de 6 años con hipercolesterolemia primaria (tipo IIa incluyendo hipercolesterolemia familiar heterocigótica) o dislipidemia mixta (tipo IIb) como medida complementaria a la dieta cuando la respuesta obtenida con la dieta y otros tratamientos no farmacológicos (p. ej., ejercicio, pérdida de peso) no ha sido adecuada. Prevención de eventos cardiovasculares, Prevención de eventos cardiovasculares mayores en pacientes considerados de alto riesgo.
RA/ Cefalea, mareos, diarrea, estreñimiento, náuseas y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Rupatadina 10

Rupatadina 10 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento sintomático de la rinitis alérgica y la urticaria en adultos y adolescentes (mayores de 12 años).
RA/ Faringitis, rinitis, apetito aumentado, somnolencia y otras.

Presentación

100 Tabletas



Saccharomyces Boulardii 200

Saccharomyces Boulardii 200 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de la diarrea: diarrea del viajero, diarrea viral en niños y diarrea asociada con antibióticos, tratamiento del síndrome del intestino irritable, tratamiento y prevención de complicaciones digestivas después de la terapia con antibióticos: diarrea, colitis, candidiasis y prevención de la diarrea durante la alimentación enteral continua en adultos.
RA/ Flatulencia, urticaria.

Presentación

10 Sobres Polvo para Suspensión



Saccharomyces Boulardii 250

Saccharomyces Boulardii 250 mg

Indicaciones:

Está indicado en adultos y niños para el tratamiento sintomático de las diarreas agudas inespecíficas y en la prevención y tratamiento sintomático de los procesos diarreicos producidos por la administración de antibióticos.
RA/ Reacción anafiláctica con prurito, urticaria, rash cutáneo, flatulencia.

Presentación

10 Sobres Polvo para Suspensión



Saccharomyces Boulardii 250

Saccharomyces Boulardii 250 mg

Indicaciones:

Está indicado en adultos y niños para el tratamiento sintomático de las diarreas agudas inespecíficas y en la prevención y tratamiento sintomático de los procesos diarreicos producidos por la administración de antibióticos.
RA/ Reacción anafiláctica con prurito, urticaria, rash cutáneo, flatulencia.

Presentación

10 Cápsulas



Sertralina 50

Sertralina 50 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de episodios depresivos mayores, prevención de reaparición de episodios depresivos mayores, trastorno de angustia, con o sin agorafobia, trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) en adultos y pacientes pediátricos de 6-17 años, trastorno de ansiedad social (fobia social) y trastorno por estrés post-traumático (TEPT).
RA/ Náuseas, apetito disminuido, apetito aumentado, insomnio.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Sildenafil 50

Sildenafil 50 mg

Indicaciones:

Es un inhibidor potente y selectivo de Guanosin Monofosfatociclico Fosfodiasterasa (GMPc), responsable de la acción periférica sobre las erecciones, siendo indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil.
RA/ Cefalea, rubor, mareos, dispepsia, diarrea y otras.

Presentación

4 Comprimidos Recubiertos



Sildenafil 100

Sildenafil 100 mg

Indicaciones:

Es un inhibidor potente y selectivo de Guanosin Monofosfatociclico Fosfodiasterasa (GMPc), responsable de la acción periférica sobre las erecciones, siendo indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil.
RA/ Cefalea, rubor, mareos, dispepsia, diarrea y otras.

Presentación

4 Comprimidos Recubiertos



Silnamys

Multivitamínico + Aminoácidos

Indicaciones:

Suplemento nutricional multivitamínico en conjunto con aminoácidos esenciales, un producto dietético.
RA/ No presenta.

Presentación

110 mL Jarabe



Simvastatina 20 + Ezetimiba 10

Simvastatina 20 mg + Ezetimiba 10 mg

Indicaciones:

Está indicado para reducir el riesgo de acontecimientos cardiovasculares en pacientes con cardiopatía coronaria (CC) y antecedentes de síndrome coronario agudo (SCA), Hipercolesterolemia.
RA/ Mareos, cefalea, dolor abdominal, dispepsia, flatulencia, náuseas y vómitos.

Presentación

30 Tabletas



Simvastatina 40 + Ezetimiba 10

Simvastatina 40 mg + Ezetimiba 10 mg

Indicaciones:

Indicaciones: Está indicado para reducir el riesgo de acontecimientos cardiovasculares en pacientes con cardiopatía coronaria (CC) y antecedentes de síndrome coronario agudo (SCA), Hipercolesterolemia. RA/ Mareos, cefalea, dolor abdominal, dispepsia, flatulencia, náuseas y vómitos.

Presentación

30 Tabletas



Sitagliptina 100

Sitagliptina 100 mg

Indicaciones:

Está indicado para mejorar el control glucémico en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2: Como monoterapia en pacientes controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio por sí solos y para los que el uso de Metformina no es adecuado debido a contraindicaciones o intolerancia. Como terapia oral doble en combinación con Metformina en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con el tratamiento de Metformina sola, no proporcionen un control glucémico adecuado. Como terapia oral triple en combinación con una sulfonilurea y Metformina en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con el tratamiento dual con estos medicamentos, no proporcionen un control glucémico adecuado. RA/ Dolor de cabeza, mareo, estreñimiento, vómitos.

Presentación

10 Tabletas Recubiertas



Sitagliptina 50 + Metformina 1000

BIOEQUIVALENTE

Sitagliptina 50 mg + Metformina Clorhidrato 1000 mg

Indicaciones:

Está indicado para mejorar el control glucémico en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2: como monoterapia en pacientes controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio por sí solos y para los que el uso de Metformina no es adecuado debido a contraindicaciones o intolerancia. Como terapia oral doble en combinación con Metformina en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con el tratamiento de Metformina sola, no proporcionen un control glucémico adecuado. RA/ Trombocitopenia, hipoglucemia, dolor de cabeza, mareo, estreñimiento.

Presentación

20 Tabletas Recubiertas



Tamsulosina 0.4

Tamsulosina Clorhidrato 0.4 mg

Indicaciones:

Está indicado en hombres para tratar los síntomas del agrandamiento de la próstata (hiperplasia prostática benigna) que incluye dificultad para orinar (intermitencia, goteo, debilidad en el flujo de orina y vaciado incompleto de la vejiga), dolor al orinar y necesidad de orinar con más frecuencia y urgencia. RA/ Mareos, edema, cefalea, náuseas, diarrea y otras.

Presentación

30 Cápsulas de Liberación Prolongada



Tamsulosina 0.4 + Dutasterida 0.5

Tamsulosina Clorhidrato 0.4 mg + Dutasterida 0.5 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de próstata (HBP) y reducción del riesgo de retención aguda de orina (RAO) y de cirugía en pacientes con síntomas de moderados a graves de HBP. RA/ Mareo, dolor de cabeza, estreñimiento, diarrea, náuseas y otras.

Presentación

30 Cápsulas de Liberación Modificada



Telmisartan 80

BIOEQUIVALENTE

Telmisartán 80 mg

Indicaciones:

Está indicado para la hipertensión esencialmente en adultos, prevención cardiovascular, enfermedad cardiovascular alerotrombiótica o enfermedad arterial periférica. Diabetes melitus tipo 2 con lesión de órgano diana documentada.
RA/ Diarrea, angioedema, dolor de espalda, infecciones respiratorias y otras.

Presentación

30 Tabletas



Tramadol 50

Tramadol Clorhidrato 50 mg

Indicaciones:

El Tramadol es un analgésico opioide de acción central. Es un antagonista puro no selectivo en los receptores de opioides μ, δ y κ con una afinidad mayor para el receptor, utilizado para el tratamiento de dolor de intensidad moderada a severa y tiene un efecto antitusivo.
RA/ Somnolencia, sudoración, mareos, vómitos, xerostomía y otras.

Presentación

100 Cápsulas



Tridiuvo

Clotrimazol 1% + Neomicina 0.5% + Betametasona 0.05%

Indicaciones:

Antiinflamatorio, antibacteriano, antimicótico tópico. Afecciones inflamatorias, micóticas y bacterianas de la piel, causadas por gérmenes sensibles al Clotrimazol y/o a la Neomicina. Dermatitis por contacto, seborreica, eccema.
RA/ Hipersensibilidad a alguno de los componentes, afecciones tuberculosas o virales de la piel.

Presentación

20 Gramos Crema Tópica



Trimetazidina 35 MR

Clorhidrato de Trimetazidina 35 mg

Indicaciones:

Está indicada en adultos como terapia adicional para el tratamiento sintomático de pacientes con angina de pecho estable que no están adecuadamente controlados o no toleran terapias anti anginosas de primera línea.
RA/ Cefalea, rubor facial, taquicardia refleja, hipotensión, bradicardia y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas de Liberación Modificada



Valsartán 160

BIOEQUIVALENTE

Valsartán 160 mg

Indicaciones:

Esta indicada para tratar la presión arterial alta en adultos y en niños y adolescentes de 6 a 18 años de edad, tratar a personas después de un ataque cardiaco reciente y tratar la insuficiencia cardiaca sintomática en pacientes adultos.
RA/ Tos, dolor abdominal, náuseas, diarrea y cansancio.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Valsartán 160 + Hidroclorotiazida 12.5

BIOEQUIVALENTE

Valsartán 160 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg

Indicaciones:

Indicaciones: Esta indicada para tratar la presión arterial alta que no se controla adecuadamente con el uso de un único componente.
RA/ Hinchazón en la cara, lengua o faringe, dificultad para tragar, urticaria y dificultad para respirar.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Valsartán 320

BIOEQUIVALENTE

Valsartán 320 mg

Indicaciones:

Esta indicada para tratar la presión arterial alta en adultos y en niños y adolescentes de 6 a 18 años de edad, tratar a personas después de un ataque cardiaco reciente y tratar la insuficiencia cardiaca sintomática en pacientes adultos.
RA/ Tos, dolor abdominal, náuseas, diarrea y cansancio.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Valsartán 320 + Hidroclorotiazida 25

BIOEQUIVALENTE

Valsartán 320 mg + Hidroclorotiazida 25 mg

Indicaciones:

Esta indicada para tratar la presión arterial alta que no se controla adecuadamente con el uso de un único componente.
RA/ Hinchazón en la cara, lengua o faringe, dificultad para tragar, urticaria y dificultad para respirar.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Verapamilo 240 SR

Verapamilo Clorhidrato 240 mg

Indicaciones:

El Clorhidrato de Verapamilo es un bloqueante de los canales de Calcio activo por vía oral se administra para el tratamiento de la angina, la hipertensión y las taquiarritmias supraventriculares.
RA/ Bradicardia, hipotensión, rash, mareos, fatiga y otras.

Presentación

20 Tabletas



Vildagliptina 50

Vildagliptina 50 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, en el tratamiento de pacientes adultos que no pueden conseguir un control suficiente de la glucemia con la dosis máxima tolerada de Metformina en monoterapia por vía oral o que ya están en tratamiento con la combinación de Vildagliptina y Metformina en comprimidos individuales.
RA/ Disfunción hepática (incluyendo hepatitis), urticaria, lesiones de la piel exfoliativas y bullosas, incluido el penfigoide bulloso.

Presentación

20 Tabletas Recubiertas



Vildagliptina 50 + Metformina 500

Vildagliptina 50 mg + Metformina Clorhidrato 500 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, en el tratamiento de pacientes adultos que no pueden conseguir un control suficiente de la glucemia con la dosis máxima tolerada de Metformina en monoterapia por vía oral o que ya están en tratamiento con la combinación de Vildagliptina y Metformina en comprimidos individuales.
RA/ Disfunción hepática (incluyendo hepatitis), urticaria, lesiones de la piel exfoliativas y bullosas, incluido el penfigoide bulloso.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Vildagliptina 50 + Metformina 850

Vildagliptina 50 mg + Metformina Clorhidrato 850 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, en el tratamiento de pacientes adultos que no pueden conseguir un control suficiente de la glucemia con la dosis máxima tolerada de Metformina en monoterapia por vía oral o que ya están en tratamiento con la combinación de Vildagliptina y Metformina en comprimidos individuales.
RA/ Disfunción hepática (incluyendo hepatitis), urticaria, lesiones de la piel exfoliativas y bullosas, incluido el penfigoide bulloso.

Presentación

20 Tabletas Recubiertas



Vildagliptina 50 + Metformina 1000

Vildagliptina 50 mg + Metformina Clorhidrato 1000 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, en el tratamiento de pacientes adultos que no pueden conseguir un control suficiente de la glucemia con la dosis máxima tolerada de Metformina en monoterapia por vía oral o que ya están en tratamiento con la combinación de Vildagliptina y Metformina en comprimidos individuales.
RA/ Disfunción hepática (incluyendo hepatitis), urticaria, lesiones de la piel exfoliativas y bullosas, incluido el penfigoide bulloso.

Presentación

20 Tabletas Recubiertas



Vitamina E 400


Vitamina E400 UI

Indicaciones:

Está indicada en la prevención y tratamiento de deficiencia de Vitamina E, en enfermedades con síndrome de malabsorción que cursen con esteatorrea, resecciones gastrointestinales, enfermedad celíaca, fibrosis quística, enfermedad del tracto hepato-biliar (colestasis crónica, obstrucción biliar, atresia biliar) y abetalipoproteinemia.
RA/ Diarrea, náuseas, flatulencia, espasmos abdominales y sangrado gingival.

Presentación

30 Cápsulas de Gelatina Blanda



Vitamin C 500

Vitamin C 500 mg

Indicaciones:

El Ácido Ascórbico o Vitamina C pertenece a una clase de medicamentos llamados antioxidantes. El cuerpo lo necesita para ayudar a la cicatrizaciónde las heridas, mejorar la absorción de hierro de los alimentos vegetales y apoyar el sistema inmunológico.
RA/Diarrea , nauseas , acidez estomacal y otras.

Presentación

100 Tabletas Masticables



Xtrina 81

Aspirina 81 mg

Indicaciones:

Está indicado para el alivio del dolor, la fiebre y la inflamación de una variedad de afecciones como la gripe, el resfriado común. Para reducir el riesgo de mortalidad vascular en pacientes con sospecha de infarto agudo de miocardio, para reducir el riesgo de un primer infarto de miocardio, para la profilaxis del tromboembolismo venoso después del reemplazo total de cadera.
RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, hemorragia y / o ulceración gastrointestinal y otras.

Presentación

100 Tabletas de Liberación Retardada



Zinc 10/5

Zinc 10mg/5mL

Indicaciones:

Está indicado en los estados carenciales de Zinc, siempre que no puedan ser corregidos mediante dieta
RA/ Puede provocar deficiencia de cobre.

Presentación

120 mL Jarabe





ADIUVO®

Proximos Ingresos

- Dexlansoprazol 30 mg
- Diclofenaco Potásico 50 mg
- Celecoxib 200 mg
- Mebendazol 100 mg
- Acetaminofeno 325mg + Fenilefrina HCl 5mg + Dextrometorfano HBr 10mg
- Apixaban 2.5 mg
- Bromuro de Otilonio 40 mg
- Acetaminofeno 325mg + Fenilefrina HCl 5mg + Succinato de Doxilamina 6.25mg + Dextrometorfano Hbr 10mg
- Apixaban 5 mg
- Valsartán 160mg + HCTZ 12.5mg + Amlodipina 5mg
- Valsartán 320mg + HCTZ 25mg + Amlodipina 10mg
- Cinitaprida 1mg
- Dexlansoprazol 60 mg
- Bupropione 150 mg XL
- Novagón Natural
- Novagón Naranja-Piña
- Diosmina 900mg + Hesperidina 100mg (Tabletas)
- Hidroclorotiazida 25mg
- Dolo-NervioVital inyectable



2023 CALENDARIO

Enero

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Febrero

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Marzo

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Abril

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Mayo

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Junio

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Julio

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Agosto

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Septiembre

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Octubre

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Noviembre


LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Diciembre

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

PRODUCTOS DE CALIDAD PARA TU BIENESTAR

ADIUVO®



Honduras Droguería Europea S.A. (+504) 2236-8453

El Salvador Droguería Europea S.A., de C.V. (+503) 2264-2033

Costa Rica Droguería Europea S.A. (+506) 4881-1300

Nicaragua Distribuidora Europea Nicaragua S.A. (+505) 2298-0777

Guatemala Droguería Europea Guatemala S.A.

info@adiuvopharma.com