

Productos de CALIDAD para su BIENESTAR

Vademécum



ADIUVO®

Escanéame



<https://www.adivopharma.com/>



Adiuvo



ADIUVO®



GENÉRICOS DE CALIDAD

MISMA CALIDAD

MISMA EFICACIA



ADIUVO®

Vademécum



Acetaminofén 100

Acetaminofén 100mg/mL

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve a moderada y estados febriles.

RA/ Enrojecimiento de la piel, ampollas, erupción.

Presentación

15 mL
Suspensión Oral
(Gotas Orales)



Acetaminofén 160/5

Acetaminofén 160mg/ml

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve a moderada, alivia el resfriado común y estados febriles que duran más de 3 días.

RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y otras.

Presentación

60 ml
Solución Oral



Acetaminofén 500

Acetaminofén 500 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve a moderada y estados febriles.

RA/ Hipoglucemia y dermatitis alérgica, por lo general, raras o muy raras.

Presentación

100
Comprimidos



Acetaminofén 750

Acetaminofén 750 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve a moderada y estados febriles.

RA/ Hipoglucemia y dermatitis alérgica, por lo general, raras o muy raras.

Presentación

100
Tabletas



Aciclovir

Aciclovir 5%

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de las manifestaciones tópicas del herpes simple y zoster.

RA/ Ardor, escozor, resequedad, descamación y otras.

Presentación

15 g
Crema Tópica



ADIUVO®

Vademécum



Ácido Fólico 5

Ácido Fólico 5 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento y prevención de la deficiencia de Ácido Fólico, especialmente durante la gestación, lactancia y periodos de crecimiento rápidos. También está indicado en la prevención de las malformaciones del tubo neural (espinia bifida, meningocele, anencefalia).
RA/ Eritema, fiebre.

Presentación

100
Tabletas



Ácido Ibandrónico 150

Ácido Ibandrónico 150 mg

Indicaciones:

También llamado Ibandronato, es un medicamento que pertenece al grupo de los bifosfonatos. Está indicado en el tratamiento de la osteoporosis en mujeres que han alcanzado la menopausia.
RA/ Dispepsia, cefalea, dolor musculoesquelético, trastornos gastrointestinales y otras.

Presentación

1
Tableta
Recubierta



Akothac

Alfa Cetoanálogo de aminoácidos esenciales

Indicaciones:

Prevención y tratamiento de daños causados por un fallo o deficiencia en el metabolismo de proteínas en enfermedades renal crónica en relación con un consumo limitado de la ingesta de proteínas en la dieta.
RA/Puede presentarse acidez estomacal y náuseas

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Alendronato 70

Ácido Alendrónico 70 mg

Indicaciones:

Es un bisfosfonato de segunda generación, primer fármaco que no sólo previene la pérdida de hueso, sino que origina su endurecimiento. Se trata de un potente inhibidor de la resorción ósea, pero a diferencia de otros bisfosfonatos de la primera generación, no inhibe la mineralización ósea.
RA/ Cefalea, flatulencia, trastornos gastroesofágicos y otras.

Presentación

4
Tabletas



Alitrio Día

Acetaminofén 325 mg + Dextrometorfano Bromhidrato 10 mg+ Fenilefrina Clorhidrato 5 mg

Indicaciones:

Está indicado para el alivio sintomático de los procesos catarrales y gripales que causan con dolor leve a moderado, fiebre, tos improductiva (tos irritativa, tos nerviosa) y secreción nasal.
RA/ Náuseas, vómitos, ansiedad, nerviosismo y otras.

Presentación

12
Cápsulas



ADIUVO®

Vademécum

Alitrio Noche



Acetaminofén 325 mg + Dextrometorfano Bromhidrato 10 mg+ Doxilamina Succinato 6.25 mg + Fenilefrina Clorhidrato 5 mg

Indicaciones:

Indicado para el alivio a corto plazo de dolores menores, fiebre, cefalea, rinitis alérgica y/o otros síntomas (por ejemplo, rinorrea, estornudos, lagrimeo, picos de ojos, congestión nasal, tos) asociados a la rinitis alérgica estacional o perenne, a otras alergias de las vías respiratorias superiores o al resfriado. RA/ Náuseas, vómitos, ansiedad, nerviosismo y otras.

Presentación

12
Cápsulas

Alopurinol 300



Alopurinol 300 mg

Indicaciones:

Se utiliza para reducir las concentraciones de urato en los líquidos corporales y/o en la orina para prevenir o eliminar los depósitos de ácido úrico y uratos. Alopurinol está indicado para el tratamiento de las principales manifestaciones clínicas de depósito de ácido úrico/uratos. RA/ Vértigo, cefalea, náuseas, vómito y otras.

Presentación

30
Tabletas

Ambroxol 15/5

Ambroxol Clorhidrato 15mg/5 mL



Indicaciones:

Está indicado para afecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias que requieran tratamiento secretolítico. RA/ Vómitos, diarrea, dispepsia, dolor abdominal, sequedad de boca, urticaria.

Presentación

120 mL
Jarabe

Ambroxol 7.5 + Clenbuterol 0.005/5

Ambroxol 7.5 mg + Clenbuterol 0.005/5 mL



Indicaciones:

Reducción de la viscosidad de las secreciones mucosas, facilitando su expulsión, en procesos catarrales y gripales, para adultos y niños mayores de 2 años. Asma bronquial, bronquitis asmática y espástica. RA/ En rara ocasión se presentan reacciones de hipersensibilidad, prurito, angioedema, náuseas, vómitos.

Presentación

120 mL
Jarabe

Ambroxol 15 + Dextrometorfano 7.5

Ambroxol Clorhidrato 15 mg + Dextrometorfano Hidrobromuro 7.5mg



Indicaciones:

Indicado para el alivio de la tos, debido a irritaciones menores de los bronquios y de la garganta, coadyuvante en procesos broncopulmonares que cursen con aumento de la viscosidad y adherencia del moco. RA/Diarrea, náuseas, vómito, cefalea, gastritis

Presentación

120 mL
Jarabe



ADIUVO®

Vademécum



Amikacina 500/2

Amikacina 500 mg / 2 mL



Indicaciones:

Es un antibiótico del grupo de los aminoglucósidos que actúan eliminando bacterias (gérmenes) que causan infecciones. Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones víricas como la gripe o el catarro.

RA/ La amikacina puede causar problemas de los nervios, ardor, hormigueo o entumecimiento en las manos, brazos, pies o piernas

Presentación

1 Ampolla
Solución
Inyectable

Amitriptilina 25

Amitriptilina Clorhidrato 25 mg



Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento del trastorno depresivo mayor en adultos, tratamiento del dolor neuropático en adultos, tratamiento profiláctico de la cefalea crónica tipo tensional en los adultos, tratamiento profiláctico de la migraña en adultos y tratamiento de la enuresis nocturna en los niños de edad igual o superior a 6 años.
RA/ Es probable que con dosis altas se produzcan arritmias cardíacas e hipotensión grave.

Presentación

100
Tabletas
Recubiertas

Amlodipina 5

Amlodipina 5 mg



Indicaciones:

Está indicado para la hipertensión arterial alta o un cierto tipo de dolor en el pecho llamado angina.

RA/ Cefalea, somnolencia, mareo, (inicio del tto.), debilidad, palpitaciones y otras.

Presentación

30
Tabletas

Amlodipina 10

Amlodipina 10 mg



Indicaciones:

Está indicado para la hipertensión arterial alta a un cierto tipo de dolor en el pecho llamado angina.

RA/ Cefalea, somnolencia, mareo, (al inicio del tto.) debilidad, palpitaciones y otras

Presentación

30
Tabletas

Amoxicilina 125 / 5

Amoxicilina 125 mg / 5 mL



Indicaciones:

Antibiótico utilizado para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, como neumonía, bronquitis, gonorrea y las infecciones de los oídos, nariz, garganta, vías urinarias y la piel.

RA/ Trastorno gastrointestinal y otras

Presentación

60 ml
Polvo para
Suspensión



ADIUVO®

Vademécum



Amoxicilina 250

Amoxicilina 250mg / 5 mL

Indicaciones:

Antibiótico utilizado para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, como neumonía, bronquitis, gonorrea y las infecciones de los oídos, nariz, garganta, vías urinarias y la piel.
RA/ Trastorno gastrointestinal y otras

Presentación

100 ml
Polvo para
Suspensión



Amoxicilina

Amoxicilina 500 mg

Indicaciones:

Antibiótico utilizado para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, como neumonía, bronquitis, gonorrea y las infecciones de los oídos, nariz, garganta, vías urinarias y la piel.
RA/ Fiebre Trastorno gastrointestinal y otras

BIOEQUIVALENTE

Presentación

100
Cápsulas



Amoxicilina + Ácido Clavulánico

Amoxicilina 400 mg + Ácido Clavulánico 57 mg

Indicaciones:

Antibiótico utilizado para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, incluyendo infecciones en los oídos, pulmones, senos, piel y vías urinarias.
RA/ Fiebre, trastornos gastrointestinales y otras.

Presentación

70 ml
Polvo para
Suspensión



Amoxicilina 875 + Ácido Clavulánico 125

Amoxicilina Trihidratada 875 mg + Ácido Clavulánico 125 mg

Indicaciones:

Antibiótico utilizado para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, incluyendo infecciones en los oídos, pulmones, senos, piel y vías urinarias.
RA/ Fiebre, trastorno gastrointestinal y otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

15
Tabletas
Recubiertas



Ampicilina + Sulbactam 1500

Ampicilina 1000 mg + Sulbactam 500 mg

Indicaciones:

Infecciones de la piel y de la estructura de la piel, infecciones intraabdominales, infecciones ginecológicas.
RA/ Mareos, disnea, convulsiones, urticaria y otras.

Presentación

1
Vial
IM / IV



ADIUVO®

Vademécum



Apixabán 2.5

Apixabán 2.5 mg

Indicaciones:

Para la prevención de eventos tromboembólicos venosos en pacientes adultos que se han sometido a cirugía electiva de reemplazo total de cadera o rodilla total.

RA/ Anemia, orina de color rojo, sangrado de nariz y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Apixabán 5

Apixabán 5 mg

Indicaciones:

Para la prevención de eventos tromboembólicos venosos en pacientes adultos que se han sometido a cirugía electiva de reemplazo total de cadera o rodilla total.

RA/ Anemia, orina de color rojo, sangrado de nariz y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Aponia

Dimeticona 300 mg + Bromuro de Pinaverio 100 mg

Indicaciones:

Es un tratamiento integral con triple mecanismo de acción (antiespasmódico, regulador del tránsito intestinal y antiflatulento) indicado en el síndrome de Intestino Irritable (S.I.I.)

RA/ Dolor abdominal, prurito, rash, regurgitación y otras.

Presentación

30
Cápsulas de
Gelatina Blanda



Atenolol 100

Atenolol 100 mg

Indicaciones:

Está indicado para tratar la hipertensión. Prevención de angina (dolor en el tórax) -Tratamiento de los ataques cardíacos. Actúa relajando los vasos sanguíneos y la disminución de la frecuencia cardíaca para mejorar el flujo sanguíneo y disminuir la presión arterial.

RA/ Bradicardia, hipotensión, fenómeno de Raynaud, fatiga, náuseas y otras.

Presentación

100
Tabletas



Atorvastatina 10

Atorvastatina 10 mg

Indicaciones:

Se utiliza junto con una dieta balanceada, pérdida de peso y ejercicio para reducir el riesgo de infarto y apoplejía y para reducir la probabilidad de que se necesite una cirugía de corazón en las personas que tienen una enfermedad del corazón o que estén en riesgo de desarrollar enfermedad del corazón.

RA/ Cefalea, somnolencia, diarrea, dolor abdominal, mialgias y otras

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Comprimidos
Recubiertos



ADIUVO®

Vademécum

BIOEQUIVALENTE



Atorvastatina 20

Atorvastatina 20 mg

Indicaciones:

Se utiliza junto con una dieta balanceada, pérdida de peso y ejercicio para reducir el riesgo de infarto y apoplejía y para reducir la probabilidad de que se necesite una cirugía de corazón en las personas que tienen una enfermedad del corazón o que estén en riesgo de desarrollar enfermedad del corazón.

RA/ Cefalea, somnolencia, diarrea, dolor abdominal, mialgias y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas

BIOEQUIVALENTE



Atorvastatina 40

Atorvastatina 40 mg

Indicaciones:

Se utiliza junto con una dieta balanceada, pérdida de peso y ejercicio para reducir el riesgo de infarto y apoplejía y para reducir la probabilidad de que se necesite una cirugía de corazón en las personas que tienen una enfermedad del corazón o que estén en riesgo de desarrollar enfermedad del corazón.

RA/ Cefalea, somnolencia, diarrea, dolor abdominal, mialgias y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Atorvastatina 80

Atorvastatina 80 mg

Indicaciones:

Se utiliza junto con una dieta balanceada, pérdida de peso y ejercicio para reducir el riesgo de infarto y apoplejía y para reducir la probabilidad de que se necesite una cirugía de corazón en las personas que tienen una enfermedad del corazón o que estén en riesgo de desarrollar enfermedad del corazón.

RA/ Cefalea, somnolencia, diarrea, dolor abdominal, mialgias y otras.

Presentación

30
Comprimidos
Recubiertos



Azitromicina

Azitromicina Anhidra 200 mg / 5 mL

Indicaciones:

Está indicada para el tratamiento de las siguientes infecciones, Sinusitis bacteriana aguda (adecuadamente diagnosticada), otitis bacteriana media aguda (adecuadamente diagnosticada), faringitis, amigdalitis, exacerbación aguda de la bronquitis crónica (adecuadamente diagnosticada), neumonía adquirida en la comunidad de leve a moderada, infecciones de la piel y tejidos blandos, uretritis y cervicitis no complicadas causadas por *Chlamydia trachomatis*.

RA/ Náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal, cefalea, somnolencia e hiperactividad.

Presentación

15 mL, 22.5 mL
30 mL, Polvo para
Suspensión Oral



Azitromicina 500

Azitromicina 500 mg

Indicaciones:

Antibiótico utilizado para tratar ciertas infecciones bacterianas, como bronquitis, neumonía, enfermedades de transmisión sexual (ITS) e infecciones de los oídos, pulmones, senos nasales, piel, garganta y órganos reproductivos.

RA/ Diarrea, náuseas, dolor abdominal, vómito, anorexia y otras.


Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



ADIUVO®

Vademécum



Bacillus Clausii

Esporas de Bacillus Clausii

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento y profilaxis de las alteraciones de la flora intestinal, Tratamiento para la recuperación de la flora bacteriana, desordenes agudos y crónicos en lactantes
RA/ No reporta.

Presentación

10
Ampollas
Bebibles



Bacillus Clausii Plus

Esporas de Bacillus Clausii

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento y profilaxis de las alteraciones de la flora intestinal, Tratamiento para la recuperación de la flora bacteriana, desordenes agudos y crónicos en lactantes
RA/ No reporta.

Presentación

5
Ampollas
Bebibles



Beclometasona 250

Beclometasona Dipropionato Anhidra 250 mcg

Indicaciones:

Pacientes asmáticos que no pueden controlar los síntomas con dosis máximas de mantenimiento de broncodilatadores o inhaladores.
RA/ Erupción, urticaria, prurito y eritema.

Presentación

200 Dosis
de Solución
para Inhalación



Bisoprolol 5

Bisoprolol Fumarato 5 mg

Indicaciones:

Es un antagonista beta adrenérgico activo por vía oral. Actúa específicamente sobre los receptores beta-1, tiene una baja solubilidad en lípidos y se elimina por vía renal y fecal. El Bisoprolol fue inicialmente aprobado para el tratamiento de la hipertensión, pero posteriormente se ha comprobado su eficacia en la cardiopatía isquémica y en la insuficiencia cardíaca.
RA/ Fatiga, bradicardia, isquemia periférica, tos y otras.

Presentación

30
Comprimidos
Recubiertos



Bisoprolol 10

Bisoprolol Fumarato 10 mg

Indicaciones:

Es un antagonista beta adrenérgico activo por vía oral. Actúa específicamente sobre los receptores beta-1, tiene una baja solubilidad en lípidos y se elimina por vía renal y fecal. El Bisoprolol fue inicialmente aprobado para el tratamiento de la hipertensión, pero posteriormente se ha comprobado su eficacia en la cardiopatía isquémica y en la insuficiencia cardíaca.
RA/ Fatiga, bradicardia, isquemia periférica, tos y otras.

Presentación

30
Comprimidos
Recubiertos



ADIUVO®

Vademécum



Bisoprolol 5 + Amlodipina 5

Bisoprolol Fumarato 5 mg + Amlodipina 5 mg

Indicaciones:

Bisoprolol + Amlodipino está indicado para el tratamiento de la hipertensión como terapia de sustitución y para aquellos pacientes cuya presión arterial no se puede controlar como monoterapia con Bisoprolol o Amlodipino.

RA/ Somnolencia, náuseas, dolor abdominal, cambios de humor y otras.

Presentación

30
Tabletas



Bisoprolol 10 + Amlodipina 5

Bisoprolol Fumarato 10 mg + Amlodipina 5 mg

Indicaciones:

Bisoprolol + Amlodipino está indicado para el tratamiento de la hipertensión como terapia de sustitución y para aquellos pacientes cuya presión arterial no se puede controlar como monoterapia con Bisoprolol o Amlodipino.

RA/ Somnolencia, náuseas, dolor abdominal, cambios de humor y otras

Presentación

30
Tabletas



Bisoprolol 5 + Hidroclorotiazida 6.25

Bisoprolol 5 mg + Hidroclorotiazida 6.25 mg

Indicaciones:

Este medicamento comprende un bloqueante selectivo de receptores beta (Bisoprolol) y un diurético tiazídico (Hidroclorotiazida, medicamento para eliminar agua del cuerpo). Se utiliza para tratar la presión sanguínea elevada (hipertensión primaria) en pacientes adultos cuya presión sanguínea no está suficientemente controlada con Bisoprolol o Hidroclorotiazida solos.

RA/ Fatiga, bradicardia, isquemia periférica, tos y otras.

Presentación

30
Comprimidos
Recubiertos



Bisoprolol 10 + Hidroclorotiazida 6.25

Bisoprolol 10 mg + Hidroclorotiazida 6.25 mg

Indicaciones:

Este medicamento comprende un bloqueante selectivo de receptores beta (Bisoprolol) y un diurético tiazídico (Hidroclorotiazida, medicamento para eliminar agua del cuerpo). Se utiliza para tratar la presión sanguínea elevada (hipertensión primaria) en pacientes adultos cuya presión sanguínea no está suficientemente controlada con Bisoprolol o Hidroclorotiazida solos.

RA/ Fatiga, bradicardia, isquemia periférica, tos y otras.

Presentación

30
Comprimidos
Recubiertos



Bromuro de Otilonio 40

Bromuro de Otilonio 40 mg

Indicaciones:

Para el tratamiento de estados espásticos y discinesias gastrointestinales en adultos.

RA/ Cefaleas, náuseas, urticaria, vértigos y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



ADIUVO®

Vademécum



Budesonida 1/2

Budesónida 1mg / 2 mL

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de mantenimiento con glucocorticoides para el control de la inflamación subyacente de las vías respiratorias en pacientes con asma bronquial. Tratamiento de pseudo crup muy grave (laringitis subglótica) en el que está indicada la hospitalización.
RA/ Erupción cutánea, dermatitis de contacto, urticaria, angioedema y reacción anafiláctica.

Presentación

20 Ampollas de Suspensión para Inhalación por Nebulizador



Bupropión 150 XL

Clohidrato de Bupropión 150 mg

Indicaciones:

Es un medicamento para el tratamiento de la depresión. Actúa sobre determinadas sustancias en el cerebro llamadas noradrenalina y dopamina las cuales están relacionadas con la depresión.
RA/ Puede provocar ansiedad, excitación, somnolencia, boca seca, mareos entre otros.

Presentación

30 Tabletas de Liberación Extendida



Bupropión 300

Bupropión Clohidrato 300 mg

Indicaciones:

Es un medicamento para el tratamiento de la depresión. Actúa sobre determinadas sustancias en el cerebro llamadas noradrenalina y dopamina las cuales están relacionadas con la depresión.
RA/ Puede provocar ansiedad, excitación, somnolencia, boca seca, mareos entre otros.

Presentación

100 Tabletas de Liberación Extendida



Calcio + D3

Citrato de Calcio 1500 mg + Vitamina D3 200 UI

Indicaciones:

Está indicado en los tratamientos de estados carenciales de Calcio y Vitamina D. Suplemento de Calcio y Vitamina D como terapia coadyuvante en el tratamiento específico de la osteoporosis, en pacientes con riesgo elevado de sufrir deficiencias combinadas de Calcio y Vitamina D.
RA/ Estreñimiento, gases, vómitos, náuseas, dolor de cabeza, debilidad.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas

BIOEQUIVALENTE



Candesartán 32

Candesartán Cilixetilo 32 mg

Indicaciones:

El Candesarán Cilixetilo actúa bloqueando la hormona angiotensina II, lo cual causa relajación de los vasos sanguíneos y produce la disminución de la presión sanguínea.
RA / Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga y otras.

Presentación

28 Tabletas



ADIUVO®

Vademécum



Candesartán 16 + Hidroclorotiazida 12.5

BIOEQUIVALENTE

Candesartán Cilexetil 16 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg

Indicaciones:

El Candesartán Cilexetil actúa bloqueando la hormona angiotensina II, lo cual causa relajación de los vasos sanguíneos y produce la disminución de la presión sanguínea. La Hidroclorotiazida pertenece a la clase de medicamentos llamados diuréticos. Su efecto es promover la excreción urinaria de sodio, cloruro y agua, lo cual da como resultado la disminución de la presión sanguínea.

RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga y otras.

Presentación

28
Tabletas



Captopril 25

Captopril 25 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la hipertensión, insuficiencia cardíaca crónica, infarto de miocardio.

RA/ Visión borrosa, tos seca, náuseas, vómitos y otras.

Presentación

30
Tabletas



Carvedilol 6.25

Carvedilol 6.25 mg

Indicaciones:

Antihipertensivo, antiaginoso, beta bloqueados no selectivo, alfa bloqueador y antioxidante. Está indicado para la hipertensión arterial, angina de pecho, insuficiencia cardíaca congestiva.

RA/ Mareos, cefalea, fatiga, bradicardia, hipotensión postural y otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas



Carvedilol 12.5

Carvedilol 12.5 mg

Indicaciones:

Antihipertensivo, antiaginoso, beta bloqueados no selectivo, alfa bloqueador y antioxidante. Está indicado para la hipertensión arterial, angina de pecho, insuficiencia cardíaca congestiva.

RA/ Mareos, cefalea, fatiga, bradicardia, hipotensión postural y otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas



Carvedilol 25

Carvedilol 25 mg

Indicaciones:

Antihipertensivo, antiaginoso, beta bloqueados no selectivo, alfa bloqueador y antioxidante. Está indicado para la hipertensión arterial, angina de pecho, insuficiencia cardíaca congestiva.

RA/ Mareos, cefalea, fatiga, bradicardia, hipotensión postural y otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas



ADIUVO®

Vademécum



Cefalexina 500

Cefalexina Anhidra 500 mg

Indicaciones:

Antibiótico de primera generación de cefalosporinas con excelente actividad contra la mayoría de bacterias gram-positivas. Principalmente en el tratamiento de la otitis media y las infecciones de las vías respiratorias (por ejemplo, faringitis, amigdalitis, neumonía lobar) causadas por estafilococos susceptibles, *Streptococcus pneumoniae*, estreptococos del grupo A y beta-hemolíticos.
RA/ Diarrea, trastornos gastrointestinales y otras.

Presentación

30
Cápsulas



Cefixima 100

Cefixima 100mg/5mL

Indicaciones:

Antibiótico utilizado para el tratamiento de las infecciones causadas por microorganismos sensibles: Infecciones de vías respiratorias altas: Faringitis y amigdalitis. Infecciones de vías respiratorias bajas: Bronquitis aguda, episodios de reagudización de bronquitis crónica y neumonías. Infecciones ORL: Otitis media, Infecciones de vías urinarias no complicadas
RA/ Diarrea, heces blandas.

Presentación

100 mL
Polvo para
Suspensión



Cefixima 400

Cefixima 400 mg

Indicaciones:

Antibiótico utilizado para el tratamiento de las infecciones causadas por microorganismos sensibles: Infecciones de vías respiratorias altas: Faringitis y amigdalitis. Infecciones de vías respiratorias bajas: Bronquitis aguda, episodios de reagudización de bronquitis crónica y neumonías. Infecciones ORL: Otitis media, Infecciones de vías urinarias no complicadas
RA/ Diarrea, heces blandas.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Ceftriaxona 1g IM

Ceftriaxona Sódica 1 g

Indicaciones:

Antibiótico utilizado para tratar determinadas infecciones ocasionadas por bacterias, como la gonorrea (ITS), la meningitis y las infecciones de los pulmones, los oídos, la piel, las vías urinarias, la sangre, los huesos, las articulaciones y el abdomen. También se aplica la Ceftriaxona inyectable antes de determinados tipos de cirugía para prevenir las infecciones que pueden presentarse después de la operación.
RA/ Diarrea, Trastornos gastrointestinales, colitis, eosinofilia y otras.

Presentación

1 Vial 1g de ceftriaxona
+ 1 Ampolla de Lidocaina
Polvo para solución inyectable



Celecoxib 200

Celecoxib 200 mg

Indicaciones:

Para el alivio sintomático en el tratamiento de la artrosis, de la artritis reumatoide y de la espondilitis anquilosante.
RA/ Anemia, mareo, cefalea, visión borrosa y otras.

Presentación

30
Cápsulas



ADIUVO®

Vademécum



Cetirizina 10

Cetirizina Diclorhidrato 10 mg

Indicaciones:

Es un medicamento antialérgico, está indicado en adultos y niños a partir de 6 años para: el alivio de los síntomas nasales y oculares de la rinitis alérgica estacional, el alivio de la urticaria, alergia al polen, el polvo y otras sustancias suspendidas en el aire, y las alergias a otras sustancias (como ácaros del polvo, caspa de animales, cucarachas y mohos) entre otros.
RA/ Somnolencia, dolor estómago, diarrea, vómitos entre otros

Presentación

100
Tabletas
Recubiertas



Cilostazol 100

Cilostazol 100 mg

Indicaciones:

Está indicado para reducir los síntomas de la claudicación intermitente (dolor en las piernas que empeora al caminar y mejora al estar en reposo, provocado por el estrechamiento de los vasos sanguíneos que irrigan sangre a las piernas) colaborando así al mejoramiento del flujo de sangre a las piernas.
RA/ Equimosis, edema (periférico, facial), anorexia, cefalea, mareo y otras.

Presentación

28
Comprimidos



Cinarizina 75

Cinarizina 75 mg

Indicaciones:

Está indicado para el control de trastornos vestibulares como vértigo, tinnitus, náusea y vómitos como los observados en el síndrome de Meniere.
RA/ Produce somnolencia en un 20 al 25% de los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento.

Presentación

30
Tabletas



Ciprofloxacina 500

Ciprofloxacina 500 mg

Indicaciones:

La Ciprofloxacina es un agente antimicrobiano de la clase de las Fluoroquinolonas. Es un activo frente a un amplio espectro de germen gram-negativos aerobios, incluyendo patógenos entericos. Es administrada en tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio inferior (bronquitis, neumonías, absceso pulmonar, infecciones de la piel e infecciones de los huesos y de las articulaciones.
RA/ Cefaleas, fatiga, trastornos gastrointestinales, vertigo, temblor y otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

100
Tabletas
Recubiertas



Citicolina 1/10

Citicolina 1g / 10 mL

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de pacientes con lesiones cerebrales graves de naturaleza vascular o traumática, con o sin pérdida de conocimientos para el tratamiento de fallos defenestrativos y lesiones vasculares cerebrales crónicas en la demencia senil. Tratamiento de los cerebrovasculares en fase aguda y sub aguda y cognitivos asociados a traumatismos craneales.
RA/ Muy raras: alucinaciones, cefalea, vertigo y otras

Presentación

10 Sobres
Bebibles



ADIUVO®

Vademécum



Citicolina 500

Citicolina 500 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de pacientes con lesiones cerebrales graves de naturaleza vascular o traumática, con o sin pérdida de conocimiento, para el tratamiento de daños degenerativos y lesiones vasculares cerebrales crónicas en la demencia senil. Tratamiento de los trastornos neurológicos y cognitivos asociados a los accidentes cerebrovasculares en fase aguda y sub aguda y cognitivos asociados a traumatismos craneales.

RA/ Muy raras: alucinaciones, cefalea, vértigo, hipotensión arterial y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Claritromicina 125/5

Claritromicina polvo para suspensión 125mg / 5ml

Indicaciones:

Antibiótico utilizado en infecciones del tracto respiratorio tales como Faringitis, amigdalitis y sinusitis (Adecuadamente diagnosticada) infecciones del tracto respiratorio inferior, tales como bronuitis aguda, exaceración aguda de la bronuitis crónica y de las neumonías bacterianas. Infecciones de la piel y tejidos blandos como foliculitis, celulitis, erisipela.

RA/ Dolor Abdominal, diarreas, náuseas, vómitos.

Presentación

60 mL
Polvo para
suspensión
Oral



Claritromicina 500

Claritromicina 500 mg

Indicaciones:

Antibiótico utilizado en infecciones del tracto respiratorio, tales como faringitis, amigdalitis y sinusitis (adecuadamente diagnosticada) infecciones del tracto respiratorio inferior, tales como bronquitis aguda, exaceración aguda de la bronquitis crónica y de las neumonías bacterianas. Infecciones de la piel y tejidos blandos, como foliculitis, celulitis y erisipela.

RA/ Dolor abdominal, diarreas, náuseas, vómitos.

Presentación

10
Tabletas
Recubiertas



Clindamicina 300

Clindamicina 300 mg

Indicaciones:

Antibiótico utilizado para tratar ciertos tipos de infecciones bacterianas, como infecciones de los pulmones, la piel, la sangre, los órganos reproductores femeninos y los órganos internos. La Clindamicina pertenece a una clase de medicamentos llamados antibióticos tipo Lincomicina. Actúa al retardar o frenar la multiplicación de las bacterias.

RA/ Diarrea, náuseas, trastornos gastrointestinales, mal sabor de boca y otras.

Presentación

50
Cápsulas



Clindamicina 100 + Ketoconazol 400

Clindamicina 100 mg + Ketoconazol 400 mg

Indicaciones:

Tratamiento de la vaginosis bacteriana originada por Gardnerella vaginalis y otras bacterias anaerobias como Bacteroides fragilis, así como así como en vaginitis mixtas y candidiasis vaginal.

RA/ Puede provocar irritación vulvar, resequedad en la mucosa vaginal y prurito

Presentación

7 Cápsulas
de Gelatina
Blanda Vía
vaginal



ADIUVO®

Vademécum



Clopidogrel 75

Clopidogrel 75 mg

Indicaciones:

Está indicado en pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio, un infarto cerebral o que padecen enfermedad arterial periférica establecida. Pacientes adultos que presentan un síndrome coronario agudo y pacientes adultos con fibrilación auricular.

RA/ Hematoma, epistaxis, hemorragia gastrointestinal, diarrea y otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Colágeno 10 Hidrolizado

Colágeno Hidrolizado 10 g

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento, control, prevención y mejora de las siguientes enfermedades, afecciones y síntomas: mejora la salud de la piel, ayuda a aliviar el dolor, prevenir la pérdida ósea, aumenta la masa muscular y promueve la salud del corazón.

RA/ Sensación de pesadez en el estómago, diarrea leve y erupciones.

Presentación

30 Sobres
Polvo para
Suspensión
Oral



Colágeno Hidrolizado Plus

Colágeno Hidrolizado 10 g N-Acetilglucosamina 1000 mg Condroitina Sulfato Sódico 800 mg Extracto de Cúrcuma Longo 400 mg Vitamina C 600 mg polvo para Solución Oral

Indicaciones:

Este producto es un suplemento alimenticio que debe tomarse con el propósito de complementar, con fines saludables, la dieta de las personas a una alimentación balanceada. Ayuda a fortalecer articulaciones, fortalecer cartilago articular (colágeno 100% hidrolizado, condroitina, n-acetil glucosamina), reducir inflamación y rigidez (cúrcuma, n-acetil glucosamina) y favorece la movilidad.

RA/ No reporta

Presentación

30 Sobres
Polvo para
Solución
oral



Colchicina 0.5

Colchicina 0.5 mg

Indicaciones:

La colchicina se usa para prevenir los ataques de gota (dolor repentino e intenso en una o más articulaciones, causado por niveles anormalmente altos de una sustancia llamada ácido úrico en la sangre) en adultos. La colchicina también se usa para aliviar el dolor de los ataques de gota cuando ocurren. La colchicina también se usa para tratar la fiebre mediterránea familiar (FMF; una condición innata que causa episodios de fiebre, dolor e hinchazón del área del estómago, pulmones y articulaciones en adultos y niños mayores de 4 años de edad.

RA/Diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal

Presentación

40
Tabletas



Dapagliflozina 10

Dapagliflozina 10 mg

Indicaciones:

Está indicado en adultos y niños de 10 años de edad o más para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlada en combinación con la dieta y el ejercicio.

RA/ Estreñimiento, sequedad en boca, mareos, dolor de espalda y otras.

Presentación

20
Tabletas
Recubiertas



ADIUVO®

Vademécum



Dapagliflozina 5 + Metformina 1000

Dapagliflozina 5 mg + Metformina Clorhidrato 1000 mg XR

Indicaciones:

La combinación fija de Dapagliflozina y Metformina Clorhidrato de liberación extendida se usa como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
RA/ Diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y otras.

Presentación

20 Tabletas Recubiertas de Liberación Extendida



Dapagliflozina 10 + Metformina 1000

Dapagliflozina 10 mg + Metformina Clorhidrato 1000 mg XR

Indicaciones:

La combinación fija de Dapagliflozina y Metformina Clorhidrato de liberación extendida se usa como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
RA/ Dolor de cabeza, períodos menstruales irregulares o ausentes, cicatrización lenta de las cortadas y golpes, debilidad muscular, dolor de articulaciones.

Presentación

20 Tabletas Recubiertas de Liberación Extendida



Deflazacort 6

Deflazacort 6 mg

Indicaciones:

Tratamiento de las agudizaciones y/o terapia de mantenimiento de la artritis reumatoide y de la artritis psoriásica cuando se han mostrado ineficaces los tratamientos conservadores; polimialgia reumática; fiebre reumática aguda; lupus eritematoso sistémico; dermatomiositis grave; periarteritis nudosa; arteritis craneal y granulomatosis de Wegener.
RA/ Dolor de cabeza, períodos menstruales irregulares o ausentes, cicatrización lenta de las cortadas y golpes, debilidad muscular, dolor de articulaciones.

Presentación

10 Tabletas



Deflazacort 30

Deflazacort 30 mg

Indicaciones:

Tratamiento de las agudizaciones y/o terapia de mantenimiento de la artritis reumatoide y de la artritis psoriásica cuando se han mostrado ineficaces los tratamientos conservadores; polimialgia reumática; fiebre reumática aguda; lupus eritematoso sistémico; dermatomiositis grave; periarteritis nudosa; arteritis craneal y granulomatosis de Wegener.
RA/ Dolor de cabeza, períodos menstruales irregulares o ausentes, cicatrización lenta de las cortadas y golpes, debilidad muscular, dolor de articulaciones.

Presentación

30 Tabletas



DermaGuard After Sun

Indicaciones:

Enriquecido con Aloe Vera, hidrata la piel y ayuda a combatir los efectos de la sequedad por el sol, viento y agua.

Presentación

300 mL de Gel



ADIUVO®

Vademécum



DermaGuard Kids

Indicaciones:

DermaGuard Kids con factor de protección 50+ diseñado para protección de los rayos UVA y UVB, evitar o disminuir las quemaduras debido a la exposición del sol.

Presentación

120 mL
Loción Tópica
Protector Solar



DermaGuard SPF 50+

Indicaciones:

DermaGuard con factor de protección 50+ (FPS50+) diseñado especialmente para brindar la protección necesaria en actividades expuestas a la radiación solar. Otorga protección contra rayos ultravioletas del tipo A y B (UVA/UVB).

Presentación

100 mL
Loción Tópica
Protector Solar



Desloratadina 5

Desloratadina 5 mg

Indicaciones:

Está indicada en adultos y adolescentes a partir de los 12 años de edad para el alivio de los síntomas asociados con: Rinitis alérgica y urticaria. RA/ Alucinaciones, sequedad del ojo, mareo, insomnio y otras.

Presentación

100
Tabletas
Recubiertas



Desvenlafaxina 50

Desvenlafaxina 50 mg

Indicaciones:

Es un antidepresivo de la clase de inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina y se toma por vía oral. RA/Estreñimiento, pérdida de apetito, mareos, somnolencia entre otros

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas de
Liberación
Extendida



Desvenlafaxina 100

Desvenlafaxina 100 mg

Indicaciones:

Es un antidepresivo de la clase de inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina y se toma por vía oral. RA/Estreñimiento, pérdida de apetito, mareos, somnolencia entre otros

Presentación

30
Tabletas de
Liberación
Extendida



ADIUVO®

Vademécum



Dexketoprofeno 25

Dexketoprofeno 25 mg

Indicaciones:

El Dexketoprofeno es un fármaco perteneciente a la familia de los AINES (antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica). Está indicado en el tratamiento sintomático del dolor agudo de diversa etiología.
RA/ Dolor y ardor estomacal, cefalea, mareos, somnolencia y otras.

Presentación

10
Tabletas
Recubiertas



Dexketoprofeno 25 Solución Bebible

Dexketoprofeno 25 mg

Indicaciones:

El Dexketoprofeno es un fármaco perteneciente a la familia de los AINES (antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica). Está indicado en el tratamiento sintomático del dolor agudo de diversa etiología.
RA/ Dolor y ardor estomacal, cefalea, mareos, somnolencia y otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

10 Sobres
Solución
Oral



Dexketoprofeno Inyectable 50 MG/2 mL

Dexketoprofeno Trometamol 36.9 mg

Indicaciones:

El Dexketoprofeno es un fármaco perteneciente a la familia de los AINES (antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica). Está indicado en el tratamiento sintomático del dolor agudo de diversa etiología.
RA/ Dolor y ardor estomacal, cefalea, mareos, somnolencia y otras.

Presentación

10
Ampollas
IM / IV / Infusión IV



Dexlansoprazol 30

Dexlansoprazol 30 mg

Indicaciones:

Para mantener la cicatrización de la esofagitis hasta por 4 meses en adolescentes de 12 a 17 años y hasta 6 meses en adultos.
RA/ Sordera, visión borrosa, erupción generalizada y otras.

Presentación

30
Cápsulas
de Liberación
Retardada



Dexlansoprazol 60

Dexlansoprazol 60 mg

Indicaciones:

Para el tratamiento de la acidez estomacal asociada con la ERGE no erosiva sintomática, la curación de todos los grados de EE y el mantenimiento de la EE curada en adolescentes de 12 a 17 años de edad.
RA/ Sordera, visión borrosa, erupción generalizada y otras.

Presentación

30
Cápsulas
de Liberación
Retardada



ADIUVO®

Vademécum



Diclofenaco Potásico 50

Diclofenaco Potásico 50 mg

Indicaciones:

Para tratamiento a corto plazo de las siguientes afecciones: Dolor, inflamación e hinchazón postraumáticos, crisis de migraña, Reumatismo no articular, como tratamiento complementario en infecciones otorrinolaringológicas inflamatorias dolorosas agudas. RA/ Cefalea, mareo, vértigo, somnolencia y otras.

Presentación

100
Cápsulas de
Gelatina Blanda



Diclofenaco Potásico 100 SR

Diclofenaco Potásico 100 mg

Indicaciones:

El Diclofenaco Potásico es un medicamento inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa y miembro de la familia de antiinflamatorios no esteroides (AINE). Es un miorelajante e indicado para reducir inflamaciones y como analgésico, pues reduce dolores causados por heridas menores y dolores tan intensos como la artritis. RA/ Trastornos gastrointestinales, cefaleas, mareos, vértigo y otras.

Presentación

100
Cápsulas con
Pellets de
Liberación
Sostenida



Diclofenaco Sódico 50

Diclofenaco Sódico 50 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de enfermedades reumáticas crónicas inflamatorias tales como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artrosis, reumatismo extra articular, ataque agudo de gota, dismenorrea primaria, inflamaciones y tumefacciones postraumático. RA/ Cefalea, mareo, somnolencia, vértigo, insomnio y otras.

Presentación

100
Tabletas con
Recubierta
Entérica



Diclofenaco 9/5

Diclofenaco Sódico 9 mg / 5 ml

Indicaciones:

Tratamiento a corto plazo de las siguientes afecciones agudas: dolores agudos e intensos por osteoartritis y artritis reumatoide, dismenorrea primaria, crisis migrañosas, inflamaciones y tumefacciones postraumáticas y como tratamiento sintomático del ataque agudo de gota. RA/ Mareo, vértigo, náuseas, vómitos, diarreas

Presentación

120 mL
Suspensión
Oral



Dicloxacilina 125/5

Dicloxacilina 125mg/5 mL

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio, piel, tejidos blandos y huesos, tracto urinario, otitis, meningitis y septicemias. RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, estomatitis y otras.

Presentación

60 mL
Polvo para
Suspensión



ADIUVO®

Vademécum



Dicloxacilina 500

Dicloxacilina 500 mg

Indicaciones:

Antibiótico betalactámico bactericida indicado contra la mayoría de *Streptococcus* y *Staphylococcus*. Infecciones de vías respiratorias altas (amigdalitis, faringitis). Infecciones de vías respiratorias bajas (bronquitis, neumonías de focos múltiples, bronconeumonía). Infecciones de piel y tejidos blandos (furunculosis, celulitis, impétigo, impétigo ampolloso, piodermitis). Heridas infectadas por *Staphylococcus*. Artritis séptica, osteomielitis.
RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, estomatitis y otras.

Presentación

100
Cápsulas



Difenhidramina 12.5/5

Difenhidramina Clorhidrato 12.5 mg/ 5 ml

Indicaciones:

Está indicado como antitusivo no narcótico para controlar la tos debido a enfriamiento o alergia.
RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, sequedad de boca y otras.

Presentación

120 mL
Jarabe



Difenhidramina 50

Difenhidramina Clorhidrato 50 mg

Indicaciones:

Comparte las acciones y usos de otros antihistamínicos., también se usa como antitusígeno para el alivio temporal de la tos causada por una irritación y de la garganta y los bronquios, como la que puede ocurrir con los resfriados comunes o los irritantes inhalados.
RA/ Sequedad de boca, nariz y garganta, vértigo, visión borrosa, temblores y otras.

Presentación

100
Tabletas
Recubiertas



Diflah 500

Diosmina 450 mg + Hesperidina 50 mg

Indicaciones:

Está indicado para el alivio a corto plazo del edema y sistemas relacionados con la insuficiencia venosa crónica
RA/ Trastornos digestivos Y neurovegetativos.

Presentación

30
Comprimidos
Recubiertos



Diflah 1000

Diosmina 900 mg + Hesperidina 100

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de los signos funcionales relacionados con la crisis hemorroidal.
RA/ Mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



ADIUVO®

Vademécum



Dobesilato Cálcico 500

Dobesilato Cálcico Monohidrato 500 mg

Indicaciones:

Actúa en las paredes capilares regulando las funciones fisiológicas deterioradas como permeabilidad creciente y resistente disminuida. Aumenta la flexibilidad del eritrocito, inhibe la hiperagregación de la plaqueta y, en la retinopatía diabética, reduce la hiperviscosidad de la sangre, mejorando así las características geológicas de la sangre y la irrigación del tejido fino.
RA/ Trastornos gastrointestinales, erupciones cutáneas y otras.

Presentación

100
Cápsulas



Dolo-NervioVital Inyectable

Diclofenaco Sódico + Vitamina B1 + B6 + B12

Indicaciones:

Combina las propiedades analgésicas y antiinflamatorias del Diclofenaco, con la capacidad neurotrópica que posee la Tiamina (Vit. B1) y la Piridoxina (Vit. B6) a las cuales se agrega la actividad analgésica de la Cianocobalamina (Vit. B12). Por tal razón, está indicado en estados dolorosos y doloroso-inflamatorios de diversas causas.
RA/ Mareos, dolor de cabeza, náuseas, diarrea y otras.

Presentación

kit contiene
1 ampolla de
1 ml Complejo B
+ 1 ampolla de
2 ml Diclofenaco
Sódico + jeringa



Dolo-NervioVital N

Tiamina (Vitamina B1) 50 mg, Piridoxina (Vitamina B6) 50 mg,
Cianocobalamina (Vitamina B12) 1000 mcg, Diclofenaco Sódico 50 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de enfermedades reumáticas crónicas inflamatorias tales como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artrosis. Reumatismo extraarticular. Tratamiento sintomático del ataque agudo de gota. Tratamiento sintomático de la dismenorrea primaria. Tratamiento de inflamaciones y tumefacciones postraum. Antiinflamatorio con acción analgésica y antineurítico.
RA/ Prurito, urticaria, erupción cutánea.

Presentación

100
Tabletas
Recubiertas



Dolo-NervioVital XR

Tiamina Monohidrato (Vitamina B1) 100 mg, Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6) 100 mg,
Cianocobalamina (Vitamina B12) 1000 mcg, Diclofenaco Sódico 100 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de enfermedades reumáticas crónicas inflamatorias tales como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artrosis. Reumatismo extraarticular. Tratamiento sintomático del ataque agudo de gota. Tratamiento sintomático de la dismenorrea primaria. Tratamiento de inflamaciones y tumefacciones postraum. Antiinflamatorio con acción analgésica y antineurítico.
RA/ Prurito, urticaria, erupción cutánea.

Presentación

100 Tabletas
Recubiertas de
Liberación
Prolongada



Doxiciclina 100

Doxiciclina 100 mg

Indicaciones:

La Doxiciclina es un antibiótico del grupo de las tetraciclinas que previene el crecimiento y propagación de las bacterias gram positivas (+) y gram negativas (-). Se usa en el tratamiento de neumonía y otras infecciones como la enfermedad de Lyme, el acné, la rosácea, la enfermedad periodontal y la malaria.
RA/ Hinchazón de los labios, Urticaria, diarrea y otros

Presentación

100
Cápsulas



ADIUVO®

Vademécum



Duloxetina 60

Duloxetina 60 mg

Indicaciones:

La Duloxetina se utiliza para tratar la depresión en adultos el trastorno de ansiedad generalizada Y el dolor neuropático diabético (a menudo descrito como quemazón, dolor punzante, como pinchazos, escozor, o como un calambre eléctrico. Puede haber una pérdida de sensibilidad en el área afectada, o puede ocurrir que al tocar la zona o ponerla en contacto con calor, frío o presión se produzca dolor). RA/ Náuseas , cefalea, resequedad en la boca, somnolencia , mareos y otras

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30 Cápsulas de Liberación Retardada



Empagliflozina 10

Empagliflozina 10 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de adulto con diabetes mellitus tipo 2 no suficientemente controlada asociado a dieta y ejercicio. RA/ Sed, estreñimiento, prurito, urticaria angioderma y otras.

Presentación

20 Tabletas Recubiertas



Empagliflozina 25

Empagliflozina 25 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de adulto con diabetes mellitus tipo 2 no suficientemente controlada asociado a dieta y ejercicio. RA/ Sed, estreñimiento, prurito, urticaria angioderma y otras.

Presentación

20 Tabletas Recubiertas



Enalapril 20

Enalapril 20 mg

Indicaciones:

El Enalapril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), utilizado en el tratamiento de la hipertensión y algunos tipos de insuficiencia cardíaca crónica. RA/ Alergias cutáneas, hipotensión ortostática, cefalea, tos y otras.

Presentación

100 Tabletas



Enqiovit

Multi Vitaminas y Multiminerales + Q10

Indicaciones:

Contiene vitaminas y minerales, ginseng, coenzima Q10, maca y ácidos grasos omega 3. Aporta las cantidades adecuadas de nutrientes esenciales en caso de no consumirlos en la dieta diaria. RA/ Diarrea, urticaria, fatiga, piel enrojecida y otras

Presentación

30 Cápsulas



ADIUVO®

Vademécum

BIOEQUIVALENTE



Escitalopram 10

Escitalopram 10 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la depresión (episodios depresivos mayores), trastornos de ansiedad (tales como trastorno de angustia, trastornos de ansiedad social, trastornos de ansiedad generalizada).

RA/ Náuseas, somnolencia, xerostomía, temblor, insomnio y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas

BIOEQUIVALENTE



Escitalopram 20

Escitalopram 20 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la depresión (episodios depresivos mayores), trastornos de ansiedad (tales como trastorno de angustia, trastornos de ansiedad social, trastornos de ansiedad generalizada).

RA/ Náuseas, somnolencia, xerostomía, temblor, insomnio y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Esomeprazol 20

Esomeprazol 20 mg

Indicaciones:

Está indicado para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, una afección en la que el reflujo retrógrado del contenido gástrico provoca acidez estomacal y posibles lesiones del esófago, también se usa para disminuir a probabilidad de que las personas que están tomando medicamentos antiinflamatorios no esteroides, desarrollen úlceras.

RA/ Diarreas, estreñimiento, náuseas, cefaleas y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Esomeprazol 40

Esomeprazol 40 mg

Indicaciones:

Está indicado para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, una afección en la que el reflujo retrógrado del contenido gástrico provoca acidez estomacal y posibles lesiones del esófago, también se usa para disminuir a probabilidad de que las personas que están tomando medicamentos antiinflamatorios no esteroides, desarrollen úlceras.

RA/ Diarreas, estreñimiento, náuseas, cefaleas y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Espironolactona 25

Espironolactona 25 mg

Indicaciones:

Hipertensión arterial esencial, tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica clases III y IV de la NYHA, asociado a su tratamiento convencional e hiperaldosteronismo primario.

RA/ Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (quistes y pólipos), trastornos de la sangre y del sistema linfático, trastornos del sistema nervioso.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



ADIUVO®

Vademécum



Espironolactona 100

Espironolactona 100 mg

Indicaciones:

Hipertensión arterial esencial, tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica clases III y IV de la NYHA, asociado a su tratamiento convencional e hiperaldosteronismo primario. RA/ Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (quistes y pólipos), trastornos de la sangre y del sistema linfático, trastornos del sistema nervioso.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Etoricoxib 120

Etoricoxib 120 mg

Indicaciones:

Ayuda a reducir el dolor y la hinchazón (inflamación) en las articulaciones y músculos de personas de 16 años de edad y mayores con artrosis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y gota. El etoricoxib es un fármaco de la clase de antiinflamatorios no esteroideos conocidos como inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, que actúan disminuyendo el dolor crónico, agudo y la inflamación. RA/ Dolor de estómago, dolor de cabeza, estreñimiento o diarrea y otros

Presentación

100
Tabletas
Recubiertas



Fenofibrato 160

Fenofibrato 160 mg

Indicaciones:

Está indicado para: Tratamiento de la hipertrigliceridemia grave con o sin niveles bajos de colesterol HDL, hiperlipidemia mixta cuando las estatinas están contraindicadas o no se toleran e hiperlipidemia mixta en pacientes con alto riesgo cardiovascular junto a una estatina cuando los triglicéridos y el colesterol HDL no están adecuadamente controlados. RA/ Disminución de hemoglobina, disminución del recuento de leucocitos, cefalea, eritema multiforme.

Presentación

10
Cápsulas



Fexofenadina 180

Fexofenadina Clorhidrato 180 mg

Indicaciones:

Se usa para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica estacional (fiebre del heno), incluyendo secreción nasal; estornudos; enrojecimiento, picazón u ojos acuosos; o picazón de la nariz, la garganta, o el paladar en adultos y niños de 2 años de edad y mayores. RA/ Dolor de cabeza, náuseas, mareos, somnolencia y otras

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Furosemida 40

Furosemida 40 mg

Indicaciones:

Edema asociado a insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática (ascitis), y enfermedad renal, incluyendo síndrome nefrótico (tiene prioridad el tratamiento de la enfermedad básica), hipertensión arterial leve y moderada. RA/ Micción frecuente, visión borrosa, dolor de cabeza, estreñimiento y diarrea

Presentación

100
Tabletas



ADIUVO®

Vademécum



Fluconazol 150

Fluconazol 150 mg

Indicaciones:

Está indicado para tratar las infecciones por hongos, incluidas la infecciones por levaduras de la vagina, la boca, la garganta, el esófago, el abdomen, los pulmones, la sangre y otros órganos. También se usa para tratar la meningitis provocada por hongos, prevenir las infecciones por levaduras en pacientes tratados con quimioterapia o radioterapia antes de un trasplante de médula ósea.
RA/ Cefaleas, náuseas, vómito, dolor abdominal y otras.

Presentación

20
Cápsulas



Flunarizina 10

Flunarizina 10 mg

Indicaciones:

Está indicado en la profilaxis de la migraña, para el vértigo y los trastornos vestibulares, y en trastornos vasculares cerebrales y periféricos. Se utiliza también como adyuvante en la terapia antiepiléptica en pacientes que no responden a los tratamientos estándar.
RA/ Síntomas del trastorno del sueño, boca seca, letargo, desorientación y otras.

Presentación

30
Tabletas



Fluoxetina 20

Fluoxetina 20 mg

Indicaciones:

Está indicado para trastornos cognitivos incluidos la demencia degenerativa primaria, demencia vascular y forma intermedias de ambas, que cursan con déficit de memoria, trastornos en la concentración y humor depresivo.
RA/ Mareos, sensación de hormigueo, trastornos del sueño, náuseas y otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Cápsulas



Fluticasona furoato 27.5

Fluticasona furoato 27.5mcg / Dosis

Indicaciones:

Se usa como tratamiento para aliviar los síntomas de la rinitis, como estornudos y secreción, congestión o picazón en la nariz y picazón y ojos llorosos, provocado por la fiebre del heno u otras alergias (ocasionadas por una alergia al polen, al moho, y al polvo.
RA/ Dolor de cabeza, secreción nasal entre otras

Presentación

120 Dosis
Suspensión
en Spray Nasal



Gabapentina 300

Gabapentina 300 mg

Indicaciones:

Está indicada para el tratamiento del dolor neurótico, generalmente definido como dolor debido al daño nervioso, (dolor persistente en un sitio afectado anteriormente por herpes zoster) y complicaciones dolorosas de la diabetes, dolor por lesiones nerviosas, dolor de miembro fantasma, fibromialgia y neuralgia del trigémino.
RA/ Mareos, somnolencia y edema periférico.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Cápsulas



ADIUVO®

Vademécum



Gentamicina 160/2

Gentamicina 160 mg / 2 ml

Indicaciones:

Es un antibiótico aminoglucósido que se emplea habitualmente con otros antibacterianos para el tratamiento de las infecciones sistémicas graves producidas por gramnegativos sensibles y otros microorganismos. RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, disminución del apetito, y dolor de cabeza.

Presentación

10 Ampollas
Solución
inyectable IM



Genzinity

Etinilestradiol 0.035 mg + Ciproterona Acetato 2 mg

Indicaciones:

Tratamiento del acné andrógeno-dependiente moderado a severo (con o sin seborrea) y/o hirsutismo, en mujeres en edad productiva. RA/ Cambios en el apetito, cambios de humor, rash, náuseas y otras.

Presentación

21
Tabletas
Recubiertas



Ginkgo Biloba

Ginkgo Biloba 80 mg

Indicaciones:

Está indicado en adultos para episodios depresivos mayores, trastorno obsesivo-compulsivo, bulimia nerviosa. En niños mayores de 8 años episodios depresivos moderados a graves. RA/ Muy rara vez molestias gastrointestinales y cefaleas. Pueden tener lugar reacciones alérgicas, que algunos autores han atribuido a la presencia de ácido Ginkgólico.

Presentación

30
Cápsulas



Glibenclamida 5

Glibenclamida 5 mg

Indicaciones:

Está indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus no insulino dependiente (tipo 2) en el adulto cuando las medidas dietéticas, el ejercicio físico y la pérdida de peso no son suficientes por sí solos para lograr un control adecuado de la glucemia. RA/ Cefalea, hambre intensa, náuseas, vómitos, somnolencia y otras.

Presentación

100
Comprimidos
Recubiertos



Gliclazida 60 MR

Gliclazida 60 mg

Indicaciones:

Está indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo 2) en el adulto cuando las medidas dietéticas, el ejercicio físico y la pérdida de peso no son suficientes por sí solos para controlar la glucemia. RA/ Cefalea, hambre intensa, náuseas, vómitos, astenia y otras.

Presentación

30
Tabletas de
Liberación
Modificada



ADIUVO®

Vademécum



Glimepirida 4

Glimepirida 4 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II, cuando la dieta, el ejercicio físico y la reducción de peso por sí solos no son adecuados.

RA/ Trombocitopenia, leucopenia, granulocitopenia, agranulocitosis, eritropenia y otras.

Presentación

30
Tabletas



Glucosamina Sulfato + Condroitina Sulfato Sódico

Glucosamina Sulfato 1500 mg + Condroitina Sulfato Sódico 1200 mg

Indicaciones:

Está indicado en enfermedades osteo-articular degenerativa, osteoartritis primarias y secundarias: Artrosis cervical coxofemoral, artrosis de la rodilla, lumbar dorsal y sacral, escapilohumoral, distrofias osteo-articulares.

RA/ Trastornos gastrointestinales.

Presentación

30 Sobres
Polvo Granulado
para Suspensión



Hedera Helix 0.7/100

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento sintomático del catarro agudo (inflamación) del tracto respiratorio acompañado de tos; tratamiento de los síntomas de enfermedades bronquiales inflamatorias crónicas.

RA/ Náuseas, vómitos, diarrea entre otras

Presentación

100 mL
Jarabe



Hidroclorotiazida 25

Hidroclorotiazida 25 mg

Indicaciones:

Para tratamiento de: Edema de origen cardíaco o renal, edema de origen hepático e hipertensión arterial en adultos.

RA/ Cefalea, mareo, trastornos del sueño, estreñimiento y otras.

Presentación

100
Tabletas



Hidroxicloroquina 400

Hidroxicloroquina Sulfato 400 mg

Indicaciones:

Está indicada en adultos para la prevención y el tratamiento de la malaria no complicada, el tratamiento sintomático de la artritis reumatoide y el tratamiento de lupus eritematoso discoide y del lupus eritematoso sistémico.

RA/ Vértigo, urticaria, cefalea, mareos y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Hioscina 10

Hioscina Butilbromuro 10 mg

Indicaciones:

Es un antiespasmódico abdominal derivado de la escopolamina que se utiliza para tratar el dolor y las molestias causadas por cólicos abdominales u otras actividades espasmódicas del aparato digestivo.
RA/ Taquicardia, mareos, sequedad en la boca y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Ibuprofeno 400

Ibuprofeno 400 mg

Indicaciones:

Es un antiinflamatorio no esteroide (AINE) el cual es empleado para el tratamiento de artritis reumatoide, espondilitis anquilopoyetica y otros procesos reumáticos agudos y crónicos, procesos dolorosos de intensidad leve y moderada como el dolor dental, cefaleas y sintomático de la fiebre en cuadros febriles de etiología diversa.

RA/ Anemia, náuseas, dispepsia, xerostomía, dolor epigástrico y otras.

Presentación

100
Tabletas
Recubiertas



Ibuprofeno 600

Ibuprofeno 600 mg

Indicaciones:

Es un antiinflamatorio no esteroide (AINE) el cual es empleado para el tratamiento de artritis reumatoide, espondilitis anquilopoyetica y otros procesos reumáticos agudos y crónicos, procesos dolorosos de intensidad leve y moderada como el dolor dental, cefaleas y sintomático de la fiebre en cuadros febriles de etiología diversa.

RA/ Anemia, náuseas, dispepsia, xerostomía, dolor epigástrico y otras.

Presentación

100
Tabletas
Recubiertas



Indapamida SR 1.5

Indapamida 1.5 mg

Indicaciones:

Está indicado en hipertensión esencial en adultos.

RA/ Hipersensibilidad al principio activo, a otras sulfamidas, o a alguno de los excipientes, insuficiencia renal grave, encefalopatía hepática o alteración grave de la función hepática e hipopotasemia.

Presentación

30
Tabletas Recubiertas
de Liberación
Prolongada



Intidiva

Indicaciones:

Ayuda a restaurar los niveles normales del pH y proporciona protección natural contra la sensibilidad, picazón, irritación, flujos y olores no deseados.

Presentación

200 mL
Jabón Intimo



ADIUVO®

Vademécum



Irbesartán 150

Irbesartán 150 mg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) y tratamiento de la nefropatía en pacientes adultos con diabetes tipo 2 e hipertensión como parte de su tratamiento antihipertensivo.

RA/ Mareo, vértigo, cefalea, taquicardia.

Presentación

28
Tabletas
Recubiertas



Irbesartán 150 + Hidroclorotiazida 12.5

Irbesartán 150 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Está indicado para tratar la presión arterial alta, enfermedad del riñón provocada por la diabetes en pacientes con diabetes tipo 2 y presión arterial alta. Esta combinación se recomienda cuando hay ciertos pacientes que no responden a una monoterapia de solo Irbesartán, sino que es necesario, una combinación con un diurético, en este caso Hidroclorotiazida, para poder controlar su volumen sanguíneo y bajar su presión arterial.

RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga y otras.

Presentación

28
Tabletas
Recubiertas



Irbesartán 300

Irbesartán 300 mg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) y tratamiento de la nefropatía en pacientes adultos con diabetes tipo 2 e hipertensión como parte de su tratamiento antihipertensivo.

RA/ Mareo, vértigo, cefalea, taquicardia.

Presentación

28
Tabletas
Recubiertas



Irbesartán 300 + Amlodipina 5

Irbesartán 300 mg + Amlodipina 5 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial).

RA/ Mareos, hipercalcemia, diarrea, dolor abdominal o acidez estomacal y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Irbesartán 300 + Hidroclorotiazida 12.5

Irbesartán 300 mg + Hidroclorotiazida 12.5mg

BIOEQUIVALENTE

Indicaciones:

Está indicado para tratar la presión arterial alta, enfermedad del riñón provocada por la diabetes en pacientes con diabetes tipo 2 y presión arterial alta. Esta combinación se recomienda cuando hay ciertos pacientes que no responden a una monoterapia de solo Irbesartán, sino que es necesario, una combinación con un diurético, en este caso Hidroclorotiazida, para poder controlar su volumen sanguíneo y bajar su presión arterial.

RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga y otras.

Presentación

28
Tabletas
Recubiertas



ADIUVO®

Vademécum



Irbesartán 300 + Hidroclorotiazida 25

Irbesartán 300 mg + Hidroclorotiazida 25 mg

Indicaciones:

Está indicado para tratar la presión arterial alta, enfermedad del riñón provocada por la diabetes en pacientes con diabetes tipo 2 y presión arterial alta. Esta combinación se recomienda cuando hay ciertos pacientes que no responden a una monoterapia de solo Irbesartán, sino que es necesario, una combinación con un diurético, en este caso Hidroclorotiazida, para poder controlar su volumen sanguíneo y bajar su presión arterial. RA/ Edema, taquicardia, mareo, cefalea, fatiga y otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

28
Tabletas
Recubiertas



Isotretinoína 10

Isotretinoína 10mg

Indicaciones:

La Isotretinoína, es un fármaco usado mayoritariamente para el acné severo o quístico, pero también se emplea para una serie de cánceres y algunas condiciones severas de la piel. RA/ Descamación de la piel en las palmas de las manos y plantas de los pies, sequedad de la piel, ojos, boca o nariz, hemorragia (sangrado) nasal entre otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Cápsulas
de Gelatina
Blanda



Isotretinoína 20

Isotretinoína 20mg

Indicaciones:

La Isotretinoína, es un fármaco usado mayoritariamente para el acné severo o quístico, pero también se emplea para una serie de cánceres y algunas condiciones severas de la piel. RA/ Descamación de la piel en las palmas de las manos y plantas de los pies, sequedad de la piel, ojos, boca o nariz, hemorragia (sangrado) nasal entre otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Cápsulas
de Gelatina
Blanda



Itraconazol 100

Itraconazol 100 mg

Indicaciones:

Está indicado para tratar infecciones micóticas de los pulmones que se pueden propagar a todo el cuerpo, también para tratar infecciones micóticas de las uñas de los pies. RA/Alérgicas graves, insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar, pancreatitis, hepatotoxicidad.

Presentación

12
Cápsulas



Ketorolaco 20

Ketorolaco Trometamina 20 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento a corto plazo (\leq 5 días) del dolor moderado a severo, generalmente postoperatorio. RA/ Úlceras GI, sangrado, perforación, sangrado postoperatorio, insuficiencia renal aguda y otras.

Presentación

30
Tabletas



ADIUVO®

Vademécum



Lamotrigina 100

Lamotrigina 100 mg

Indicaciones:

Es usado como medicamento, especialmente para la epilepsia y el trastorno bipolar. Pertenecer a grupos de fármacos que potencian la inhibición mediada por los canales de sodio, como lo son la fenitoína, carbamazepina y el ácido valproico.
RA/Sarpullido, malestar estomacal entre otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas



Lansoprazol 30

Lansoprazol 30 mg

Indicaciones:

Pertenece a una clase de compuestos antisecretores, ha sido caracterizado como un inhibidor de la bomba de ácido gástrico, ya que bloquea el paso final de la producción de ácido. Es indicado para el tratamiento de úlceras duodenal y gástrica, tratamiento de esofagitis por reflujo y profilaxis de esofagitis por reflujo.
RA/ Diarrea, estreñimiento, náuseas, cefaleas, aumento de apetito.

Presentación

100
Cápsulas de
Liberación
Retardada



Levofloxacin 500

Levofloxacin 500 mg

Indicaciones:

Es un antibiótico del grupo de las quinolonas es efectivo en contra de un buen número de bacterias Gram positivas y Gram negativas, por lo que se considera un antibiótico de amplio espectro. Por esta razón, se acostumbra administrar la Levofloxacin de manera empírica en infecciones como la neumonía bacteriana, adquirida en la comunidad o infecciones urinarias antes de que se conozca el organismo causal específico.
RA/ Mareos, cefalea, náuseas, temblor, vaginitis y otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Comprimidos
Recubiertos



Levofloxacin 750

Levofloxacin 750 mg

Indicaciones:

Es un antibiótico del grupo de las quinolonas es efectivo en contra de un buen número de bacterias Gram positivas y Gram negativas, por lo que se considera un antibiótico de amplio espectro. Por esta razón, se acostumbra administrar la Levofloxacin de manera empírica en infecciones como la neumonía bacteriana, adquirida en la comunidad o infecciones urinarias antes de que se conozca el organismo causal específico.
RA/ Mareos, cefalea, náuseas, temblor, vaginitis y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Levosulpirida 25

Levosulpirida 25 mg

Indicaciones:

Tratamiento a corto plazo del síndrome dispéptico (anorexia, distensión abdominal, sensación de sensibilidad epigástrica, cefalea postprandial, acidez estomacal, eructación, diarrea, estreñimiento) por retraso del vaciado gástrico relacionado con factores orgánicos (gastroparesia diabética, cáncer, etc.).
RA/Agitación, Somnolencia, trastornos de alimentación entre otras.

Presentación

30
Tabletas



ADIUVO®

Vademécum



Levotiroxina 25

Levotiroxina Sódica 25 mcg

Indicaciones:

Tratamiento del bocio eutiroides benigno, prevención de la recidiva tras cirugía del bocio eutiroides, dependiendo del estado hormonal postquirúrgico, terapia sustitutiva en casos de hipotiroidismos, terapia de supresión en el carcinoma tiroideo. RA/ Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, insuficiencia adrenal, insuficiencia hipofisaria y tirotoxicosis no tratadas, tratamiento con Levotiroxina no debe iniciarse en caso de infarto agudo de miocardio, miocarditis aguda y pancarditis aguda.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

100
Tabletas



Levotiroxina 50

Levotiroxina Sódica 50 mcg

Indicaciones:

Tratamiento del bocio eutiroides benigno, prevención de la recidiva tras cirugía del bocio eutiroides, dependiendo del estado hormonal postquirúrgico, terapia sustitutiva en casos de hipotiroidismos, terapia de supresión en el carcinoma tiroideo. RA/ Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, insuficiencia adrenal, insuficiencia hipofisaria y tirotoxicosis no tratadas, tratamiento con Levotiroxina no debe iniciarse en caso de infarto agudo de miocardio, miocarditis aguda y pancarditis aguda.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

100
Tabletas



Levotiroxina 75

Levotiroxina Sódica 75 mcg

Indicaciones:

Tratamiento del bocio eutiroides benigno, prevención de la recidiva tras cirugía del bocio eutiroides, dependiendo del estado hormonal postquirúrgico, terapia sustitutiva en casos de hipotiroidismos, terapia de supresión en el carcinoma tiroideo. RA/ Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, insuficiencia adrenal, insuficiencia hipofisaria y tirotoxicosis no tratadas, tratamiento con Levotiroxina no debe iniciarse en caso de infarto agudo de miocardio, miocarditis aguda y pancarditis aguda.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

100
Tabletas



Levotiroxina 100

Levotiroxina Sódica 100 mcg

Indicaciones:

Tratamiento del bocio eutiroides benigno, prevención de la recidiva tras cirugía del bocio eutiroides, dependiendo del estado hormonal postquirúrgico, terapia sustitutiva en casos de hipotiroidismos, terapia de supresión en el carcinoma tiroideo. RA/ Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, insuficiencia adrenal, insuficiencia hipofisaria y tirotoxicosis no tratadas, tratamiento con Levotiroxina no debe iniciarse en caso de infarto agudo de miocardio, miocarditis aguda y pancarditis aguda.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

100
Tabletas



Levotiroxina 125

Levotiroxina Sódica 125 mcg

Indicaciones:

Tratamiento del bocio eutiroides benigno, prevención de la recidiva tras cirugía del bocio eutiroides, dependiendo del estado hormonal postquirúrgico, terapia sustitutiva en casos de hipotiroidismos, terapia de supresión en el carcinoma tiroideo. RA/ Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, insuficiencia adrenal, insuficiencia hipofisaria y tirotoxicosis no tratadas, tratamiento con Levotiroxina no debe iniciarse en caso de infarto agudo de miocardio, miocarditis aguda y pancarditis aguda.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

100
Tabletas



ADIUVO®

Vademécum



Levotiroxina 150

Levotiroxina Sódica 150 mcg

Indicaciones:

Tratamiento del bocio eutiroideo benigno, prevención de la recidiva tras cirugía del bocio eutiroideo, dependiendo del estado hormonal postquirúrgico, terapia sustitutiva en casos de hipotiroidismos, terapia de supresión en el carcinoma tiroideo. RA/ Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, insuficiencia adrenal, insuficiencia hipofisaria y tirotoxicosis no tratadas, tratamiento con Levotiroxina no debe iniciarse en caso de infarto agudo de miocardio, miocarditis aguda y pancarditis aguda.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

100
Tabletas



Linagliptina 5

Linagliptina 5 mg

Indicaciones:

Está indicado en adultos con diabetes mellitus tipo 2 como tratamiento asociado a dieta y ejercicio para mejorar el control glucémico como: Monoterapia cuando la Metformina no es adecuada debido a intolerancia o está contraindicada debido a insuficiencia renal, tratamiento en combinación. RA/ Hipoglucemia, urticaria, tos y estreñimiento.

Presentación

20
Tabletas
Recubiertas



Linagliptina 2.5 + Metformina 500

Linagliptina 2.5 mg + Metformina Clorhidrato 500 mg

Indicaciones:

Está indicada como un complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2. RA/ Acidosis láctica, insuficiencia cardíaca, pancreatitis.

Presentación

20
Tabletas
Recubiertas



Linagliptina 2.5 + Metformina 850

Linagliptina 2.5 mg + Metformina Clorhidrato 850 mg

Indicaciones:

Está indicada como un complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2. RA/ Acidosis láctica, insuficiencia cardíaca, pancreatitis.

Presentación

20
Tabletas
Recubiertas



Loratadina 10

Loratadina 10 mg

Indicaciones:

Está indicada para aliviar los síntomas de urticaria crónica y otras afecciones alérgicas dermatológicas. También funciona para el tratamiento y control de los síntomas de la rinitis alérgica, como estornudos, rinorrea y prurito. A su vez ayuda al alivio de la conjuntivitis alérgica y sus síntomas tales como lagrimeo y escozor de ojos. RA/ Fatiga, sedación, cefalea, alopecia, nerviosismo y otras.

Presentación

30 y 100
Tabletas



ADIUVO®

Vademécum



Loratadina Jarabe

Loratadina 5mg/5mL

Indicaciones:

Está indicada para pacientes pediátricos, geriátricos o pacientes que presentan problemas al deglutir. Está indicada para aliviar los síntomas de urticaria crónica y otras afecciones alérgicas dermatológicas. También funciona para el tratamiento y control de los síntomas de la rinitis alérgica, como estornudos, rinorrea y prurito. A su vez ayuda al alivio de la conjuntivitis alérgica y sus síntomas tales como lagrimeo y escozor de ojos.
RA/ Fatiga, sedación, cefalea, alopecia, nerviosismo y otras.

Presentación

60 mL
Jarabe



Losartán 50

Losartán Potásico 50 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en adultos, niños y adolescentes de 6 a 18 años de edad, tratamiento de la enfermedad renal en pacientes adultos con hipertensión y diabetes tipo 2 con proteinuria > 0,5 g/día como parte del tratamiento antihipertensivo y tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica en pacientes adultos cuando el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA).
RA/ Mareo, anemia, somnolencia, cefalea y migraña.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Losartán 50 + Hidroclorotiazida 12.5

Losartán Potásico 50 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en pacientes cuya presión arterial no está controlada adecuadamente con Losartán o Hidroclorotiazida solos.
RA/ Angiodema, trastornos del gusto, purpura de Henoch-Scholenin, insuficiencia renal.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Losartán 100

Losartán Potásico 100 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en adultos, niños y adolescentes de 6 a 18 años de edad, tratamiento de la enfermedad renal en pacientes adultos con hipertensión y diabetes tipo 2 con proteinuria > 0,5 g/día como parte del tratamiento antihipertensivo y tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica en pacientes adultos cuando el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA).
RA/ Mareo, anemia, somnolencia, cefalea y migraña.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Losartán 100 + Hidroclorotiazida 25

Losartán Potásico 100 mg + Hidroclorotiazida 25 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en pacientes cuya presión arterial no está controlada adecuadamente con Losartán o Hidroclorotiazida solos.
RA/ Angiodema, trastornos del gusto, purpura de Henoch-Scholenin, insuficiencia renal.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



ADIUVO®

Vademécum



Maostal

Cloxinato de lisina 125 mg + Clorhidrato de propinox 10 mg

Indicaciones:

Para tratamiento el tratamiento sintomático leve a moderado de espasmos de origen intestinal, biliar, renal y del aparato genital femenino asociado a dismenorrea primaria.

RA/ Disnea, insomnio, temblor, fiebre y otras.

Presentación

100
Tabletas
Recubiertas



Mebendazol 100

Mebendazol 100 mg

Indicaciones:

Para tratamiento de las siguientes parasitosis intestinales, tanto simples como mixtas: Enterobiasis, Trichuriasis, Ascariasis, Anquilostomiasis, Necatoriasis.

RA/ Mareo, convulsiones, malestar abdominal, diarrea y otras.

Presentación

6
Tabletas



Meloxicam 15

Meloxicam 15 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento sintomático de corta duración de las crisis agudas de Artrosis, tratamiento sintomático a largo plazo de artritis reumatoide o espondilitis anquilosante.

RA/ Anemia, insomnio, vértigo, leucocitopenia y cefaleas.

Presentación

30
Tabletas



Meloxicam + Glucosamina Sulfato

Meloxicam 15 mg + Glucosamina Sulfato 1500 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento sintomático de corto plazo de la artrosis y otras formas de reumatismo extraarticular.

RA/ Trastornos gastrointestinales.

Presentación

30 Sobres
Polvo Granulado
para Suspensión
Oral



Memantina 20

Memantina Clorhidrato 20 mg

Indicaciones:

Tratamiento de pacientes con enfermedad Alzheimer de moderada a grave.

RA/ Somnolencia, confusión, vértigo, alteración del equilibrio y alteración de la marcha.

Presentación

20
Tabletas
Recubiertas



ADIUVO®

Vademécum



Metformina 750 XR

Metformina Clorhidrato 750 mg

Indicaciones:

Está indicada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para el control de la hiperglicemia que no puede ser controlada mediante dieta, ejercicio o disminución de peso, o cuando la terapia con insulina no es requerida o posible.

RA/ Molestias gastrointestinales, anorexia, acidosis láctica y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas de Liberación Prolongada



Metformina 850

Metformina Clorhidrato 850 mg

Indicaciones:

Está indicado en conjunto con la dieta y el ejercicio para mejorar el control glicémico en adultos con diabetes tipo II. Puede utilizarse concomitantemente con una sulfonilurea o insulina para mejorar el control glicémico.

RA/ Molestias GI, anorexia, acidosis láctica, disminución de vitamina B12, anemia aplásica o hemolítica.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Metformina 1000 XR

Metformina Clorhidrato 1000 mg

Indicaciones:

Está indicada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para el control de la hiperglicemia ie no puede ser controlada mediante dieta , ejercicio, disminución de peso o cuando la terapua con insulina no es requerida o posible.

RA/ Molestias gastrointestinales , anorexia ,acidosis láctica y otras

Presentación

30 Tabletas de Liberación Extendida



Metformina 500 + Glibenclamida 5

Metformina Clorhidrato 500 mg + Glibenclamida 5 mg

Indicaciones:

Está indicado como tratamiento junto a dieta y ejercicio para controlar la hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (no dependiente de la insulina).

RA/ RA/ Vómito, diarrea, dolor abdominal, perdida del apetito.

Presentación

100 Comprimidos Recubiertos



Metformina 1000 + Glibenclamida 5

Metformina Clorhidrato 1000 mg +Glibenclamida 5 mg

Indicaciones:

Está indicado como tratamiento junto a dieta y ejercicio para controlar la hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (no dependiente de la insulina).

RA/ Vómito, diarrea, dolor abdominal, perdida del apetito.

Presentación

40 Comprimidos Recubiertos



ADIUVO®

Vademécum



Metformina 1000 + Glimpirida 2

Metformina Clorhidrato 1000 mg + Glimpirida 2 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II, cuando la dieta, el ejercicio físico y la reducción de peso, especialmente en pacientes con sobrepeso, cuando la dieta prescrita y el ejercicio por sí solos no sean suficientes para un control glucémico adecuado.
RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, sensación de pesadez de estómago, dolor abdominal.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Metformina 1000 + Glimpirida 4

Metformina Clorhidrato 1000 mg + Glimpirida 4 mg

Indicaciones:

Están indicadas para la diabetes mellitus tipo II cuando la dieta ha fallado y especialmente si el paciente tiene sobrepeso. Las tabletas de Metformina y Glimpirida pueden administrarse solas como terapia inicial, o pueden administrarse en combinación con una sulfonilurea o insulina.
RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, sensación de pesadez de estómago, dolor abdominal.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Metocarbamol 500

Metocarbamol 500 mg

Indicaciones:

Se usa como complemento de descanso, la fisioterapia, los analgésicos y otras medidas para el alivio de las molestias asociadas con afecciones musculoesqueléticas agudas y dolorosas.
RA/ Visión borrosa, dolor de cabeza, fiebre, náuseas y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Metronidazol 500

Metronidazol 500 mg

Indicaciones:

Esta indicado para la amebiasis, infecciones bacterianas anaerobias y mixtas aerobias-anaerobias, vaginosis bacteriana.
RA/ Vómitos, náuseas, diarrea, estreñimiento, molestias estomacales.

Presentación

100
Tabletas



Mirtazapina 30

Mirtazapina 30 mg

Indicaciones:

La Mirtazapina es un medicamento utilizado para tratar el trastorno depresivo mayor en adultos.
RA/ Somnolencia, mareos, ansiedad, confusión, aumento de peso y apetito.

Presentación

28
Tabletas
Recubiertas



ADIUVO®

Vademécum



Montelukast 4

Montelukast 4 mg

Indicaciones:

Está indicado para prevenir la dificultad para respirar, la opresión en el pecho, la sibilancia y la tos que el asma causa. También se usa para prevenir el broncoespasmo durante el ejercicio. Se emplea, igualmente, para tratar los síntomas de la rinitis alérgica tanto estacional como permanente. Pertenecce a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor del leucotrieno.
RA/ Cefalea y fatiga.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas
Masticables



Montelukast 5

Montelukast 5 mg

Indicaciones:

Está indicado para prevenir la dificultad para respirar, la opresión en el pecho, la sibilancia y la tos que el asma causa. También se usa para prevenir el broncoespasmo durante el ejercicio. Se emplea, igualmente, para tratar los síntomas de la rinitis alérgica tanto estacional como permanente. Pertenecce a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor del leucotrieno.
RA/ Cefalea y fatiga.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas
Masticables



Montelukast 10

Montelukast 10 mg

Indicaciones:

Está indicado para prevenir la dificultad para respirar, la opresión en el pecho, la sibilancia y la tos que el asma causa. También se usa para prevenir el broncoespasmo durante el ejercicio. Se emplea, igualmente, para tratar los síntomas de la rinitis alérgica tanto estacional como permanente. Pertenecce a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor del leucotrieno.
RA/ Cefalea y fatiga.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Naproxeno 550


Naproxeno 550 mg

Indicaciones:

El Naproxeno es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo que se emplea en el tratamiento del dolor leve a moderado, la fiebre, la inflamación y la rigidez provocados por afecciones como artrosis, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, tendinitis.
RA/Estreñimiento, gases, Sed excesiva, mareos, somnolencia y otras.

Presentación

100
Tabletas
Recubiertas



Narastys

DHA, Multivitaminas, Multiminerales, Ácido Fólico

Indicaciones:

Este producto puede ayudarle a obtener las cantidades adecuadas de los nutrientes esenciales si usted no consume una variedad de alimentos nutritivos.
RA/ Náuseas, cefalea y efecto diabetogénico.

Presentación

30
Cápsulas
de Gelatina
Blanda



ADIUVO®

Vademécum



Nebivolol 5

Nebivolol 5 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial), insuficiencia cardíaca crónica estable de leve a moderada, asociado a tratamiento estándar en pacientes ancianos de 70 o más años.

RA/ Alucinaciones, psicosis, confusión y sequedad en los ojos.

Presentación

30
Tabletas



NervioVital

Vit. B1 100 mg + B6 200 mg + B12 200 mcg

Indicaciones:

Está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales de las vitaminas B1, B6 y B12 debido al incremento de las necesidades, reducción del consumo o reducción de la absorción, que podrían manifestarse como dolores de espalda, lesiones en piel y mucosas como la estomatitis y glositis, neuralgias y anemia.

RA/ Cambios en el color y olor de la orina, dolor de cabeza, somnolencia, náuseas y vómitos.

Presentación

100
Tabletas
Recubiertas



NervioVital 25000

Vitamina B1 + B6 + B12

Indicaciones:

Está indicado, para la salud, un importante beneficio es el incremento de nuestra capacidad de memoria y concentración. Se ha visto que sobre todo en las personas mayores la ingesta de vitaminas del complejo B mejora la memoria y estabiliza el estado de ánimo.

RA/ Color rosa en la orina, reacciones alérgicas, náuseas, vómito y otras.

Presentación

1 Jeringa prellenada
con 2 mL
+ aguja descartable
Solución Inyectable



Neupentin

Gabapentina 300 mg + Mononitrato de Tiamina (Vitamina B1) 100 mg + Cianocobalamina (Vitamina B12) 0.20 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de dolores neuropáticos periféricos, como la neuropatía diabética dolorosa y en la neuralgia post-herpética en adultos. Es también empleado en el síndrome del miembro fantasma, neuropatía en pacientes con cáncer y neuropatías posteriores a un cuadro de herpes zóster.

RA/ Mareos, somnolencia y edema periférico.

Presentación

20
Comprimidos
Recubiertos



Nifedipina 20 SR

Nifedipina 20 mg

Indicaciones:

Está indicado en el manejo de angina crónica estable o vasoespástica; tratamiento de hipertensión.

RA/ Falla cardíaca, enrojecimiento, constipación, diarrea, flatulencia y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas
de Liberación
Prolongada



ADIUVO®

Vademécum



Nitazoxanida 100/5

Nitazoxanida 100 mg / 5 mL

Indicaciones:

Antiparasitario de amplio espectro indicado para tratar la diarrea causada por el protozooario *Giardia Lamblia* o *Cryptosporidium Parvum*. Se sospecha que una diarrea es causada por protozoos cuando dura más de 7 días.
RA/ Náuseas, vómitos, cefalea, diarrea, dolor abdominal y otras.

Presentación

30 ml
Polvo para
Suspensión



Nitazoxanida 500

Nitazoxanida 500 mg

Indicaciones:

Antiparasitario de amplio espectro indicado para tratar la diarrea causada por el protozooario *Giardia Lamblia* o *Cryptosporidium Parvum*. Se sospecha que una diarrea es causada por protozoos cuando dura más de 7 días.
RA/ Náuseas, vómitos, cefalea, diarrea, dolor abdominal y otras.

Presentación

6
Tabletas
Recubiertas



Novagon Natural

Plantago psyllium

Indicaciones:

Para el estreñimiento, para facilitar la deposición de las heces en casos de deposiciones dolorosas, por ejemplo, tras cirugía rectal o anal, fisuras anales y hemorroides.
RA/ Flatulencia, distensión abdominal, obstrucción intestinal o esofágica, impactación fecal y otras.

Presentación

Frasco con
400 grs.



Novagon Naranja - Piña

Plantago psyllium

Indicaciones:

Para el estreñimiento, para facilitar la deposición de las heces en casos de deposiciones dolorosas, por ejemplo, tras cirugía rectal o anal, fisuras anales y hemorroides.
RA/ Flatulencia, distensión abdominal, obstrucción intestinal o esofágica, impactación fecal y otras.

Presentación

Frasco con
400 grs.



Olmesartán 20

Olmesartán Medoxomil 20 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en adultos y tratamiento de la hipertensión en niños y adolescentes de 6 a menos de 18 años de edad.
RA/ Dolor de espalda, diarrea, cefalea, rinitis y otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

28
Tabletas
Recubiertas



ADIUVO®

Vademécum

BIOEQUIVALENTE



Olmesartán 20 + Amlodipina 5

Olmesartán Medoxomil 20 mg + Amlodipina 5 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en pacientes adultos cuya presión arterial no está adecuadamente controlada con Olmesartán Medoxomil o Amlodipina en monoterapia.

RA/ Mareo, dolor de cabeza, hinchazón de los tobillos, pies y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas

BIOEQUIVALENTE



Olmesartán 20+ Hidroclorotiazida 12.5

Olmesartán 20 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg

Indicaciones:

Para tratamiento de las siguientes parasitosis intestinales, tanto simples como mixtas: Enterobiasis, Trichuriasis, Ascariasis, Anquilostomiasis, Necatoriasis.

RA/ Mareo, convulsiones, malestar abdominal, diarrea y otras.

Presentación

6
Tabletas

BIOEQUIVALENTE



Olmesartán 40

Olmesartán Medoxomil 40 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión esencial) en adultos y tratamiento de la hipertensión en niños y adolescentes de 6 a menos de 18 años de edad.

RA/ Dolor de espalda, diarrea, cefalea, rinitis y otras.

Presentación

28
Tabletas
Recubiertas

BIOEQUIVALENTE



Olmesartán 40 + Amlodipina 5

Olmesartán Medoxomil 40 mg + Amlodipina 5 mg

Indicaciones:

Tratamiento de la hipertensión esencial. Olmesartán + Amlodipina está indicado en pacientes adultos cuya presión arterial no está adecuadamente controlada con Olmesartán Medoxomilo o Amlodipino en monoterapia.

RA/ Hiperglucemia, hiperpotasemia, hipertrigliceridemia, hiperuricemia, confusión y depresión.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas

BIOEQUIVALENTE



Olmesartán 40 + Amlodipina 10

Olmesartán Medoxomil 40 mg + Amlodipina 10 mg

Indicaciones:

Tratamiento de la hipertensión esencial. Olmesartán + Amlodipina está indicado en pacientes adultos cuya presión arterial no está adecuadamente controlada con Olmesartán Medoxomilo o Amlodipino en monoterapia.

RA/ Hiperglucemia, hiperpotasemia, hipertrigliceridemia, hiperuricemia, confusión y depresión.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



ADIUVO®

Vademécum



Omeprazol 20

Omeprazol 20 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de la úlcera duodenal y de la úlcera gástrica benigna, incluyendo las que complican los tratamientos con fármacos antiinflamatorios no esteroides (AINEs). Reflujo gastroesofágico RA/ Náuseas, diarrea, cefalea, estreñimiento, flatulencia y otras.

Presentación

100
Cápsulas
Gastrorresistentes



Pantoprazol 40

Pantoprazol 40 mg

Indicaciones:

Está indicado en adultos y adolescentes a partir de 12 años para esofagitis por reflujo. Pantoprazol está indicado para erradicación de Helicobacter pylori (H. pylori) en combinación con terapia antibiótica adecuada en pacientes con H. pylori asociado a úlceras, úlcera gástrica y duodenal, síndrome de Zollinger Ellison y otras enfermedades hipersecretoras patológicas. RA/ Trastornos del sueño, cefalea, vértigos, alteraciones del gusto y otras.

Presentación

100
Tabletas de
Liberación
Retardada



Penicilina G Benzatínica 1.200.000 IU

Indicaciones:

Se usa paratratar y prevenir ciertas infecciones provocadas por bacterias. La inyección de penicilina G benzatínica es una clase de antibióticos llamados tetraciclinas. Funciona matando las bacterias que causan infecciones. RA/ Náuseas, vómitos, dolor e inflamación y otras.

Presentación

1 Vial Con 1 g
de Penicilina
+ 1 Ampolla de
Lidocaina
suspensión inyectable



Persea Gratissima 100 mg + Glycine Max 200 mg

Persea Gratissima 100 mg + Glycine Max 200 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento sintomático de acción lenta de la osteoartritis de cadera y rodilla. Reumatología, tratamiento sintomático de la acción lenta de la osteoartritis. Prevención de la degradación del cartilago. RA/ Fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y otras.

Presentación

30
Cápsulas



Pregabalina 75

Pregabalina 75 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento del dolor neuropático periférico y central en adultos, trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en adultos, epilepsia y en el tratamiento combinado de las crisis parciales con o sin generalización secundaria. RA/ Estado de ánimo eufórico, confusión, irritabilidad, desorientación, insomnio y otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Cápsulas



ADIUVO®

Vademécum



Pregabalina 150

Pregabalina 150 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento del dolor neuropático periférico y central en adultos, trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en adultos, epilepsia y en el tratamiento combinado de las crisis parciales con o sin generalización secundaria.
RA/ Estado de ánimo eufórico, confusión, irritabilidad, desorientación, insomnio y otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Cápsulas



Pre & Probióticos

Mezcla Probiótica (1x10⁹ de UFC)

Indicaciones:

Está indicado para una variedad de trastornos gastrointestinales. Los Probióticos parecen alterar la microflora intestinal y pueden ejercer su efecto. Los probióticos se han utilizado para tratar problemas intestinales como diarrea aguda y crónica, síndrome del intestino irritable, SIBO, IBD, etc.
RA/ No presenta.

Presentación

30 Sobres
Polvo para
suspensión
Oral



Pre & Probióticos Plus

Mezcla probiótica (1x10⁸ de UFC) + Vitamina A + Vitamina C + Vitamina E

Indicaciones:

Está indicado para una variedad de trastornos gastrointestinales. Los Probióticos parecen alterar la microflora intestinal y pueden ejercer su efecto. Los probióticos se han utilizado para tratar problemas intestinales como diarrea aguda y crónica, síndrome del intestino irritable, SIBO, IBD, etc.
RA/ No presenta.

Presentación

30
Cápsulas



Progesterona 200

Progesterona 200 mg

Indicaciones:

Pertenece al grupo de medicamentos denominados progestágenos y contiene progesterona natural, se usa para los trastornos ligados a una insuficiencia en progesterona, también en el tratamiento hormonal sustitutivo para la menopausia, para resolver algunos problemas de fertilidad y otros.
RA/Cefalea, malestar estomacal, vómito, diarrea, cansancio y otras

Presentación

30 Cápsulas de
Gelatina Blanda
Vía de Administración
Oral y vaginal



Quetiapina 25

Quetiapina 25 mg

Indicaciones:

Quetiapina está indicado en tratamiento del trastorno bipolar, tratamiento de los episodios maníacos moderados a graves en el trastorno bipolar, tratamiento de los episodios depresivos mayores en el trastorno bipolar para el tratamiento de la recurrencia de episodios maníacos o depresivos de pacientes con trastorno bipolar quienes previamente han respondido al tratamiento con quetiapina. El tratamiento adicional de los episodios mayores en pacientes con Trastorno Depresivo Mayor entre otro. RA/ Mareos, boca seca, indigestión, dolor en las articulaciones y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



ADIUVO®

Vademécum



Quetiapina 50

Quetiapina 50 mg

Indicaciones:

Quetiapina está indicado en tratamiento del trastorno bipolar, tratamiento de los episodios maníacos moderados a graves en el trastorno bipolar, tratamiento de los episodios depresivos mayores en el trastorno bipolar para el tratamiento de la recurrencia de episodios maníacos o depresivos de pacientes con trastorno bipolar quienes previamente han respondido al tratamiento con quetiapina. El tratamiento adicional de los episodios mayores en pacientes con Trastorno Depresivo Mayor entre otro. RA/ Mareos, boca seca, indigestión, dolor en las articulaciones y otras.

Presentación

30 Tabletas de Liberación Extendida



Quetiapina 100

Quetiapina 100 mg

Indicaciones:

Quetiapina está indicado en tratamiento del trastorno bipolar, tratamiento de los episodios maníacos moderados a graves en el trastorno bipolar, tratamiento de los episodios depresivos mayores en el trastorno bipolar para el tratamiento de la recurrencia de episodios maníacos o depresivos de pacientes con trastorno bipolar quienes previamente han respondido al tratamiento con quetiapina. El tratamiento adicional de los episodios mayores en pacientes con Trastorno Depresivo Mayor entre otro. RA/ Mareos, boca seca, indigestión, dolor en las articulaciones y otras.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Quetiapina 300

Quetiapina 300 mg

Indicaciones:

Quetiapina está indicado en tratamiento del trastorno bipolar, tratamiento de los episodios maníacos moderados a graves en el trastorno bipolar, tratamiento de los episodios depresivos mayores en el trastorno bipolar para el tratamiento de la recurrencia de episodios maníacos o depresivos de pacientes con trastorno bipolar quienes previamente han respondido al tratamiento con quetiapina. El tratamiento adicional de los episodios mayores en pacientes con Trastorno Depresivo Mayor entre otro. RA/ Mareos, boca seca, indigestión, dolor en las articulaciones y otras.

Presentación

30 Tabletas de Liberación Extendida



Rivaroxabán 10

Rivaroxabán 10 mg

Indicaciones:

Es un anticoagulante. Está indicado para tratar la trombosis venosa profunda (TVP; un coágulo, generalmente en la pierna) y la embolia pulmonar (EP; un coágulo de sangre en el pulmón) en los adultos. RA/Espasmo muscular, dolor de estómago, vómitos y otras

BIOEQUIVALENTE

Presentación

28 Tabletas Recubiertas



Rivaroxabán 15

Rivaroxabán 15 mg

Indicaciones:

Es un anticoagulante. Está indicado para tratar la trombosis venosa profunda (TVP; un coágulo, generalmente en la pierna) y la embolia pulmonar (EP; un coágulo de sangre en el pulmón) en los adultos. RA/Espasmo muscular, dolor de estómago, vómitos y otras

BIOEQUIVALENTE

Presentación

28 Tabletas Recubiertas



ADIUVO®

Vademécum



Rivaroxabán 20

Rivaroxabán 20 mg

Indicaciones:

Es un anticoagulante. Está indicado para tratar la trombosis venosa profunda (TVP; un coágulo, generalmente en la pierna) y la embolia pulmonar (EP; un coágulo de sangre en el pulmón) en los adultos.
RA/Espasmo muscular, dolor de estómago, vómitos y otras

BIOEQUIVALENTE

Presentación

28
Tabletas
Recubiertas



Rosuvastatina 10

Rosuvastatina 10 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la hipercolesterolemia, adultos, adolescentes y niños de edad igual o mayor de 6 años con hipercolesterolemia primaria (tipo IIa incluyendo hipercolesterolemia familiar heterocigótica) o dislipidemia mixta (tipo IIb) como medida complementaria a la dieta cuando la respuesta obtenida con la dieta y otros tratamientos no farmacológicos (p. ej., ejercicio, pérdida de peso) no ha sido adecuada. Prevención de eventos cardiovasculares, Prevención de eventos cardiovasculares mayores en pacientes considerados de alto riesgo.
RA/ Cefalea, mareos, diarrea, estreñimiento, náuseas y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Rosuvastatina 20

Rosuvastatina 20 mg

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la hipercolesterolemia, adultos, adolescentes y niños de edad igual o mayor de 6 años con hipercolesterolemia primaria (tipo IIa incluyendo hipercolesterolemia familiar heterocigótica) o dislipidemia mixta (tipo IIb) como medida complementaria a la dieta cuando la respuesta obtenida con la dieta y otros tratamientos no farmacológicos (p. ej., ejercicio, pérdida de peso) no ha sido adecuada. Prevención de eventos cardiovasculares, Prevención de eventos cardiovasculares mayores en pacientes considerados de alto riesgo.
RA/ Cefalea, mareos, diarrea, estreñimiento, náuseas y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Rupatadina 10

Rupatadina 10 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento sintomático de la rinitis alérgica y la urticaria en adultos y adolescentes (mayores de 12 años).
RA/ Faringitis, rinitis, apetito aumentado, somnolencia y otras.

Presentación

100
Tabletas



Saccharomyces Boulardii 200

Saccharomyces Boulardii 200 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de la diarrea: diarrea del viajero, diarrea viral en niños y diarrea asociada con antibióticos, tratamiento del síndrome del intestino irritable, tratamiento y prevención de complicaciones digestivas después de la terapia con antibióticos: diarrea, colitis, candidiasis y prevención de la diarrea durante la alimentación enteral continua en adultos.
RA/ Flatulencia, urticaria.

Presentación

10
Sobres
Polvo para
Suspensión



ADIUVO®

Vademécum



Saccharomyces Boulardii 250

Saccharomyces Boulardii 250 mg

Indicaciones:

Está indicado en adultos y niños para el tratamiento sintomático de las diarreas agudas inespecíficas y en la prevención y tratamiento sintomático de los procesos diarreicos producidos por la administración de antibióticos.

RA/ Reacción anafiláctica con prurito, urticaria, rash cutáneo, flatulencia.

Presentación

10 Sobres Polvo para Suspensión



Saccharomyces Boulardii 250

Saccharomyces Boulardii 250 mg

Indicaciones:

Está indicado en adultos y niños para el tratamiento sintomático de las diarreas agudas inespecíficas y en la prevención y tratamiento sintomático de los procesos diarreicos producidos por la administración de antibióticos.

RA/ Reacción anafiláctica con prurito, urticaria, rash cutáneo, flatulencia.

Presentación

10 Cápsulas



Sertralina 50

Sertralina 50 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de episodios depresivos mayores, prevención de reaparición de episodios depresivos mayores, trastorno de angustia, con o sin agorafobia, trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) en adultos y pacientes pediátricos de 6-17 años, trastorno de ansiedad social (fobia social) y trastorno por estrés post-traumático (TEPT).

RA/ Náuseas, apetito disminuido, apetito aumentado, insomnio.

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Sertralina 100

Sertralina 100 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de episodios depresivos mayores, prevención de reaparición de episodios depresivos mayores, trastornos de angustia, con o sin agorafobia, trastornos obsesivo-compulsivo (TOC) en adultos y pacientes pediátricos de 16-17 años, trastornos de ansiedad social (fobia social) y trastorno por estrés post-traumático (TEPT).

RA/ Náuseas, apetito disminuido, apetito aumentado, insomnio y otras

Presentación

30 Tabletas Recubiertas



Sildenafil 50

Sildenafil 50 mg

Indicaciones:

Es un inhibidor potente y selectivo de Guanosin Monofosfatocíclico Fosfodiesterasa (GMPc), responsable de la acción periférica sobre las erecciones, siendo indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil.

RA/ Cefalea, rubor, mareos, dispepsia, diarrea y otras.

Presentación

4 Comprimidos Recubiertos



ADIUVO®

Vademécum



Sildenafil 100

Sildenafil 100 mg

Indicaciones:

Es un inhibidor potente y selectivo de Guanosin Monofosfatocíclico Fosfodiesterasa (GMPc), responsable de la acción periférica sobre las erecciones, siendo indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil. RA/ Cefalea, rubor, mareos, dispepsia, diarrea y otras.

Presentación

4
Comprimidos
Recubiertos



Silnamys

Multivitámico + Aminoácidos

Indicaciones:

Suplemento nutricional multivitámico en conjunto con aminoácidos esenciales, un producto dietético. RA/ No presenta.

Presentación

110 mL
Jarabe



Simvastatina 20 + Ezetimiba 10

Simvastatina 20 mg + Ezetimiba 10 mg

Indicaciones:

Está indicado para reducir el riesgo de acontecimientos cardiovasculares en pacientes con cardiopatía coronaria (CC) y antecedentes de síndrome coronario agudo (SCA), Hipercolesterolemia. RA/ Mareos, cefalea, dolor abdominal, dispepsia, flatulencia, náuseas y vómitos.

Presentación

30
Tabletas



Simvastatina 40 + Ezetimiba 10

Simvastatina 40 mg + Ezetimiba 10 mg

Indicaciones:

Indicaciones: Está indicado para reducir el riesgo de acontecimientos cardiovasculares en pacientes con cardiopatía coronaria (CC) y antecedentes de síndrome coronario agudo (SCA), Hipercolesterolemia. RA/ Mareos, cefalea, dolor abdominal, dispepsia, flatulencia, náuseas y vómitos.

Presentación

30
Tabletas



Sitagliptina 100

Sitagliptina 100 mg

Indicaciones:

Está indicado para mejorar el control glucémico en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2: Como monoterapia en pacientes controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio por sí solos y para los que el uso de Metformina no es adecuado debido a contraindicaciones o intolerancia. Como terapia oral doble en combinación con Metformina en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con el tratamiento de Metformina sola, no proporcionen un control glucémico adecuado. Como terapia oral triple en combinación con una sulfonilurea y Metformina en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con el tratamiento dual con estos medicamentos, no proporcionen un control glucémico adecuado. RA/ Dolor de cabeza, mareo, estreñimiento, vómitos.

Presentación

10
Tabletas
Recubiertas



ADIUVO®

Vademécum



Sitagliptina 50 + Metformina 1000

Sitagliptina 50 mg + Metformina Clorhidrato 1000 mg

Indicaciones:

Está indicado para mejorar el control glucémico en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2: como monoterapia en pacientes controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio por sí solos y para los que el uso de Metformina no es adecuado debido a contraindicaciones o intolerancia. Como terapia oral doble en combinación con Metformina en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con el tratamiento de Metformina sola, no proporcionen un control glucémico adecuado.
RA/ Trombocitopenia, hipoglucemia, dolor de cabeza, mareo, estreñimiento.

Presentación

20
Tabletas
Recubiertas



Tamsulosina 0.4

Tamsulosina Clorhidrato 0.4 mg

Indicaciones:

Está indicado en hombres para tratar los síntomas del agrandamiento de la próstata (hiperplasia prostática benigna) que incluye dificultad para orinar (intermitencia, goteo, debilidad en el flujo de orina y vaciado incompleto de la vejiga), dolor al orinar y necesidad de orinar con más frecuencia y urgencia.
RA/ Mareos, edema, cefalea, náuseas, diarrea y otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Cápsulas de
Liberación
Prolongada



Tamsulosina 0.4 + Dutasterida 0.5

Tamsulosina Clorhidrato 0.4 mg + Dutasterida 0.5 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de próstata (HBP) y reducción del riesgo de retención aguda de orina (RAO) y de cirugía en pacientes con síntomas de moderados a graves de HBP.
RA/ Mareo, dolor de cabeza, estreñimiento, diarrea, náuseas y otras.

Presentación

30 Cápsulas
de Liberación
Modificada



Telmisartan 80

Telmisartán 80 mg

Indicaciones:

Está indicado para la hipertensión esencialmente en adultos, prevención cardiovascular, enfermedad cardiovascular aterosclerótica o enfermedad arterial periférica. Diabetes mellitus tipo 2 con lesión de órgano diana documentada.
RA/ Diarrea, angioedema, dolor de espalda, infecciones respiratorias y otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas



Tramadol 50

Tramadol Clorhidrato 50 mg

Indicaciones:

El Tramadol es un analgésico opioide de acción central. Es un antagonista puro no selectivo en los receptores de opioides μ , δ y κ con una afinidad mayor para el receptor, utilizado para el tratamiento de dolor de intensidad moderada a severa y tiene un efecto antitusivo.
RA/ Somnolencia, sudoración, mareos, vómitos, xerostomía y otras.

Presentación

100
Cápsulas



ADIUVO®

Vademécum



Tridiuvo

Clotrimazol 1% + Neomicina 0.5% + Betametasona 0.05%

Indicaciones:

Antiinflamatorio, antibacteriano, antimicótico tópico. Afecciones inflamatorias, micóticas y bacterianas de la piel, causadas por gérmenes sensibles al Clotrimazol y/o a la Neomicina. Dermatitis por contacto, seborreica, eccema. RA/ Hipersensibilidad a alguno de los componentes, afecciones tuberculosas o virales de la piel.

Presentación

20 Gramos
Crema Tópica



Trimetazidina 35 MR

Clohidrato de Trimetazidina 35 mg

Indicaciones:

Está indicada en adultos como terapia adicional para el tratamiento sintomático de pacientes con angina de pecho estable que no están adecuadamente controlados o no toleran terapias anti anginosas de primera línea.
RA/ Cefalea, rubor facial, taquicardia refleja, hipotensión, bradicardia y otras.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas
de Liberación
Modificada



Valsartán 160

Valsartán 160 mg

Indicaciones:

Está indicada para tratar la presión arterial alta en adultos y en niños y adolescentes de 6 a 18 años de edad, tratar a personas después de un ataque cardíaco reciente y tratar la insuficiencia cardíaca sintomática en pacientes adultos.

RA/ Tos, dolor abdominal, náuseas, diarrea y cansancio.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Valsartán 160 + Hidroclorotiazida 12.5

Valsartán 160 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg

Indicaciones:

Está indicada para tratar la presión arterial alta que no se controla adecuadamente con el uso de un único componente.

RA/ Hinchazón en la cara, lengua o faringe, dificultad para tragar, urticaria y dificultad para respirar.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Valsartán 160 + Hidroclorotiazida 12.5 + Amlodipina 5

Valsartán 160 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg+ Amlodipina 5 mg

Indicaciones:

Tratamiento de la hipertensión arterial esencial como tratamiento de sustitución en pacientes adultos cuya presión arterial está adecuadamente controlada con la combinación de Amlodipina, Valsartán e Hidroclorotiazida

RA/ Hipercalcemia, depresión, insomnio, cambios de ánimo y otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas
con Película



ADIUVO®

Vademécum



Valsartán 320

Valsartán 320 mg

Indicaciones:

Está indicada para tratar la presión arterial alta en adultos y en niños y adolescentes de 6 a 18 años de edad, tratar a personas después de un ataque cardíaco reciente y tratar la insuficiencia cardíaca sintomática en pacientes adultos.

RA/ Tos, dolor abdominal, náuseas, diarrea y cansancio.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Valsartán 320 + Hidroclorotiazida 25

Valsartán 320 mg + Hidroclorotiazida 25 mg

Indicaciones:

Está indicada para tratar la presión arterial alta que no se controla adecuadamente con el uso de un único componente.

RA/ Hinchazón en la cara, lengua o faringe, dificultad para tragar, urticaria y dificultad para respirar.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas



Valsartán 320 + Hidroclorotiazida 25 + Amlodipina 10

Valsartán 320 mg + Hidroclorotiazida 25 mg+ Amlodipina 10 mg

Indicaciones:

Tratamiento de la hipertensión arterial esencial como tratamiento de sustitución en pacientes adultos cuya presión arterial está adecuadamente controlada con la combinación de Amlodipina, Valsartán e Hidroclorotiazida

RA/ Hipercalcemia, depresión, insomnio, cambios de ánimo y otras.

BIOEQUIVALENTE

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas
con Película



Verapamilo 240 SR

Verapamilo Clorhidrato 240 mg

Indicaciones:

El Clorhidrato de Verapamilo es un bloqueante de los canales de calcio activo por vía oral se administra para el tratamiento de la angina, la hipertensión y las taquiarritmias supraventriculares.

RA/ Bradicardia, hipotensión, rash, mareos, fatiga y otras.

Presentación

20
Tabletas



Vildagliptina 50

Vildagliptina 50 mg

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, en el tratamiento de pacientes adultos que no pueden conseguir un control suficiente de la glucemia con la dosis máxima tolerada de Metformina en monoterapia por vía oral o que ya están en tratamiento con la combinación de Vildagliptina y Metformina en comprimidos individuales.

RA/ Disfunción hepática (incluyendo hepatitis), urticaria, lesiones de la piel exfoliativas y bullosas, incluido el penfigoide buloso.

Presentación

20
Tabletas
Recubiertas



ADIUVO®

Vademécum

Vildagliptina 50 + Metformina 500

Vildagliptina 50 mg + Metformina Clorhidrato 500 mg



Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, en el tratamiento de pacientes adultos que no pueden conseguir un control suficiente de la glucemia con la dosis máxima tolerada de Metformina en monoterapia por vía oral o que ya están en tratamiento con la combinación de Vildagliptina y Metformina en comprimidos individuales.

RA/ Disfunción hepática (incluyendo hepatitis), urticaria, lesiones de la piel exfoliativas y bullosas, incluido el penfigoide bulloso.

Presentación

30
Tabletas
Recubiertas

Vildagliptina 50 + Metformina 850

Vildagliptina 50 mg + Metformina Clorhidrato 850 mg



Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, en el tratamiento de pacientes adultos que no pueden conseguir un control suficiente de la glucemia con la dosis máxima tolerada de Metformina en monoterapia por vía oral o que ya están en tratamiento con la combinación de Vildagliptina y Metformina en comprimidos individuales.

RA/ Disfunción hepática (incluyendo hepatitis), urticaria, lesiones de la piel exfoliativas y bullosas, incluido el penfigoide bulloso.

Presentación

20
Tabletas
Recubiertas

Vildagliptina 50 + Metformina 1000

Vildagliptina 50 mg + Metformina Clorhidrato 1000 mg



Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, en el tratamiento de pacientes adultos que no pueden conseguir un control suficiente de la glucemia con la dosis máxima tolerada de Metformina en monoterapia por vía oral o que ya están en tratamiento con la combinación de Vildagliptina y Metformina en comprimidos individuales.

RA/ Disfunción hepática (incluyendo hepatitis), urticaria, lesiones de la piel exfoliativas y bullosas, incluido el penfigoide bulloso.

Presentación

20
Tabletas
Recubiertas

Vitamina C 500

Vitamina C 500 mg



Indicaciones:

El Ácido Ascórbico o Vitamina C pertenece a una clase de medicamentos llamados antioxidantes. El cuerpo lo necesita para ayudar a la cicatrización de las heridas, mejorar la absorción de hierro de los alimentos vegetales y apoyar el sistema inmunológico.

RA/ Diarrea, náuseas, acidez estomacal y otras.

Presentación

100
Tabletas
Masticables

Vitamina E 400

Vitamina E 400 UI



Indicaciones:

Está indicada en la prevención y tratamiento de deficiencia de Vitamina E, en enfermedades con síndrome de malabsorción que cursen con esteatorrea, resecciones gastrointestinales, enfermedad celíaca, fibrosis quística, enfermedad del tracto hepato-biliar (colestasis crónica, obstrucción biliar, atresia biliar) y abetalipoproteinemia.

RA/ Diarrea, náuseas, flatulencia, espasmos abdominales y sangrado gingival.

Presentación

30
Cápsulas de
Gelatina Blanda



ADIUVO®

Vademécum



Xtrina 81

Aspirina 81 mg

Indicaciones:

Está indicado para el alivio del dolor, la fiebre y la inflamación de una variedad de afecciones como la gripe, el resfriado común. Para reducir el riesgo de mortalidad vascular en pacientes con sospecha de infarto agudo de miocardio, para reducir el riesgo de un primer infarto de miocardio, para la profilaxis del tromboembolismo venoso después del reemplazo total de cadera.
RA/ Náuseas, vómitos, diarrea, hemorragia y / o ulceración gastrointestinal y otras.

Presentación

100
Tabletas de
Liberación
Retardada



Zinc 10/5

Zinc 10mg/5mL

Indicaciones:

Está indicado en los estados carenciales de Zinc, siempre que no puedan ser corregidos mediante dieta
RA/ Puede provocar deficiencia de cobre.

Presentación

120 mL
Jarabe



ADIUVO®

Próximos Ingresos

Productos de Calidad para Tu Bienestar

- **Gemfibrozil 600 mg, 30 tabletas**
- **Iranixio (Cloxinato de Lisina 125 mg + Tartrato de Ergotamina 1mg), 100 tabletas recubiertas**
- **Domperidona 10, 30 tabletas**
- **Hidroxicloroquina 200, 30 tabletas recubiertas**
- **Desogestrel 0.075, 28 tabletas recubiertas**
- **Donepezilo 10, 30 tabletas recubiertas**
- **DIFLAH 1000, 30 Sachets de 10 mL**

**GENÉRICOS
DE CALIDAD**

**MISMA
EFICACIA**

**MISMA
CALIDAD**



CALENDARIO

Productos de Calidad para Tu Bienestar



2024

Julio

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Agosto

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Septiembre

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
24	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Octubre

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Noviembre

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

Diciembre

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

Enero 2025

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Febrero 2025

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

Marzo 2025

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Abril 2025

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Mayo 2025

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Junio 2025

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Julio 2025

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Agosto 2025

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Septiembre 2025

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Octubre 2025

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Noviembre 2025

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Diciembre 2025

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



Honduras: Droguería Europea S.A. (+504) 8830-6927 / 9461-2554

El Salvador: Droguería Europea S.A., de C.V. (+503) 2264-2033

Costa Rica: Droguería Europea S.A. (+506) 4881-1300

Nicaragua: Distribuidora Europea Nicaragua S.A. (+505) 2298-0777

Guatemala: Droguería Europea Guatemala S.A.

Panamá: Droguería Darwin S.A., Panamá +507 67698510

info@adiuvopharma.com